



NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

dla obszarów specjalnej ochrony (OSO),
proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (pOZW),
obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW) oraz
specjalnych obszarów ochrony (SOO)

OBSZAR PLB020004
NAZWA
OBSZARU Zbiornik Mietkowski

ZAWARTOŚĆ

- [1. IDENTYFIKACJA OBSZARU](#)
- [2. POŁOŻENIE OBSZARU](#)
- [3. INFORMACJE PRZYRODNICZE](#)
- [4. OPIS OBSZARU](#)
- [5. STATUS OCHRONY OBSZARU](#)
- [6. POWIĄZANIA OBSZARU](#)
- [7. MAPA OBSZARU](#)

1. IDENTYFIKACJA OBSZARU

1.1. Typ A	1.2. Kod obszaru PLB020004	Powrót
---------------	-------------------------------	------------------------

1.3. Nazwa obszaru

Zbiornik Mietkowski

1.4. Data opracowania 2002-08	1.5. Data aktualizacji 2024-03
----------------------------------	-----------------------------------

1.6. Instytucja lub osoba przygotowująca wniosek:

Nazwisko/Organizacja:	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Adres:	Polska Al. Jerozolimskie 136 Warszawa 02-305
Adres e-mail:	kancelaria@gdos.gov.pl

1.7. Data wskazania oraz objęcia formą ochrony/klasyfikacji terenu

Data zaklasyfikowania obszaru jako OSO:	2007-10
Krajowe odniesienie prawne dla formy ochrony OSO	rozp. MŚ z dn. 05.09.2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie osop

2. POŁOŻENIE OBSZARU

2.1. Położenie centralnego punktu [wartości dziesiętne stopni]:

Długość geograficzna
16.6169

Szerokość geograficzna
50.9541

2.2. Powierzchnia [ha]:

1193.89

2.3. Obszar morski [%]

0.0

2.5. Kod i nazwa regionu administracyjnego

Kod poziomu NUTS 2

Nazwa regionu

PL51	Dolnośląskie
------	--------------

2.6. Region biogeograficzny

Kontynentalny (100.0
%)

3. INFORMACJE PRZYRODNICZE

[Powrót](#)

3.2. Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 2009/147/WE i gatunki wymienione w załączniku II do dyrektywy 92/43/EEG oraz ocena znaczenia obszaru dla tych gatunków

Gatunki				Populacja na obszarze							Ocena obszaru			
Grupa	Kod	Nazwa naukowa	S	NP	Typ	Wielkość		Jednostka	Kategoria	Jakość danych	A B C D	A B C		
						Min	Maks		C R V P		Populacja	Stan zachowania	Izolacja	Ogólni
B	A056	Anas clypeata			c	400	400	i	R	G	C	C	C	C
B	A053	Anas platyrhynchos			c	21000	22500	i	C	G	C	C	C	C
B	A053	Anas platyrhynchos			r	100	150	i		M	C	C	C	C
B	A041	Anser albifrons			c	1000	4500	i	C	G	C	C	C	C
B	A039	Anser fabalis			c	10000	41500	i	C	G	C	C	C	B
B	A149	Calidris alpina			c	375	375	i		M	D			
B	A147	Calidris ferruginea			c	115	115	i		M	D			
B	A145	Calidris minuta			c	235	235	i		M	D			
B	A136	Charadrius dubius			r	10	12	p		M	D			
B	A197	Chlidonias niger			c	250	250	i	R	G	D			
B	A153	Gallinago gallinago			c	205	205	i		M	D			
B	A459	Larus cachinnans			c	3600	3600	i		M	D			
B	A459	Larus cachinnans			r	15	120	p		M	D			
B	A182	Larus canus			c	1600	1600	i		M	D			

B	A182	Larus canus		r	5	5	p		M	D			
B	A176	Larus melanocephalus		r	10	40	p	R	G	A	C	A	A
B	A179	Larus ridibundus		p	15000	15500	i		M	B	C	C	C
B	A179	Larus ridibundus		r	1000	3000	p		M	B	C	C	C
B	A160	Numenius arquata		c	215	220	i	R	G	C	C	C	C
B	A072	Pernis apivorus		c	1	3	i		M	D			
B	A151	Philomachus pugnax		c	170	170	i		M	D			
B	A141	Pluvialis squatarola		c	100	100	i		M	D			
B	A006	Podiceps grisegena		r				R	M	D			
B	A195	Sterna albifrons		r	1	3	p	V	G	C	C	B	C
B	A193	Sterna hirundo		r	100	190	p	R	G	C	C	C	C
B	A048	Tadorna tadorna		r	1	1	i	V	M	C	C	C	C
B	A161	Tringa erythropus		c	130	130	i		M	D			
B	A166	Tringa glareola		c	400	400	i	R	M	D			

- Grupa: A = płazy, B = ptaki, F = ryby, I = bezkręgowce, M = ssaki, P = rośliny, R = gady.
- S: jeśli dane o gatunku są szczególnie chronione i nie mogą być udostępnione publicznie, należy wpisać „tak”.
- NP: jeśli dany gatunek nie występuje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Typ: p = osiadłe, r = wydające potomstwo, c = przelotne, w = zimujące (w przypadku roślin i gatunków niemigrujących należy użyć terminu „osiadłe”).
- Jednostka: i = osobniki pojedyncze, p = pary lub inne jednostki według standardowego wykazu jednostek i kodów zgodnego ze sprawozdawczością na podstawie art. 12 i 17 (zob. [portal referencyjny](#)).
- Kategorie liczebności (kategoria): C = powszechne, R = rzadkie, V = bardzo rzadkie, P = obecne - wypełnić, jeżeli brak jest danych (DD), lub jako uzupełnienie informacji o wielkości populacji.
- Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. zgrubne dane szacunkowe); DD = brak danych (kategorię tę należy stosować wyłącznie, jeśli nie da się dokonać nawet zgrubnej oceny wielkości populacji - w takiej sytuacji można pozostawić puste pole dotyczące wielkości populacji, jednak pole „Kategorie liczebności” musi być wypełnione).

4. OPIS OBSZARU

4.1. Ogólna charakterystyka obszaru

[Powrót](#)

Klasa siedliska przyrodniczego	Pokrycie [%]
N16	0.68
N23	2.89
N06	70.85
N12	25.58
Ogółem pokrycia siedliska przyrodniczego	100

Dodatkowa charakterystyka obszaru:

Zbiornik retencyjny, który w okresach suchych umożliwia podniesienie poziomu wody w Bystrzycy, ułatwiając żeglugę na Odrze. Zbiornik wykorzystywany jest także do poboru kruszywa, przede wszystkim pełni jednak funkcję przeciwpowodziową. Charakteryzuje się dużymi wahaniami poziomu wody, co sprzyja odsłanianiu błot, stanowiących atrakcyjne miejsca żerowiskowe dla ptaków wodno-błotnych. Efektem wydobywania żwiru są zwałowiska ziemi, tworzące przy niższych i średnich stanach wody, małe wyspy - miejsce gniazdowania mew i rybitw. Roślinność wodna zbiornika jest bardzo uboga. Tylko w najpłytszych miejscach rosną kępy trzciny i pałki. Zbiornik otoczony jest niskim wzniesieniami w większości zajętyymi pod rozmaite uprawy, takie jak: kukurydza, rzepak i inne zboża na których żerują zimujące w obrębie zbiornika stada gęsi. Zbiornik pełni także istotną w regionie funkcję rekreacyjną (turystyka wodna, wędkarstwo).

4.2. Jakość i znaczenie

W okresie lęgowym ostoją ważną dla gatunków z załącznika I Dyrektywy ptasiej: mewy czarnogłowej, rybitwy rzecznej i rybitwy białoczelnej (>1% populacji krajowej, kryterium C6) oraz śmieszki i ohara. (>1% populacji krajowej). Jedno z tylko kilkunastu stanowisk lęgowych ohara na śródlądziu.

Mewa czarnogłowa - ocena ogólna A, w tym:

Populacja rozmieszczona w zachodniej części obszaru: 0-40 par, co stanowi w zależności od roku do ok. 40% populacji krajowej (wg Sikora i in. 2007, wg Wilk i in. 2010; wg Monitoring ptaków - prace terenowe GIOŚ 2012) - ocena B;

Zachowanie: ocena C, w tym:

stopień zachowania siedliska: III- elementy średnio zachowane lub częściowo zdegradowane (zarastające krzewami i drzewami wyspy, część położona stosunkowo blisko brzegu),

możliwość odtworzenia: C - możliwe przy średnim nakładzie środków (wycinka krzewów i drzew, usunięcie hałd ziemi znajdujących się pomiędzy brzegiem a wyspami);

Izolacja: ocena B

Rybitwa rzeczna - ocena ogólna B, w tym:

Populacja rozmieszczona w zachodniej części obszaru: 0-190 par, co stanowi w zależności od roku ok. 4% populacji krajowej (wg Wilk i in. 2010, Bukaciński, Bukacińska 2004) - ocena B;

Zachowanie: ocena C, w tym:

stopień zachowania siedliska: III- elementy średnio zachowane lub częściowo zdegradowane (zarastające krzewami i drzewami wyspy, część położona stosunkowo blisko brzegu),

możliwość odtworzenia: C - możliwe przy średnim nakładzie środków (wycinka krzewów i drzew, usunięcie hałd ziemi znajdujących się pomiędzy brzegiem a wyspami, odtworzenie piaszczysto- żwirowych fragmentów wysp);

Izolacja: ocena C.

Rybitwa białoczelna - ocena ogólna C, w tym:

Populacja rozmieszczona w zachodniej części obszaru: 0-3 par, co stanowi w zależności od roku ok. 0,5% populacji krajowej (wg Bukacińska, Bukaciński 2004, wg Sikora i in. 2007, wg Wilk i in. 2010) - ocena C;

Zachowanie: ocena C, w tym:

stopień zachowania siedliska: III- elementy średnio zachowane lub częściowo zdegradowane (zarastające krzewami i drzewami wyspy, część położona stosunkowo blisko brzegu),

możliwość odtworzenia: C - możliwe przy średnim nakładzie środków (wycinka krzewów i drzew, usunięcie hałd ziemi znajdujących się pomiędzy brzegiem a wyspami, odtworzenie piaszczysto- żwirowych fragmentów wysp);

Izolacja: ocena C.

Śmieszka - ocena ogólna B, w tym:

Populacja rozmieszczona w zachodniej części obszaru: 1000-3000 par, co stanowi w zależności od roku do ok. 3% populacji krajowej (wg Sikora i in. 2007, wg Wilk i in. 2010) - ocena B;

Zachowanie: ocena C, w tym:

stopień zachowania siedliska: III- elementy średnio zachowane lub częściowo zdegradowane (zarastające krzewami i drzewami wyspy, część położona stosunkowo blisko brzegu),

możliwość odtworzenia: C - możliwe przy średnim nakładzie środków (wycinka krzewów i drzew, usunięcie

hałd ziemi znajdujących się pomiędzy brzegiem a wyspami);

Izolacja: ocena C

Ohar - ocena ogólna C, w tym:

Populacja rozmieszczona w zachodniej części obszaru: 0-1 par, co stanowi w zależności od roku do ok. 0,5% populacji krajowej (wg Sikora i in. 2007, wg Wilk i in. 2010) - ocena B;

Zachowanie: ocena C, w tym:

stopień zachowania siedliska: III- elementy średnio zachowane lub częściowo zdegradowane (zarastające krzewami i drzewami wyspy, część położona stosunkowo blisko brzegu),

możliwość odtworzenia: C - możliwe przy średnim nakładzie środków (stworzenie miejsc gniazdowania,

usunięcie hałd ziemi znajdujących się pomiędzy brzegiem a wyspami, wprowadzenie "strefy ciszy");

Izolacja: ocena C

W okresie wędrówek występuje co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego gęsi zbożowej, gęsi białoczelnej, krzyżówki. Obszar jest również ważnym miejscem postoju dla kulik wielkiego i płaskonosa.

Gęś zbożowa - ocena ogólna B, w tym:

Populacja równomiernie występująca na terenie całego obszaru: 10000-41500 os., co stanowi ok 5-6% populacji szlaku wędrówkowego gatunku (wg Sikora i in. 2009; wg Fox i in. 2010) - ocena B ;

Zachowanie: ocena B, w tym: stopień zachowania siedliska: III - II elementy średnio zachowane lub częściowo zdegradowane (częściowo osuszone mokradła i zabagnienia),

możliwość odtworzenia: I - łatwe (wprowadzenie zakazu płoszenia i polowań, wprowadzenie "strefy ciszy");

Izolacja: ocena C.

Gęś białoczelna - ocena ogólna C, w tym:

Populacja równomiernie występująca na terenie całego obszaru: 1000-4500 os., co stanowi ok 1% populacji szlaku wędrówkowego gatunku (wg Sikora i in. 2009; wg Fox i in. 2010) - ocena C ;

Zachowanie: ocena B, w tym:

stopień zachowania siedliska: III - elementy średnio zachowane lub częściowo zdegradowane (częściowo osuszone mokradła i zabagnienia),

możliwość odtworzenia: I - łatwe (wprowadzenie zakazu płoszenia i polowań, wprowadzenie "strefy ciszy");

Izolacja: ocena C.

Krzyżówka - ocena ogólna C, w tym:

Populacja występująca na terenie całego obszaru, większe zagęszczenia występują w zachodniej części: 21000-22500 os., co stanowi ponad 1% populacji szlaku wędrówkowego gatunku (wg Sikora i in. 2007, wg Wilk i in. 2010) - ocena C ;

Zachowanie: ocena B, w tym:

stopień zachowania siedliska: III - elementy średnio zachowane lub częściowo zdegradowane (częściowo osuszone mokradła i zabagnienia),

możliwość odtworzenia: I - łatwe (wprowadzenie zakazu płoszenia i polowań, wprowadzenie "strefy ciszy");

Izolacja: ocena C.

Płaskonos - ocena ogólna C, w tym:

Populacja występująca na terenie całego obszaru, większe zagęszczenia występują w zachodniej części: 50-400 os., co stanowi ok 1% populacji szlaku wędrówkowego gatunku (wg Sikora i in. 2007, wg Wilk i in. 2010) - ocena C;

Zachowanie: ocena B, w tym:

stopień zachowania siedliska: III - elementy średnio zachowane lub częściowo zdegradowane (częściowo osuszone mokradła i zabagnienia),

możliwość odtworzenia: I - łatwe (wprowadzenie zakazu płoszenia i polowań, wprowadzenie "strefy ciszy");

Izolacja: ocena C.

Kulik wielki - ocena ogólna C, w tym:

Gatunek zagrożony globalnie (wg IUCN, kategoria NT - bliski zagrożenia). Populacja występująca w zachodniej części obszaru: 215-220 os., znacząco przekracza liczebności kwalifikujące (>30 os.), jedne z najwyższych w Polsce stad przy pojawieniu się odpowiedniego siedliska (wg Sikora i in. 2007, wg Wilk i in. 2010) - ocena C;

Zachowanie: ocena C, w tym:

stopień zachowania siedliska: III - elementy średnio zachowane lub częściowo zdegradowane (znacząco zmniejszona powierzchnia żerowisk w wyniku działalności kopalni żwiru, nieregularne lub odsłaniania żerowisk i miejsc odpoczynku, płoszenie),

możliwość odtworzenia: C - możliwe przy średnim nakładzie środków (usunięcie hałd ziemi znajdujących się na terenach żerowiskowych, wprowadzenie zmian w sposobie gospodarowania wodą, wprowadzenie zakazu płoszenia i polowań, wprowadzenie "strefy ciszy"); Izolacja: ocena C

4.3. Zagrożenia, presje i działania mające wpływ na obszar

Najważniejsze oddziaływania i działalność mające duży wpływ na obszar

Oddziaływania negatywne			
Poziom	Zagrożenia i presje [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnętrzne [i o b]
H	F03.01		i
M	F02.03		b
M	K03.04		i
M	J02.04		i
M	G01		i
H	K02.01		i
H	J02.03		i
Oddziaływania pozytywne			
Poziom	Działania, zarządzanie [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnętrzne [i o b]
M	X		i

Poziom: H = wysoki, M = średni, L = niski.

Zanieczyszczenie: N = stosowanie azotu, P = stosowanie fosforu/fosforanów, A = stosowanie kwasów/zakwaszanie, T = toksyczne chemikalia nieorganiczne,

O = toksyczne chemikalia organiczne, X = zanieczyszczenia mieszane.

i = wewnętrzne, o = zewnętrzne, b = jednocześnie.

4.4. Własność (opcjonalnie)

Typ		[%]
Publiczna	Krajowa/federalna	0
	Kraj	0
	związkowy/województwo	0
	Lokalna/gminna	0
	Inna publiczna	0
Własność łączna lub współwłasność		0
Prywatna		0
Nieznana		100
Suma		100

4.5. Dokumentacja (opcjonalnie)

Sikora A., Rhde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. 2007 Atlas rozmieszczenia ptaków legowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. 2010 Ostoje

5. STATUS OCHRONY OBSZARU (OPCJONALNIE)

5.1. Istniejące formy ochrony na poziomie krajowym i regionalnym:

[Powrót](#)

Kod	Pokrycie [%]	Kod	Pokrycie [%]	Kod	Pokrycie [%]
PL03	99.87				

5.2. Powiązanie opisanego obszaru z innymi formami ochrony:

na poziomie krajowym lub regionalnym:

Kod rodzaju	Nazwa terenu	Rodzaj	Pokrycie [%]
PL03	Park Krajobrazowy Dolina Bystrzycy	*	99.87

6. ZARZĄDZANIE OBSZAREM

6.1. Organ lub organy odpowiedzialne za zarządzanie obszarem:

[Powrót](#)

Organizacja:	Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Adres:	Polska plac Powstańców Warszawy 1 50-153 Wrocław
Adres e-mail:	sekretariat@rdos.wroclaw.pl

6.2. Plan(-y) zarządzania:

Aktualny plan zarządzania istnieje:

☐	Tak
☒	Nie, ale jest w przygotowaniu
☐	Nie

7. MAPA OBSZARU

[Powrót](#)

Nr ID INSPIRE:

PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB020004

Mapa załączona jako plik PDF w formacie elektronicznym (opcjonalnie)

☒ Tak ☐ Nie

Odniesienie lub odniesienia do oryginalnej mapy wykorzystanej przy digitalizacji granic elektronicznych
(opcjonalnie)

--