



NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

dla obszarów specjalnej ochrony (OSO),
proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (pOZW),
obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW) oraz
specjalnych obszarów ochrony (SOO)

OBSZAR PLB120001

NAZWA
OBSZARU Gorce

ZAWARTOŚĆ

- [1. IDENTYFIKACJA OBSZARU](#)
- [2. POŁOŻENIE OBSZARU](#)
- [3. INFORMACJE PRZYRODNICZE](#)
- [4. OPIS OBSZARU](#)
- [5. STATUS OCHRONY OBSZARU](#)
- [6. POWIĄZANIA OBSZARU](#)
- [7. MAPA OBSZARU](#)

1. IDENTYFIKACJA OBSZARU

1.1. Typ A	1.2. Kod obszaru PLB120001	Powrót
---------------	-------------------------------	------------------------

1.3. Nazwa obszaru

Gorce

1.4. Data opracowania 2002-05	1.5. Data aktualizacji 2024-11
----------------------------------	-----------------------------------

1.6. Instytucja lub osoba przygotowująca wniosek:

Nazwisko/Organizacja:	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Adres:	Polska Al. Jerozolimskie 136 Warszawa 02-305
Adres e-mail:	kancelaria@gdos.gov.pl

1.7. Data wskazania oraz objęcia formą ochrony/klasyfikacji terenu

Data zaklasyfikowania obszaru jako OSO:	2004-11
Krajowe odniesienie prawne dla formy ochrony OSO	rozp. MŚ z dn. 21.07.2004 r. w sprawie osop
Wyjaśnienia:	korekta granicy -rozp soos 02.2022

2. POŁOŻENIE OBSZARU

[Powrót](#)

2.1. Położenie centralnego punktu [wartości dziesiętne stopni]:

Długość geograficzna
20.1379

Szerokość geograficzna
49.5514

2.2. Powierzchnia [ha]:

7658.58

2.3. Obszar morski [%]

0.0

2.5. Kod i nazwa regionu administracyjnego

Kod poziomu NUTS 2

Nazwa regionu

PL21	Małopolskie
------	-------------

2.6. Region biogeograficzny

Alpejski (100.0
%)

3. INFORMACJE PRZYRODNICZE

[Powrót](#)

3.2. Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 2009/147/WE i gatunki wymienione w załączniku II do dyrektywy 92/43/EEG oraz ocena znaczenia obszaru dla tych gatunków

Gatunki					Populacja na obszarze						Ocena obszaru			
Grupa	Kod	Nazwa naukowa	S	NP	Typ	Wielkość		Jednostka	Kategoria	Jakość danych	A B C D	A B C		
						Min	Maks		C R V P		Populacja	Stan zachowania	Izolacja	Ogólnie
B	A223	Aegolius funereus			p	15	30	p		G	C	A	C	B
B	A229	Alcedo atthis			r	1	1	p		M	D			
B	A259	Anthus spinoletta			r	1	4	p		G	D			
B	A091	Aquila chrysaetos			p	1	1	p		M	C	A	C	C
B	A089	Aquila pomarina			r	1	2	p		G	D			
B	A104	Bonasa bonasia			p	50	100	p		M	C	A	C	B
B	A215	Bubo bubo			p	1	2	p		G	C	A	C	B
B	A030	Ciconia nigra			r	1	2	p		M	D			
B	A264	Cinclus cinclus			p	15	25	p		M	C	A	C	C
B	A122	Crex crex			r	1	3	p		M	D			
B	A239	Dendrocopos leucotos			p	25	40	p		G	B	B	B	B
B	A236	Dryocopus martius			p	15	25	p		G	D			

B	A321	Ficedula albicollis		r	15	20	p		M	D			
B	A320	Ficedula parva		r	70	130	p		G	C	A	C	B
B	A217	Glaucidium passerinum		p	15	30	p		G	C	B	C	B
B	A338	Lanius collurio		r	4	8	p		M	D			
B	A261	Motacilla cinerea		r	80	120	p		M	C	A	C	B
B	A072	Pernis apivorus		r	5	8	p		M	D			
B	A241	Picoides tridactylus		p	25	40	p		G	B	B	B	B
B	A234	Picus canus		p	5	10	p		G	D			
B	A220	Strix uralensis		p	15	25	p		G	C	A	C	B
B	A409	Tetrao tetrix tetrix		p	1	2	i		M	C	B	C	C
B	A108	Tetrao urogallus		p	10	25	i		G	B	B	A	B
B	A282	Turdus torquatus		r	30	60	p		M	B	B	B	B

- Grupa: A = płazy, B = ptaki, F = ryby, I = bezkręgowce, M = ssaki, P = rośliny, R = gady.
- S: jeśli dane o gatunku są szczególnie chronione i nie mogą być udostępnione publicznie, należy wpisać „tak”.
- NP: jeśli dany gatunek nie występuje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Typ: p = osiadłe, r = wydające potomstwo, c = przelotne, w = zimujące (w przypadku roślin i gatunków niemigrujących należy użyć terminu „osiadłe”).
- Jednostka: i = osobniki pojedyncze, p = pary lub inne jednostki według standardowego wykazu jednostek i kodów zgodnego ze sprawozdawczością na podstawie art. 12 i 17 (zob. [portal referencyjny](#)).
- Kategorie liczebności (kategoria): C = powszechne, R = rzadkie, V = bardzo rzadkie, P = obecne - wypełnić, jeżeli brak jest danych (DD), lub jako uzupełnienie informacji o wielkości populacji.
- Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. zgrubne dane szacunkowe); DD = brak danych (kategorię tę należy stosować wyłącznie, jeśli nie da się dokonać nawet zgrubnej oceny wielkości populacji - w takiej sytuacji można pozostawić puste pole dotyczące wielkości populacji, jednak pole „Kategorie liczebności” musi być wypełnione).

4. OPIS OBSZARU

4.1. Ogólna charakterystyka obszaru

[Powrót](#)

Klasa siedliska przyrodniczego	Pokrycie [%]
N10	0.42
N16	13.44
N09	1.26
N17	10.59
N19	74.25
N12	0.03

Dodatkowa charakterystyka obszaru:

Obszar obejmuje centralną część pasma górskiego Gorców (należących do Beskidów Zachodnich) w tym m.in. masywy Turbacza i Gorca. Obszar obejmuje górne partie zlewni rzeki Kamienicy i części niektórych innych zlewni gorczańskich wraz ze szczytami Jaworzyny (1288 m n.p.m.), Kudłonia (1276m) i Mostownicy (1251 m) w granicach Gorczańskiego Parku Narodowego oraz szczytem Turbacza (1310 m) i jego południowo-zachodnimi stokami poza terenem GPN. Teren w większości pokrywają lasy reglowe (95% powierzchni) z przewagą świerka, buka i jodły. Partie szczytowe gór zajmują rozległe polany, zarastające powoli lasem w wyniku ograniczenia lub całkowitego zaprzestania wypasu owiec i bydła. W skład regła górnego wchodzi bór świerkowy, w reglu dolnym panuje buczyna karpacka i zbiorowiska borowe, w dolinach potoków - olszynka karpacka.

4.2. Jakość i znaczenie

Obszar stanowi trzon ostoi ptaków i bioróżnorodności IBA (Important Bird and Biodiversity Area) PL132 Gorce. Na terenie obszaru stwierdzono ok. 140 gatunków ptaków, z których ponad 100 uznaje się za lęgowe. Występują tutaj co najmniej 24 gatunki z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej.

Gorce są jedną z ważniejszych w kraju ostoi lęgowych głąszca. Dobrze zachowane lasy o naturalnym charakterze stanowią odpowiednie siedlisko dla licznych populacji dzięciołów, z których na największą uwagę zasługują: dzięcioł trójpalczasty i białogrzioty. W Gorcach znajduje się znacząca część krajowej populacji niektórych sów, przede wszystkim: puszczyka uralskiego i sóweczki, ale występują tutaj również dwa inne rzadkie gatunki: puchacz i włochatka. Ważnym elementem gorczańskiej awifauny jest orzeł przedni.

Przedmiotami ochrony obszaru Gorce PLB120001 są następujące gatunki ptaków:

A091 - Orzeł przedni (*Aquila chrysaetos*)

Orły przednie gniazdują w drzewostanach dolnoreglowych, a ich żerowiska oprócz obszarów leśnych i polan reglowych, obejmują również rozległe obszary łąk i pastwisk znajdujące się w strefie pogórza. Wymagania siedliskowe sprawiają, że gatunek jest rozproszony i w sposób naturalny nieliczny. Obszar może być częścią terytorium 1 lub 2 par. Lęg z jednym młodym stwierdzono tutaj w 2011 roku. Gniazdo znajdowało się w lesie prywatnym blisko granicy GPN. Drugie gniazdo tej pary stwierdzono niedaleko już na terenie Parku jednak ptaki z niego nie korzystały ponieważ uszła jodła na której było ono wybudowane. Od tego czasu nie potwierdzono ponownie gnieźdzenia się orła przedniego na terenie GPN i najbliższego otoczenia. Inna para tego gatunku gnieździ się w paśmie Lubania na południowy-wschód od GPN. W ostatnich latach na terenie parku sporadycznie obserwowane są pojedyncze ptaki zarówno dorosłe jak i młodociane. Typ populacji oceniono jako p – osiadła. Populacja gatunku została oceniona na C. Nadana ocena wynika z oszacowania wielkości populacji i jej zagęszczenia w stosunku do populacji krajowej (28-34 pary). Stan zachowania oceniono jako doskonały – A. Ocenę oparto na bardzo dobrym stopniu zachowania cech siedliska gatunku. Izolację oceniono na C (populacja nieizolowana w obrębie rozległego obszaru występowania). Ocena ogólna wartości obszaru dla ochrony gatunku została określona jako znacząca - C.

A104 - Jarząbek (zwyczajny) (*Tetrastes bonasia*)

Jarząbek odpowiednie siedliska znajduje na terenie całego obszaru. Obserwowany we wszystkich typach lasów reglowych, choć liczniejszy jest w borach dolnoreglowych i drzewostanach liściastych ze znaczną domieszką drzew iglastych. Jego liczebność szacuje się na 50-100 par. Nie stwierdza się istotnych, negatywnych zmian w siedlisku i populacji. Populacja gatunku została oceniona na C. Nadana ocena wynika z oszacowania wielkości populacji i jej zagęszczenia w stosunku do populacji krajowej (15000-20000 par). Stan zachowania oceniono jako doskonały – A. Ocenę oparto na bardzo dobrym stopniu zachowania cech siedliska gatunku. Izolację oceniono na C (populacja nieizolowana w obrębie rozległego obszaru występowania). Ocena ogólna wartości obszaru dla ochrony gatunku została określona jako dobra - B.

A108 - Głuszc (zwyczajny) (*Tetrao urogallus*)

Głuszc występuje w górnoreglowym borze świerkowym i strefie przejściowej między reglami. Odpowiednia struktura drzewostanu z dużą ilością borówki czarnej w runie stwarza obecnie bardzo dobre warunki siedliskowe. Populacja w ostatnich latach jest stabilna albo wykazuje niewielki trend spadkowy. Liczebność szacowana na 10-25 osobników, może być zbyt mała, aby gatunek przetrwał w dłuższym przedziale czasowym. Ważne jest zatem utrzymanie łączności z sąsiednimi subpopulacjami, co zapewni wymianę materiału genetycznego i utrzymanie lub zwiększenie różnorodności genetycznej. Populacja gatunku została oceniona na B. Nadana ocena wynika z oszacowania wielkości populacji i jej zagęszczenia w stosunku do populacji krajowej (260-315 kogutów). Stan zachowania oceniono jako dobry - B. Ocenę oparto na dobrym

stopniu zachowania cech siedliska gatunku. Izolację oceniono na A (populacja izolowana). Ocenę nadano na podstawie stopnia izolacji populacji występującej w ostoi do naturalnego zasięgu gatunku. Ocena ogólna wartości obszaru dla ochrony gatunku została określona jako dobra – B.

A215 - Puchacz (zwyczajny) (*Bubo bubo*)

Puchacz to bardzo nieliczny ptak lęgowy. Populację w obszarze oszacowano na 1-2 pary. Dobrze zachowane, wiekowe drzewostany z polanami reglowymi i tereny otwarte (łąki i pastwiska) w strefie pogórza stwarzają odpowiednie warunki siedliskowe dla tego gatunku (Armatys 2006, Armatys 2015). Populacja gatunku została oceniona na C. Nadana ocena wynika z oszacowania wielkości populacji i jej zagęszczenia w stosunku do populacji krajowej (270-380 par). Stan zachowania oceniono jako doskonały – A. Ocenę oparto na bardzo dobrym stopniu zachowania cech siedliska gatunku. Izolację oceniono na C (populacja nieizolowana w obrębie rozległego obszaru występowania). Ocena ogólna wartości obszaru dla ochrony gatunku została określona jako dobra – B.

A217 - Sóweczka (zwyczajna) (*Glaucidium passerinum*)

Sóweczka występuje w świerczynach górnoreglowych oraz drzewostanach ze znacznym udziałem drzew iglastych w reglu dolnym. Jest gatunkiem nielicznym, a liczbę par ocenia się na 15-30. Nie stwierdza się istotnych, negatywnych zmian w siedlisku i populacji. Populacja gatunku została oceniona na C. Nadana ocena wynika z oszacowania wielkości populacji i jej zagęszczenia w stosunku do populacji krajowej (1400-1800 par). Stan zachowania oceniono jako dobry - B. Ocenę oparto na dobrym stopniu zachowania cech siedliska gatunku. Izolację oceniono na C (populacja nieizolowana w obrębie rozległego obszaru występowania). Ocena ogólna wartości obszaru dla ochrony gatunku została określona jako dobra – B.

A220 - Puszczyc uralski (*Strix uralensis*)

Puszczyc uralski występuje na terenie całego obszaru, ale najczęściej spotykany jest w lasach dolnoreglowych, gdzie jest gatunkiem nielicznym. Jego liczebność oceniono na 15-25 par. Nie stwierdza się istotnych, negatywnych zmian w siedlisku i populacji. Populacja gatunku została oceniona na C. Nadana ocena wynika z oszacowania wielkości populacji i jej zagęszczenia w stosunku do populacji krajowej (1300-1800 par). Stan zachowania oceniono jako doskonały – A. Ocenę oparto na bardzo dobrym stopniu zachowania cech siedliska gatunku. Izolację oceniono na C (populacja nieizolowana w obrębie rozległego obszaru występowania). Ocena ogólna wartości obszaru dla ochrony danego gatunku została określona jako dobra – B.

A223 - Włochatka (zwyczajna) (*Aegolius funereus*)

Włochatka występuje przede wszystkim w świerczynach górnoreglowych, ale spotykana jest również w drzewostanach ze znacznym udziałem drzew iglastych w reglu dolnym. Liczebność włochatki podlega silnym fluktuacjom związanym z liczebnością gryzoni. Liczbę par ocenia się na 15-30. Nie stwierdza się istotnych, negatywnych zmian w siedlisku i populacji. Jej występowaniu sprzyjają tereny otwarte w postaci polan reglowych. Populacja gatunku została oceniona na C. Nadana ocena wynika z oszacowania wielkości populacji i jej zagęszczenia w stosunku do populacji krajowej (1200-2400 par). Stan zachowania oceniono jako doskonały – A. Ocenę oparto na bardzo dobrym stopniu zachowania cech siedliska gatunku. Izolację oceniono na C (populacja nieizolowana w obrębie rozległego obszaru występowania). Ocena ogólna wartości obszaru dla ochrony danego gatunku została określona jako dobra – B.

A239 - Dzięcioł biało grzbiety (*Dendrocopos leucotos*)

Dzięcioł biało grzbiety występuje nielicznie głównie w drzewostanach dolnoreglowych i strefie przejściowej między regłem dolnym i górnym. Jego liczebność szacuje się na 25-40 par. Nie stwierdza się istotnych, negatywnych zmian w siedlisku i populacji. Dobrze zachowane lasy w dużej części objęte ochroną ścisłą zapewniają dzięciołom bardzo dobre warunki bytowania. Populacja gatunku została oceniona na B. Nadana ocena wynika z oszacowania wielkości populacji i jej zagęszczenia w stosunku do populacji krajowej (1500-2000 par). Stan zachowania oceniono jako dobry - B. Ocenę oparto na dobrym stopniu zachowania cech siedliska gatunku. Izolację oceniono na B populacja nieizolowana, ale występująca na peryferiach zasięgu gatunku). Ocenę nadano na podstawie stopnia izolacji populacji występującej w ostoi do naturalnego zasięgu gatunku. Ocena ogólna wartości obszaru dla ochrony gatunku została określona jako dobra – B.

A241 - Dzięcioł trójpalczasty (*Picoides tridactylus*)

Dzięcioł trójpalczasty jest gatunkiem nielicznym. Występuje głównie w górnoreglowych drzewostanach świerkowych, a także w lasach dolnoreglowych w dużym udziałem drzew iglastych. Jego liczebność szacuje się na 25-40 par. Zachodzący obecnie proces rozpadu świerczyn sprzyja występowaniu tego gatunku, ale trudno przewidzieć jaki to będzie miało wpływ na jego liczebność w przyszłości. Populacja gatunku została oceniona na B. Nadana ocena wynika z oszacowania wielkości populacji i jej zagęszczenia w stosunku do populacji krajowej (1000-1400 par). Stan zachowania oceniono jako dobry - B. Ocenę oparto na dobrym stopniu zachowania cech siedliska gatunku. Izolację oceniono na B (populacja nieizolowana, ale występująca

na peryferiach zasięgu gatunku). Ocenę nadano na podstawie stopnia izolacji populacji występującej w ostoi do naturalnego zasięgu gatunku. Ocena ogólna wartości obszaru dla ochrony danego gatunku została określona jako znakomita – B.

A261 - Pliszka górska (*Motacilla cinerea*)

Pliszka górska to średnio liczny ptak lęgowy na terenie obszaru - występuje niemal na wszystkich potokach w jego granicach. Niekiedy zasiedla nawet niewielkie cieki boczne, dlatego spotyka się ją zazwyczaj wyżej niż pluszcza. Liczebność pliszki górskiej szacuje się na 80–120 par. Nie stwierdza się istotnych, negatywnych zmian w siedlisku i populacji. Typ populacji określono jako r – populacja rozrodcza. Populacja gatunku została oceniona na C. Nadana ocena wynika z oszacowania wielkości populacji i jej zagęszczenia w stosunku do populacji krajowej (7000-10000 par). Stan zachowania oceniono jako doskonały – A. Ocenę oparto na bardzo dobrym stopniu zachowania cech siedliska gatunku. Izolację oceniono na C (populacja nieizolowana w obrębie rozległego obszaru występowania). Ocena ogólna wartości obszaru dla ochrony gatunku została określona jako dobra – B, co wynika z faktu, iż siedlisko pliszki górskiej jest w obszarze znacząco lepsze od średniej krajowej, populacja ta ważna jest dla ochrony zasięgu biogeograficznego, ponadto pliszka górska jest gatunkiem parasolowym.

A264 - Pluszcz (*Cinclus cinclus*)

Pluszcz występuje na wszystkich większych potokach na terenie obszaru. Jego liczebność szacuje się na 15–25 par. Nie stwierdza się istotnych, negatywnych zmian w siedlisku i populacji. Typ populacji oceniono jako p – osiadła. Populacja gatunku została oceniona na C. Nadana ocena wynika z oszacowania wielkości populacji i jej zagęszczenia w stosunku do populacji krajowej (1900-3000 par). Stan zachowania oceniono jako doskonały – A. Ocenę oparto na bardzo dobrym stopniu zachowania cech siedliska gatunku. Izolację oceniono na C (populacja nieizolowana w obrębie rozległego obszaru występowania). Ocena ogólna wartości obszaru dla ochrony gatunku została określona jako dobra – C, co wynika z faktu, iż siedlisko pluszcza w obszarze jest znacząco lepsze od średniej krajowej, populacja ta jest ważna dla ochrony zasięgu biogeograficznego, ponadto pluszcz jest gatunkiem parasolowym.

A282 - Drozd obrożny (*Turdus torquatus*)

Drozd obrożny to średnio liczny ptak lęgowy zamieszkujący świerczyny górnoreglowe szczególnie w pobliżu polan reglowych, a także spotykany w strefie przejściowej między reglami oraz rzadko w lasach dolnoreglowych ze znaczną domieszką drzew iglastych. Jego liczebność szacuje się na 30–60 par. Nie stwierdza się istotnych, negatywnych zmian w siedlisku i populacji. Populacja gatunku została oceniona na B. Nadana ocena wynika z oszacowania wielkości populacji i jej zagęszczenia w stosunku do populacji krajowej (1600-3200 par). Stan zachowania oceniono jako dobry - B. Ocenę oparto na dobrym stopniu zachowania cech siedliska gatunku. Izolację oceniono na B (populacja nieizolowana, ale występująca na peryferiach zasięgu gatunku). Ocenę nadano na podstawie stopnia izolacji populacji występującej w ostoi do naturalnego zasięgu gatunku. Ocena ogólna wartości obszaru dla ochrony gatunku została określona jako dobra – B, co wynika z faktu, iż siedlisko drozda obrożnego jest w obszarze znacząco lepsze od średniej krajowej, populacja ważna jest dla ochrony zasięgu biogeograficznego, ponadto jest on gatunkiem parasolowym.

A320 - Muchotłówka mała (*Ficedula parva*)

Muchotłówka mała występuje w obszarze głównie w starych lasach bukowych w reglu dolnym. W odpowiednich siedliskach jest to średnio liczny lub liczny ptak lęgowy. Jej liczebność szacuje się na 70-130 par. Nie stwierdza się istotnych, negatywnych zmian w siedlisku i populacji. Populacja gatunku została oceniona na C. Nadana ocena wynika z oszacowania wielkości populacji i jej zagęszczenia w stosunku do populacji krajowej (16000-32000 par). Stan zachowania oceniono jako doskonały – A. Ocenę oparto na bardzo dobrym stopniu zachowania cech siedliska gatunku. Izolację oceniono na C (populacja nieizolowana w obrębie rozległego obszaru występowania). Ocena ogólna wartości obszaru dla ochrony gatunku została określona jako dobra – B.

W przypadku następujących gatunków ptaków populacja występująca w obszarze została oceniona jako nieistotna D:

A030 - Bocian czarny (*Ciconia nigra*)

A072 - Trzmieljad (zwyczajny) (*Pernis apivorus*)

A089 - Orlik krzykliwy (*Clanga pomarina*)

A122 - Derkacz (*Crex crex*)

A229 - Zimorodek (*Alcedo atthis*)

A234 - Dzięcioł zielonosiwy (*Picus canus*)

A236 - Dzięcioł czarny (*Dryocopus martius*)

A259 - Siwerniak (*Anthus spinoletta*)

A321 - Muchotłówka białoszyja (*Ficedula albicollis*)

A338 - Gąsiorek (*Lanius collurio*)

A409 - Cietrzew (*Lyrurus tetrix*)

4.3. Zagrożenia, presje i działania mające wpływ na obszar

Najważniejsze oddziaływania i działalność mające duży wpływ na obszar

Oddziaływania negatywne			
Poziom	Zagrożenia i presje [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnątrzne [i o b]
M	D01.01		i
M	H04		o
H	A03.03		b
H	A04.03		b
M	B02.04		b
M	E01.03		b
M	G01.03		b
M	K02		b
Oddziaływania pozytywne			
Poziom	Działania, zarządzanie [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnątrzne [i o b]
M	A03.02		b
M	A04.02		b

Poziom: H = wysoki, M = średni, L = niski.

Zanieczyszczenie: N = stosowanie azotu, P = stosowanie fosforu/fosforanów, A = stosowanie kwasów/zakwaszanie, T = toksyczne chemikalia nieorganiczne,

O = toksyczne chemikalia organiczne, X = zanieczyszczenia mieszane.

i = wewnętrzne, o = zewnętrzne, b = jednocześnie.

4.4. Własność (opcjonalnie)

Typ		[%]
Publiczna	Krajowa/federalna	0
	Kraj	0
	związkowy/województwo	0
	Lokalna/gminna	0
	Inna publiczna	0
Własność łączna lub współwłasność		0
Prywatna		0
Nieznana		100
Suma		100

4.5. Dokumentacja (opcjonalnie)

1. Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. (red.). 2010. Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce. OTOP, Marki. 2. Żurek Z., Armatus P. 2013. Występowanie głązka *Tetrao urogallus* L. w Górcach; koncepcja ochrony. Opracowanie projektu planu ochrony Górczańskiego Parku Narodowego i planu zadań

ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLH 120018 Ostoja Gorczańska. Operat fauny. Manuskrypt.3. Wierzbowska I. (red.). 2014. Plan Ochrony Gorczańskiego Parku Narodowego. Operat ochrony fauny, kręgowce cz. IV Ptaki. Poręba Wielka.4. Żurek Z., Armatys P., Tomasiewicz J. 2014. Gorczańskie głuszce. Łowiec Tarnowski. 1/2014(14): 19–22.5. Wilk T., Bobrek R., Pępkowska-Król A., Neubauer G., Kosicki J.Z. (red.) 2016. Ptaki polskich Karpat – stan, zagrożenia, ochrona. OTOP, Marki.6. Chodkiewicz T., Chylarecki P., Sikora A., Wardecki Ł., Bobrek R., Neubauer G., Marchowski D., Dmoch A., Kuczyński L. 2019. Raport z wdrażania art. 12 Dyrektywy Ptasiej w Polsce w latach 2013-2018: stan, zmiany, zagrożenia. Biuletyn Monitoringu Przyrody 20: 1–80.7. Szczepański S., Santorek A., Dulisz B., Żurek Z., Armatys P., Rutkowski R. 2019. How many of them? Genetic diversity, survival and effective population size of the capercaillie population from the Gorce Mountains. Fragmenta Faunistica 62(2):135–144. DOI10.3161/00159301FF2019.62.2.144.8. Zawadzka D., Żurek Z., Armatys P., Stachyra P., Szewczyk P., Korga M., Merta D., Kobielski J., Kmiec M., Pregler B., Krzan P., Rzońca Z., Zawadzki G., Zawadzki J., Sołtys B., Bielański J., Czaja J., Flis-Martyniuk E., Wediuk A., Rutkowski R. & Krzywiński A. 2019. Liczebność i rozmieszczenie głuszca w Polsce w XXI wieku. Sylwan 163, 9: 773–783. <https://doi.org/10.26202/sylwan.2019029.9>. Żurek Z. & Armatys P. 2019. Głuszc Tetrao urogallus L. w polskich Karpatach Zachodnich – występowanie, zagrożenia i działania ochronne w świetle Krajowego Programu Ochrony Głuszca. [W:] Biologia, ekologia i ochrona kuraków w Polsce i Europie. Monografia pokonferencyjna, Kliczków, 6–7.09.2017. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych.10. Armatys P. 2015. Skrzydlaci mieszkańcy Gorców. Gorczański Park Narodowy. Poręba Wielka.11. Santorek A., Armatys P., Pregler B., Zwijacz-Kozica T., Żurek Z., Hotała P., Brozik W., Rutkowski R. 2024. Genetic diversity of the Carpathian capercaillie in space and time. Folia Forestalia Polonica, Series A – Forestry, Vol. 66 (1), 46–60.12. Baza danych obserwacji przyrodniczych. Gorczański Park Narodowy.

5. STATUS OCHRONY OBSZARU (OPCJONALNIE)

5.1. Istniejące formy ochrony na poziomie krajowym i regionalnym:

[Powrót](#)

Kod	Pokrycie [%]	Kod	Pokrycie [%]	Kod	Pokrycie [%]
PL04	9.92	PL01	89.11		

5.2. Powiązanie opisanego obszaru z innymi formami ochrony:

na poziomie krajowym lub regionalnym:

Kod rodzaju	Nazwa terenu	Rodzaj	Pokrycie [%]
PL01	Gorczański Park Narodowy	*	89.11
PL04	Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu	*	9.92

6. ZARZĄDZANIE OBSZAREM

6.1. Organ lub organy odpowiedzialne za zarządzanie obszarem:

[Powrót](#)

Organizacja:	Gorczański Park Narodowy
Adres:	Polska Poręba Wielka 590 34-735 Niedźwiedź
Adres e-mail:	gpn@gorcepn.pl
Organizacja:	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie

Adres:	Polska Mogilska 25 31-542 Kraków
Adres e-mail:	sekretariat@krakow.rdos.gov.pl

6.2. Plan(-y) zarządzania:

Aktualny plan zarządzania istnieje:

☒	Tak	Nazwa: Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Gorczańskiego Parku Narodowego Link: https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000057901.pdf
☐	Nie, ale jest w przygotowaniu	
☐	Nie	

7. MAPA OBSZARU

[Powrót](#)

Nr ID INSPIRE:	PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB120001
----------------	-----------------------------

Mapa załączona jako plik PDF w formacie elektronicznym (opcjonalnie)

☒	Tak	☐	Nie
-------------------------------------	-----	--------------------------	-----

Odniesienie lub odniesienia do oryginalnej mapy wykorzystanej przy digitalizacji granic elektronicznych (opcjonalnie)

--