



NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

dla obszarów specjalnej ochrony (OSO),
proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (pOZW),
obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW) oraz
specjalnych obszarów ochrony (SOO)

OBSZAR PLB140002
NAZWA
OBSZARU Dolina Liwca

ZAWARTOŚĆ

- [1. IDENTYFIKACJA OBSZARU](#)
- [2. POŁOŻENIE OBSZARU](#)
- [3. INFORMACJE PRZYRODNICZE](#)
- [4. OPIS OBSZARU](#)
- [5. STATUS OCHRONY OBSZARU](#)
- [6. POWIĄZANIA OBSZARU](#)
- [7. MAPA OBSZARU](#)

1. IDENTYFIKACJA OBSZARU

1.1. Typ A	1.2. Kod obszaru PLB140002	Powrót
---------------	-------------------------------	------------------------

1.3. Nazwa obszaru

Dolina Liwca

1.4. Data opracowania 2002-07	1.5. Data aktualizacji 2024-06
----------------------------------	-----------------------------------

1.6. Instytucja lub osoba przygotowująca wniosek:

Nazwisko/Organizacja:	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Adres:	Polska Al. Jerozolimskie 136 Warszawa 02-305
Adres e-mail:	kancelaria@gdos.gov.pl

1.7. Data wskazania oraz objęcia formą ochrony/klasyfikacji terenu

Data zaklasyfikowania obszaru jako OSO:	2004-11
Krajowe odniesienie prawne dla formy ochrony OSO	rozp. MŚ z dn. 21.07.2004 r. w sprawie osop

2. POŁOŻENIE OBSZARU

2.1. Położenie centralnego punktu [wartości dziesiętne stopni]:

21.978

52.3466

27431.51

0.0

2.5. Kod i nazwa regionu administracyjnego

Nazwa regionu

PL12	Mazowieckie
------	-------------

2.6. Region biogeograficzny

Kontynentalny (100.0 %)

3. INFORMACJE PRZYRODNICZE

[Powrót](#)

3.2. Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 2009/147/WE i gatunki wymienione w załączniku II do dyrektywy 92/43/EEG oraz ocena znaczenia obszaru dla tych gatunków

[illegible]

[illegible]

B	A118	aquaticus		r	30	33	p		M	D			
B	A336	Remiz pendulinus		r	15	35	p		M	C	C	C	C
B	A193	Sterna hirundo		r	1	1	p		M	D			
B	A165	Tringa ochropus		r	8	8	p		M	D			
B	A162	Tringa totanus		r	7	7	p		M	D			
B	A142	Vanellus vanellus		c	1000	4000	i		M	D			
B	A142	Vanellus vanellus		r	79	79	p		G	D			

- Grupa: A = płazy, B = ptaki, F = ryby, I = bezkręgowce, M = ssaki, P = rośliny, R = gady.
- S: jeśli dane o gatunku są szczególnie chronione i nie mogą być udostępnione publicznie, należy wpisać „tak”.
- NP: jeśli dany gatunek nie występuje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Typ: p = osiadłe, r = wydające potomstwo, c = przelotne, w = zimujące (w przypadku roślin i gatunków niemigrujących należy użyć terminu „osiadłe”).
- Jednostka: i = osobniki pojedyncze, p = pary lub inne jednostki według standardowego wykazu jednostek i kodów zgodnego ze sprawozdawczością na podstawie art. 12 i 17 (zob. [portal referencyjny](#)).
- Kategorie liczebności (kategoria): C = powszechne, R = rzadkie, V = bardzo rzadkie, P = obecne - wypełnić, jeżeli brak jest danych (DD), lub jako uzupełnienie informacji o wielkości populacji.
- Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. zgrubne dane szacunkowe); DD = brak danych (kategorię tę należy stosować wyłącznie, jeśli nie da się dokonać nawet zgrubnej oceny wielkości populacji - w takiej sytuacji można pozostawić puste pole dotyczące wielkości populacji, jednak pole „Kategorie liczebności” musi być wypełnione).

4. OPIS OBSZARU

4.1. Ogólna charakterystyka obszaru

[Powrót](#)

Klasa siedliska przyrodniczego	Pokrycie [%]
N07	0.09
N06	1.01
N23	1.5
N17	4.8
N21	0.11
N10	43.82
N19	3.94
N16	8.01
N12	36.72
Ogółem pokrycia siedliska przyrodniczego	100

Dodatkowa charakterystyka obszaru:

Obszar obejmuje dolinę rzeki Liwiec, od źródeł do ujścia rzeki do Bugu, z łąkami i zalewowymi pastwiskami utworzonymi na zmeliorowanych bagnach. Niektóre odcinki rzeki mają charakter naturalny, na innych

odcinkach jest ona uregulowana, lokalnie w dolinie występują wtórne zabagnienia. Miejscami brzegi Liwca są płaskie, zajęte przez łąki i wilgotne, zalewane pastwiska, na innych odcinkach brzegi są wysokie. W dolinie przeważają łąki i pastwiska, lokalnie występują łęgi olchowe i olchowo-jesionowe oraz niewielkie kompleksy leśne, z dominującym udziałem sosny. Podłoże stanowią tu gleby mineralne. Na terenie obszaru znajdują się dwa kompleksy stawów rybnych (48 ha i 70 ha) oraz trzeci kompleks stawów rybnych w Mordach. W latach 1992 i 1993 najcenniejsze pod względem ornitologicznym fragmenty doliny zostały zmeliorowane.

4.2. Jakość i znaczenie

Przedmiotami ochrony w obszarze są ptaki: brodziec piskliwy, cyraneczka, cyranka, gęgawa, dziwonia, rybitwa białowłosa i czarna, bocian biały, błotniak stawowy, kszczyk, żuraw, rycyk, kulik wielki i derkacz, gatunki ujęte w Załączniku I Dyrektywy ptasiej.

A168 Brodziec piskliwy *Actitis hypoleucos*

Siedliska gatunku w obszarze zachowane są w stopniu bardzo dobrym. Gatunek zasiedla środkowy i dolny bieg Liwca, na którym rzeka ma charakter naturalny, meandruje tworząc odsypiska i zakola wykorzystywane przez brodziec. Siedlisko występowania jest zachowane, a gatunek utrzymuje liczebność w obszarze zasiedlając wszystkie dostępne dla niego siedliska. Najważniejsze dla jego ochrony jest zachowanie naturalności środkowego i dolnego biegu Liwca. Liczebność gatunku oszacowano na 30 – 60 par co stanowi 1,7 % populacji krajowej (Wilk 2020) w związku z powyższym wskaźnikowi populacji nadano ocenę C. Stan zachowania ocenia się jako dobry B. Populacja nieizolowana w obrębie rozległego obszaru występowania – ocena C. Na podstawie powyższych kryteriów, wartość obszaru dla ochrony gatunku ocenia się jako dobrą B.

A052 Cyraneczka *Anas crecca*

Siedliskami cyraneczki w obszarze są przede wszystkim kompleksy stawów rybnych. Stan zachowania gatunku można ocenić korzystnie (zwłaszcza na Stawach Siedleckich i Klimontach). Perspektywy ochrony cyraneczki ocenia się jako niepewne, co wynika ze stwierdzonej niskiej liczebności w 2022 r., pomimo zachowanego siedliska gatunku, oraz niekorzystnych trendów populacyjnych i słabego rozpoznania w skali kraju. Liczebność gatunku oszacowano na 1-6 par co stanowi mniej niż 2 % populacji krajowej (Wilk 2020) w związku z powyższym wskaźnikowi populacji nadano ocenę C. Siedliskami cyraneczki w obszarze są przede wszystkim kompleksy stawów rybnych. Podobnie jak w przypadku pozostałych gatunków związanych z tym siedliskiem, jego stan zachowania można ocenić korzystnie (zwłaszcza na Stawach Siedleckich i Klimontach). Wydaje się więc, że niska liczebność gatunku nie wynika z braku odpowiednich siedlisk lęgowych, ale odgrywają tu rolę czynniki ponadlokalne. Stan zachowania ocenia się jako dobry B. Populacja nieizolowana w obrębie rozległego obszaru występowania C. Na podstawie powyższych kryteriów, wartość obszaru dla ochrony gatunku ocenia się jako znaczącą C.

A055 Cyranka *Spatula querquedula*

Siedliskami cyranki w obszarze są kompleksy stawów rybnych oraz podmokłe łąki i starorzecza wzdłuż koryta Liwca. W odniesieniu do kompleksów stawowych, siedlisko zachowane jest bardzo dobrze na Stawach Siedleckich i Klimontach, natomiast gorzej na stawach w Czołomyjach i Jarnicach. W skali obszaru stan zachowania siedliska gatunku ocenia się jednak jako właściwy (FV). Perspektywy ochrony cyranki ocenia się jako generalnie korzystne. W skali doliny dostępność siedlisk jest wystarczająca dla utrzymania populacji. Liczebność gatunku oszacowano na 3-13 par co stanowi mniej niż 2 % populacji krajowej (Wilk 2020) w związku z powyższym wskaźnikowi populacji nadano ocenę C. Stan zachowania ocenia się jako dobry B. Populacja nieizolowana w obrębie rozległego obszaru występowania C. Na podstawie powyższych kryteriów, wartość obszaru dla ochrony gatunku ocenia się jako znaczącą C.

A043 Gęgawa *Anser anser*

Siedliskami gęgawy w obszarze są kompleksy stawów rybnych oraz – rzadziej - starorzecza i trzcinowiska wzdłuż doliny. W odniesieniu do kompleksów stawowych, można stwierdzić, że siedlisko zachowane jest bardzo dobrze na Stawach Siedleckich i Klimontach, natomiast gorzej na stawach w Czołomyjach i Jarnicach. Perspektywy ochrony cyranki ocenia się jako generalnie korzystne. W skali doliny dostępność siedlisk jest wystarczająca dla utrzymania populacji. Liczebność gatunku oszacowano na 7-28 par co stanowi mniej niż 2 % populacji krajowej (Wilk 2020) w związku z powyższym wskaźnikowi populacji nadano ocenę C. Stan zachowania ocenia się jako średni C. Populacja nieizolowana w obrębie rozległego obszaru występowania C. Na podstawie powyższych kryteriów, wartość obszaru dla ochrony gatunku ocenia się jako

znaczącą C.

A371 Dziwonia *Erythrina erythrina*

Siedliska dziwonii, dzięki mozaikowości obszaru, można uznać za zachowane w dość dobrym stanie. Szczególnie preferowane są obszary podmokłych zakrzaczeń w otoczeniu terenów otwartych. Obserwowany od lat spadek populacji gatunku może mieć źródła niezwiązane ze stanem lokalnego siedliska. Stan zachowania siedliska dziwonii ocenia się jako właściwy (FV). Liczebność gatunku oszacowano na 30-56 par co stanowi mniej niż 2 % populacji krajowej (Wilk 2020) w związku z powyższym wskaźnikowi populacji nadano ocenę C. Stan zachowania ocenia się jako dobry B. Populacja nieizolowana w obrębie rozległego obszaru występowania C. Na podstawie powyższych kryteriów, wartość obszaru dla ochrony gatunku ocenia się jako dobrą B.

A196 Rybitwa białowąsa *Chlidonias hybrida*

Gatunek ten nie był wykazywany jako lęgowy zarówno w latach 2011 jak i 2019. Wyjątek stanowi rok 2022 r. gdzie stwierdzono 85 par tego gatunku. Rybitwa białowąsa gniazdowała w 2022 r. w Dolinie Liwca tylko na Stawach Siedleckich, gdzie stwierdzono 85 par. W okresie migracji wiosennej oraz w okresie połęgowym niewielkie grupy ptaków obserwowano także na stawach w Czołomyjach. Zarówno jednak Czołomyje, jak i pozostałe kompleksy stawowe, nie stwarzają dogodnych warunków dla gniazdowania gatunku. W roku 2022 na jednej z kwater Stawów Siedleckich panowały doskonałe warunki do rozrodu rybitwy białowąsej, dzięki pływającemu kożuchowi części roślin powstałym po renowacji tej kwatery. Jednakże w perspektywie trudno spodziewać się aby takie warunki tworzyły się corocznie. Liczebność gatunku szacowana jest na 26-29 par co stanowi powyżej 2 % populacji krajowej (Wilk 2020) w związku z powyższym wskaźnikowi populacji nadano ocenę B. Stan zachowania ocenia się jako średni C. Populacja nieizolowana w obrębie rozległego obszaru występowania C. Na podstawie powyższych kryteriów, wartość obszaru dla ochrony gatunku ocenia się jako dobrą B.

A031 Bocian biały *Ciconia ciconia*

Siedliska bociana białego w obszarze zachowane są w stopniu odpowiednim (FV). Gatunek zasiedla obszary zabudowane w otoczeniu terenów otwartych o różnym charakterze, wykorzystywane w celu zdobywania pokarmu. Mozaikowy i w wielu fragmentach tradycyjny charakter doliny Liwca sprzyja występowaniu gatunku. Bocian biały wykazuje dość dużą plastyczność, więc w mniejszym stopniu narażony jest na praktyki rolnicze, choćby wczesny pokos, który oddziałuje negatywnie na inne gatunki np. derkacza. Perspektywy ochrony bociana białego ocenia się jako bardzo dobre (FV). Siedlisko występowania jest zachowane, a ponadto odnotowano dużą podaż miejsc lęgowych (w tym pustych platform gniazdowych). Liczebność gatunku oszacowano na 75-85 par co stanowi mniej niż 2 % populacji krajowej (Wilk 2020) w związku z powyższym wskaźnikowi populacji nadano ocenę C. Stan zachowania ocenia się jako dobry B. Populacja nieizolowana w obrębie rozległego obszaru występowania C. Na podstawie powyższych kryteriów, wartość obszaru dla ochrony gatunku ocenia się jako znaczącą C.

A081 Błotniak stawowy *Circus aeruginosus*

Siedliskami błotniaka w obszarze są kompleksy stawów rybnych oraz starorzecza i trzcinowiska wzdłuż doliny. W przypadku kompleksów stawowych, siedlisko zachowane jest bardzo dobrze na Stawach Siedleckich i Klimontach, natomiast gorzej na stawach w Czołomyjach i Jarnicach. W całej dolinie występuje jednak dużo potencjalnych miejsc lęgowych dla gatunku, stąd też stan zachowania siedliska błotniaka ocenia się jako właściwy (FV). Liczebność gatunku oszacowano na 24-50 rozmnażających się samic co stanowi mniej niż 2 % populacji krajowej (Wilk 2020) w związku z powyższym wskaźnikowi populacji nadano ocenę C. Stan zachowania ocenia się jako dobry B. Populacja nieizolowana w obrębie rozległego obszaru występowania C. Na podstawie powyższych kryteriów, wartość obszaru dla ochrony gatunku ocenia się jako znaczącą C.

A153 Kszyk *Gallinago gallinago*

Siedliska kszyka w obszarze zachowane są w stopniu dobrym. Zasiedla on nie tylko podmokłe łąki i turzycowiska w otwartym krajobrazie rolniczym, ale także szuwały, zakrzaczenia i podmokłe lasy, w które obfituje dolina Liwca. Problem w obszarach łąkowych może stanowić lokalne zaniechanie koszenia lub przeciwnie – zbyt intensywne i wczesne kosze-nie. Stan zachowania siedliska gatunku ocenia się jako właściwy (FV). Perspektywy ochrony kszyka ocenia się jako dobre (FV). Dostępność siedlisk w dolinie jest duża, a gatunek miejscami osiąga wysokie zagęszczenia. Nie odnotowuje się istotnych zagrożeń związanych z zagospodarowaniem gruntów. Liczebność gatunku oszacowano na 93-100 par co stanowi

mniej niż 2 % populacji krajowej (Wilk 2020) w związku z powyższym wskaźnikowi populacji nadano ocenę C. Stan zachowania ocenia się jako dobry B. Populacja nieizolowana w obrębie rozległego obszaru występowania C. Na podstawie powyższych kryteriów, wartość obszaru dla ochrony gatunku ocenia się jako znaczącą C.

A127 Żuraw *Grus grus*

Siedliska żurawia w obszarze zachowane są w stopniu odpowiednim. Gatunek zasiedla mozaikowy krajobraz z udziałem niewielkich zadrzewień i lasów, które wykorzystuje jako miejsca lęgowe. Duża naturalność i zróżnicowany charakter sprzyjają występowaniu gatunku. Stąd też stan zachowania siedliska żurawia ocenia się jako właściwy. Perspektywy ochrony żurawia ocenia się jako bardzo dobre (FV). Siedlisko występowania jest zachowane, a gatunek prawdopodobnie zwiększa liczebność w obszarze zajmując wszystkie dostępne dla niego siedliska. Liczebność gatunku oszacowano na 39-80 par co stanowi mniej niż 2 % populacji krajowej (Wilk 2020) w związku z powyższym wskaźnikowi populacji nadano ocenę C. Stan zachowania ocenia się jako dobry B. Populacja nieizolowana w obrębie rozległego obszaru występowania C. Na podstawie powyższych kryteriów, wartość obszaru dla ochrony gatunku ocenia się jako znaczącą C.

A156 Rycyk *Limosa limosa*

Siedliska rycyka w obszarze zachowane są w stopniu dobrym, choć ściśle przywiązanie gatunku do podmokłych łąk i pastwisk czyni go wrażliwym na przesuszenie siedlisk, zarówno z powodu zmian warunków hydrologicznych jak i przekształceń antropogenicznych. Liczebność gatunku oszacowano na 5-12 par co stanowi mniej niż 2 % populacji krajowej (Wilk 2020) w związku z powyższym wskaźnikowi populacji nadano ocenę C. Stan zachowania ocenia się jako dobry B. Populacja nieizolowana w obrębie rozległego obszaru występowania C. Na podstawie powyższych kryteriów, wartość obszaru dla ochrony gatunku ocenia się jako znaczącą C.

A160 Kulik wielki *Numenius arquata*

Siedliska kulika wielkiego w obszarze zachowane są w stopniu dobrym, choć ściśle przywiązanie gatunku do podmokłych łąk i pastwisk czyni go wrażliwym na przesuszenie siedlisk, zarówno z powodu zmian warunków hydrologicznych jak i przekształceń antropogenicznych. Problem w obszarach łąkowych może stanowić lokalne zaniechanie koszenia lub przeciwnie – zbyt intensywne i wczesne koszenie. Niemniej jednak stan zachowania siedliska gatunku ocenia się jako właściwy (FV). Liczebność gatunku oszacowano na 2-4 pary co stanowi mniej niż 2 % populacji krajowej (Wilk 2020) w związku z powyższym wskaźnikowi populacji nadano ocenę C. Stan zachowania ocenia się jako dobry B. Populacja nieizolowana w obrębie rozległego obszaru występowania C. Na podstawie powyższych kryteriów, wartość obszaru dla ochrony gatunku ocenia się jako znaczącą C.

A197 Rybitwa czarna *Chlidonias niger*

Gatunek gniazduje w Dolinie Liwca tylko na Stawach Siedleckich. Pozostałe kompleksy stawowe nie stwarzają dogodnych warunków dla gniazdowania gatunku. Nie stwierdzono również prób gniazdowania na starorzeczach wzdłuż biegu Liwca. W roku 2022 na jednej z kwater Stawów Siedleckich panowały doskonałe warunki do rozrodu rybitwy czarnej, dzięki pływającemu kożuchowi części roślin powstałym po renowacji tej kwatery. Jednakże w perspektywie trudno spodziewać się aby takie warunki tworzyły się corocznie, więc gatunek ten będzie wykorzystywał gorsze siedlisko lub zaprzestanie lęgów na stawach. Pozostałe kompleksy stawowe albo nie posiadają otwartego lustra wody, przedstawiając raczej charakter bagiennych szuwarów i zakrzaczeń (Klimonty), albo są intensywnie zagospodarowane (Jarnice, Czołomyje). Dlatego też stan zachowania siedliska gatunku ocenia się jako niezadowolający (U1). Liczebność gatunku oszacowano na 8-27 par co stanowi mniej niż 2 % populacji krajowej w związku z powyższym wskaźnikowi populacji nadano ocenę C. Stan zachowania ocenia się jako średni C. Populacja nieizolowana w obrębie rozległego obszaru występowania C. Na podstawie powyższych kryteriów, wartość obszaru dla ochrony gatunku ocenia się jako znaczącą C.

A122 Derkacz *Crex crex*

W dolnej części doliny Liwca derkacz występuje dużo rzadziej niż w części górnej. gatunek może fluktuować w zależności od warunków danego roku, jednak kolejny cykl monitoringu (2018 i 2022) wykazuje dość niską liczebność derkacza, która utrzymuje się na poziomie dużo niższym niż przed 10 laty. Liczebność gatunku stanowi mniej niż 2 % populacji krajowej w związku z powyższym wskaźnikowi populacji nadano ocenę C. Stan zachowania ocenia się jako średni C. Populacja nieizolowana w obrębie rozległego obszaru

występowania C. Na podstawie powyższych kryteriów, wartość obszaru dla ochrony gatunku ocenia się jako znaczącą C.

Oceny gatunków dokonano na podstawie dokumentacji do planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 [2] oraz ekspertyz przyrodniczych [1,3,4,5]

4.3. Zagrożenia, presje i działania mające wpływ na obszar

Najważniejsze oddziaływania i działalność mające duży wpływ na obszar

Oddziaływania negatywne			
Poziom	Zagrożenia i presje [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnętrzne [i o b]
H	G01		i
H	F01.01		i
H	A03.01		i
Oddziaływania pozytywne			
Poziom	Działania, zarządzanie [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnętrzne [i o b]
M	A10.01		i
M	M01.02		i

Poziom: H = wysoki, M = średni, L = niski.

Zanieczyszczenie: N = stosowanie azotu, P = stosowanie fosforu/fosforanów, A = stosowanie kwasów/zakwaszanie, T = toksyczne chemikalia nieorganiczne,

O = toksyczne chemikalia organiczne, X = zanieczyszczenia mieszane.

i = wewnętrzne, o = zewnętrzne, b = jednocześnie.

4.4. Własność (opcjonalnie)

Typ		[%]
Publiczna	Krajowa/federalna	0
	Kraj	0
	związkowy/województwo	0
	Lokalna/gminna	0
	Inna publiczna	0
Własność łączna lub współwłasność		0
Prywatna		0
Nieznana		100
Suma		100

4.5. Dokumentacja (opcjonalnie)

1. Dombrowski A. i inni; 2011; Inwentaryzacja populacji gatunków ptaków, dla ochrony których został wyznaczony obszar Natura 2000 "Dolina Liwca" (SYMBOL PLB 140002) wraz z weryfikacją i oceną stanu przedmiotu ochrony; Warszawa. 2. Dokumentacja do planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 Dolina Liwca PLB140002; 2012. 3. Jobda M, Szałański P i inni.; 2018; Ekspertyza Przyrodnicza, z inwentaryzacji oraz oceny stanowisk i siedlisk derkacza na obszarze Natura 2000 Dolina Liwca PLB140002 w roku 2018. 4. Falkowski M., Brylak Ł.; 2019; Uzupełnienie stanu wiedzy na obszarze Natura 2000 Dolina Liwca PLB140002 – ptaki: A156, A160, A142, A153, A031, A081, A140, A127, A196, A197, A043, A052, 055, A168, A336 oraz

5. STATUS OCHRONY OBSZARU (OPCJONALNIE)

[Powrót](#)

5.1. Istniejące formy ochrony na poziomie krajowym i regionalnym:

Kod	Pokrycie [%]	Kod	Pokrycie [%]	Kod	Pokrycie [%]
PL03	0.0	PL04	15.45	PL02	1.28

5.2. Powiązanie opisanego obszaru z innymi formami ochrony:

na poziomie krajowym lub regionalnym:

Kod rodzaju	Nazwa terenu	Rodzaj	Pokrycie [%]
PL04	Siedlecko-Węgrowski	*	15.45
PL03	Nadbużański Park Krajobrazowy	*	0.0
PL02	Stawy Siedleckie	*	0.88
PL02	Klimonty	+	0.41

6. ZARZĄDZANIE OBSZAREM

[Powrót](#)

6.1. Organ lub organy odpowiedzialne za zarządzanie obszarem:

Organizacja:	Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
Adres:	Polska Henryka Sienkiewicza 3 00-015 Warszawa
Adres e-mail:	sekretariat@warszawa.rdos.gov.pl

6.2. Plan(-y) zarządzania:

Aktualny plan zarządzania istnieje:

☒ Tak	Nazwa: ZARZĄDZENIE NR 12 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Liwca PLB140002 Link: https://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2014/3825/ Nazwa: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 29 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Liwca PLB140002 Link: https://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2014/9970/ Nazwa: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 7 lipca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Liwca PLB140002 Link: https://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2016/6535/
--	--

Nazwa: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Liwca PLB140002

Link: <https://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2023/4644/>

☐ Nie, ale jest w przygotowaniu

☐ Nie

7. MAPA OBSZARU

[Powrót](#)

Nr ID INSPIRE:

PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB140002

Mapa załączona jako plik PDF w formacie elektronicznym (opcjonalnie)

☒ Tak ☐ Nie

Odniesienie lub odniesienia do oryginalnej mapy wykorzystanej przy digitalizacji granic elektronicznych (opcjonalnie)