



NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

dla obszarów specjalnej ochrony (OSO),
proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (pOZW),
obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW) oraz
specjalnych obszarów ochrony (SOO)

OBSZAR PLB320008

NAZWA
OBSZARU Ostoja Ińska

ZAWARTOŚĆ

- [1. IDENTYFIKACJA OBSZARU](#)
- [2. POŁOŻENIE OBSZARU](#)
- [3. INFORMACJE PRZYRODNICZE](#)
- [4. OPIS OBSZARU](#)
- [5. STATUS OCHRONY OBSZARU](#)
- [6. POWIĄZANIA OBSZARU](#)
- [7. MAPA OBSZARU](#)

1. IDENTYFIKACJA OBSZARU

1.1. Typ A	1.2. Kod obszaru PLB320008	Powrót
---------------	-------------------------------	------------------------

1.3. Nazwa obszaru

Ostoja Ińska

1.4. Data opracowania 2002-11	1.5. Data aktualizacji 2025-02
----------------------------------	-----------------------------------

1.6. Instytucja lub osoba przygotowująca wniosek:

Nazwisko/Organizacja:	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Adres:	Polska Al. Jerozolimskie 136 Warszawa 02-305
Adres e-mail:	kancelaria@gdos.gov.pl

1.7. Data wskazania oraz objęcia formą ochrony/klasyfikacji terenu

Data zaklasyfikowania obszaru jako OSO:	2004-11
Krajowe odniesienie prawne dla formy ochrony OSO	rozp. MŚ z dn. 21.07.2004 r. w sprawie osop

2. POŁOŻENIE OBSZARU

[Powrót](#)

2.1. Położenie centralnego punktu [wartości dziesiętne stopni]:

Długość geograficzna
15.4357

Szerokość geograficzna
53.4575

2.2. Powierzchnia [ha]:

87710.94

2.3. Obszar morski [%]

0.0

2.5. Kod i nazwa regionu administracyjnego

Kod poziomu NUTS 2

Nazwa regionu

PL42	Zachodniopomorskie
------	--------------------

2.6. Region biogeograficzny

Kontynentalny (100.0
%)

3. INFORMACJE PRZYRODNICZE

3.2. Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 2009/147/WE i gatunki wymienione w załączniku II do dyrektywy 92/43/EEG oraz ocena znaczenia obszaru dla tych gatunków

[Powrót](#)

Gatunki					Populacja na obszarze						Ocena obszaru			
Grupa	Kod	Nazwa naukowa	S	NP	Typ	Wielkość		Jednostka	Kategoria	Jakość danych	A B C D	A B C		
						Min	Maks		C R V P		Populacja	Stan zachowania	Izolacja	Ogólnie
B	A229	Alcedo atthis			r	50	62	p		G	C	B	C	C
B	A056	Anas clypeata			r	7	16	p		G	D			
B	A052	Anas crecca			c	1000	1000	i		G	B	B	C	B
B	A052	Anas crecca			r	10	31	p		G	B	B	C	B
B	A055	Anas querquedula			r	12	36	p		G	C	B	C	C
B	A051	Anas strepera			r	85	147	p		G	B	B	C	B
B	A043	Anser anser			r	102	245	p		G	C	B	C	C
B	A089	Aquila pomarina			r	25	25	p		G	C	B	B	C
B	A028	Ardea cinerea			r	116	116	p		G	C	C	C	C
B	A059	Aythya ferina			r	26	51	i		G	D			
B	A021	Botaurus stellaris			r	20	32	p		G	C	B	C	C
B	A215	Bubo bubo			p	1	1	p		G	C	B	C	C
B	A067	Bucephala clangula			r	129	206	p		G	B	B	C	B
B	A224	Caprimulgus europaeus			r	1	5	p		G	D			

[illegible]

B	A166	glareola		c	800	800	i		G	D			
B	A165	Tringa ochropus		r	138	211	p		G	B	B	C	C
B	A213	Tyto alba		r	5	6	p		G	D			

- Grupa: A = płazy, B = ptaki, F = ryby, I = bezkręgowce, M = ssaki, P = rośliny, R = gady.
- S: jeśli dane o gatunku są szczególnie chronione i nie mogą być udostępnione publicznie, należy wpisać „tak”.
- NP: jeśli dany gatunek nie występuje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Typ: p = osiadłe, r = wydające potomstwo, c = przelotne, w = zimujące (w przypadku roślin i gatunków niemigrujących należy użyć terminu „osiadłe”).
- Jednostka: i = osobniki pojedyncze, p = pary lub inne jednostki według standardowego wykazu jednostek i kodów zgodnego ze sprawozdawczością na podstawie art. 12 i 17 (zob. [portal referencyjny](#)).
- Kategorie liczebności (kategoria): C = powszechne, R = rzadkie, V = bardzo rzadkie, P = obecne - wypełnić, jeżeli brak jest danych (DD), lub jako uzupełnienie informacji o wielkości populacji.
- Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. zgrubne dane szacunkowe); DD = brak danych (kategorię tę należy stosować wyłącznie, jeśli nie da się dokonać nawet zgrubnej oceny wielkości populacji - w takiej sytuacji można pozostawić puste pole dotyczące wielkości populacji, jednak pole „Kategorie liczebności” musi być wypełnione).

4. OPIS OBSZARU

4.1. Ogólna charakterystyka obszaru

[Powrót](#)

Klasa siedliska przyrodniczego	Pokrycie [%]
N09	0.16
N16	14.16
N07	0.18
N23	0.88
N19	13.69
N06	3.99
N10	7.79
N17	8.92
N12	50.23
Ogółem pokrycia siedliska przyrodniczego	100

Dodatkowa charakterystyka obszaru:

Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Ostoja Ińska” o powierzchni 87 710,9 obejmuje znaczny fragment Pojezierza Ińskiego i położony jest na terenie czterech powiatów: Choszczno, Drawsko Pomorskie, Łobez i Stargard Szczeciński oraz trzynastu gmin: Chociwel, Dobra Nowogardzka, Dobrzany, Drawsko Pomorskie, Ińsko, Kalisz Pomorski, Marianowo, Łobez, Radowo Małe, Recz, Stara Dąbrowa, Suchań, Węgorzyno. W podziale RDLP Ostoja leży w granicach Regionalnej Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie i Szczecinku, w obszarze działania Nadleśnictw Łobez, Dobrzany, Nowogard i Drawsko Pomorskie. Największe obszary OSO położone są na terenie powiatów Stargard Szczeciński i Łobez. W powiecie Stargard Szczeciński położone jest 50272,97 ha czyli 57,32 % powierzchni całkowitej OSO. Ostoja Ińska obejmuje w 100% obszar gmin Chociwel oraz Ińsko. Znaczne powierzchnie OSO położone są w gminach Dobrzany (87,2 % pow. gminy) i gminie Marianowo (60,6 %). W powiecie Łobez OSO obejmuje obszar gmin Węgorzyno w 100 % i znaczny obszar gminy Dobra – 36 %.

Na terenie powiatu drawskiego (obszary wiejskie Drawska Pomorskiego i Kalisz Pomorskiego) obszar ostoi zajmuje 3821,46 ha czyli jest to 4,36 % powierzchni całkowitej. Na terenie powiatu choszczeńskiego (gmina Recz) OSO zajmuje obszar 2294,17 ha czyli 13,7% obszaru gminy co stanowi tylko 2,62 % Ostoi Iłńskiej.

Obszar typowy dla krajobrazu postglacialnego Pojezierza Iłńskiego. Rzeźba terenu została ukształtowana podczas stadiału pomorskiego ostatniego zlodowacenia i charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem form i wysokości względnych - można tu wyróżnić trzy zasadnicze jednostki geomorfologiczne i związane z nimi typy krajobrazu: wyniesienia moreny czołowej, sandry i wysoczyznę moreny dennej. Najwyższe wzniesienie - Głowacz osiąga 180 m n.p.m. Teren odwadniany jest przez rzekę Inę i jej dopływy, jedynie jego północna część odwadniana jest przez Regę. Cechy charakterystyczne ostoi to pofalowany teren, silnie rozczłonkowane lasy, liczne bagna i małe zbiorniki wodne. Największe jest jezioro Iłńskie (6 km²), o głębokości 42 m, wypełniające system krzyżujących się rynien glacialnych. Bogatej morfologii odpowiada mozaikowe użytkowanie terenu. Lasy zajmują blisko 60 % powierzchni. Są to przeważnie świeże lasy liściaste z bukiem i dębem oraz bory mieszane. Znaczący udział mają również lasy siedlisk wilgotnych i bagiennych z olchą i jesionem oraz sosną i brzozą. Stosunkowo niewielką część ostoi pokrywają zbiorowiska łąkowe oraz siedliska wilgotne: trzcinowiska, turzycowiska, roślinność szuwarowa, roślinność torfowisk niskich i przejściowych. Pozostała część to użytki rolne.

Zgodnie z regionalizacją fizycznogeograficzną Polski (Kondracki 2000) należy do regionu Pojezierza Pomorskie (podprowincja Pojezierza Południowobałtyckie). Obejmuje obszar mezoregionów: Pojezierze Iłńskie, Wysoczyzna Łobeska, Pojezierze Drawskie, Równina Drawska.

4.2. Jakość i znaczenie

Ostoja ptasia o randze europejskiej E 08. Występuje tu co najmniej 27 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG, 6 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). W ostoi gniazduje ponad 140 gatunków ptaków.

Bardzo ważna ostoja bielika i kilku innych gatunków drapieżnych, kilku gatunków kaczek i żurawia (>1% populacji krajowej). W okresie lęgowym obszar zasiedla około 10% populacji krajowej cyraneczki, gągoła i krakwy, co najmniej 1% populacji krajowej następujących gatunków ptaków: cyranka, gęgawa, nurogęś, perkoz rdzawoszyi, samotnik, bąk (PCK), bielik (PCK), błotniak stawowy, bocian czarny, kania czarna (PCK), kania ruda (PCK), orlik krzykliwy (PCK), puchacz (PCK), rybitwa czarna, przepiórka, strumieniówka i zimorodek; w stosunkowo wysokim zagęszczeniu występują: bocian biały, derkacz, gąsiorek, lerka, muchołówka mała, trzmielojad, dzięcioł czarny, perkoz, zausznik, łabędź niemy, płaskonos i srokosz. W okresie wędrówek występuje co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego następujących gatunków: bielik (40 osobników) i żuraw (1800-2000 osobników); w stosunkowo wysokim zagęszczeniu występują: łabędź krzykliwy (do 480 osobników), cyraneczka (1000 osobników), siewka złota (450-1100 osobników), łączak (do 800 osobników) i batalion (do 1200 osobników).

Dobrze zachowane są zbiorowiska roślinne, zwłaszcza leśne, oprócz nich, duże znaczenie przyrodnicze ma roślinność wodna i terenów podmokłych. Występują tu też cenne zespoły roślinności łąkowej. Na terenie ostoi znajdują się stanowiska licznych storczykowatych.

Jeziora: Iłńsko, Wisola i Krzemień są jeziorami ramienicowymi, o bardzo dobrze wykształconych siedliskach, występują w nich rzadkie i zagrożone gatunki glonów. Obszar ma duże znaczenie dla fauny, w szczególności dla ptaków (patrz wyżej) oraz płazów (12 gatunków) i gadów (4 gatunki) ze względu na duży udział dobrze zachowanych siedlisk podmokłych. Występują tu 3 gatunki ryb z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Poza tym, w jeziorze Krzemień stwierdzono występowanie skójki gruboskorupowej *Unio crassus* a w jeziorze Iłńsko pływaka szerokobrzeżka *Dytiscus latissimus*. Na tym terenie występują także silne populacje zalotki większej *Leucorrhinia pectoralis*. Na obszarze Ostoi introdukowano żubra *Bison bonasus*. Zachodni skraj swojego areалу w Polsce osiąga tu wilk. Stosunkowo niska gęstość zaludnienia, niski stopień urbanizacji i uprzemysłowienia oraz odśrodkowy układ hydrograficzny ostoi sprzyja zachowaniu i ochronie wartości przyrodniczych.

Do gatunków spełniających kryteria uznania za przedmioty ochrony należą:

A006 Perkoz rdzawoszyi *Podiceps grisegena* – ocena ogólna C, w tym:

Populacja – ocena C.

Gatunek związany z małymi i średnimi oczkami wodnymi, strawami rybnymi, ze strefą dobrze wykształconego szuwaru.

Populacja lęgowa szacowana jest na 36-105 par.

Stan zachowania – ocena B, w tym:

Stopień zachowania siedliska II – elementy dobrze zachowane (niszczenie śródpolnych oczek wodnych, wysoki poziom wody na stawach).

Izolacja: ocena C.

A008 Zausznik *Podiceps nigricollis* – ocena ogólna C, w tym:

Populacja – ocena C.

Gatunek związany z małymi i średnimi oczkami wodnymi, stawami rybnymi, ze strefą dobrze wykształconego szuwaru.

Populacja lęgowa została oszacowana na 18 par.

Stan zachowania – ocena B, w tym:

Stopień zachowania siedliska II – elementy dobrze zachowane (niszczenie śródpolnych oczek wodnych, wysoki poziom wody na stawach).

Izolacja: ocena C.

A021 Bąk *Botaurus stellaris* – ocena ogólna C, w tym:

Populacja – ocena C

Gatunek lęgowy różnego rodzaju terenów podmokłych z dobrze wykształconym szuwarem trzcinowym.

Populacja lęgowa jest szacowana na 20-32 pary (w 2013 r. - 31 par).

Stan zachowania – ocena B, w tym:

Stopień zachowania siedliska II – elementy dobrze zachowane (niekontrolowane niszczenie zbiorników śródpolnych).

Izolacja: ocena C.

A028 Czapla siwa *Ardea cinerea* – ocena ogólna C, w tym:

Populacja – ocena C.

Kolonie lęgowe zakładane są zazwyczaj w pobliżu zbiorników wodnych. Czasami jednak znajdują się w znacznym oddaleniu od wody.

Populacja lęgowa została oceniona na 116 par.

Stan zachowania – ocena C, w tym:

Stopień zachowania siedliska II – elementy dobrze zachowane (zabudowa brzegów jezior).

Izolacja: ocena C.

A030 Bocian czarny *Ciconia nigra* – ocena ogólna C, w tym:

Populacja – ocena C.

Gatunek preferuje stare i podmokłe drzewostany, w których znajduje odpowiednie warunki do rozrodu.

Populacja lęgowa szacowana jest na 18 par.

Stan zachowania – ocena B, w tym:

Stopień zachowania siedliska II – elementy dobrze zachowane (naturalne i antropogeniczne procesy powodujące obniżanie się poziomu wód w obrębie lęgówisk i żerowisk).

Izolacja: ocena: C.

A036 Łabędź niemy *Cygnus olor* – ocena ogólna C, w tym:

Populacja – ocena C.

Gatunek występuje w Ostoi nad wszystkimi typami wód, z wyjątkiem rzek.

Populację lęgową oszacowano na 79-129 par.

Stan zachowania – ocena B, w tym:

Stopień zachowania siedliska II – elementy dobrze zachowane (niszczenie śródpolnych oczek wodnych, niekontrolowane usuwanie szuwarów).

Izolacja: ocena C.

A038 Łabędź krzykliwy *Cygnus cygnus* – populacja lęgowa z oceną ogólną C, w tym:

Populacja – ocena C.

Lęgi gatunku stwierdzano na stawach z bogatym szuwarem.

Populacja lęgowa: 2 do 3 par. Stan zachowania – ocena B, w tym:

Stopień zachowania siedliska II – elementy dobrze zachowane (niekontrolowane usuwanie szuwarów otaczających stawy, płoszenie ptaków podczas wysiadywania).

Izolacja: ocena C.

A038 Łabędź krzykliwy *Cygnus cygnus* – populacja migrująca z oceną ogólną C, w tym:

Populacja – ocena C.

Liczebność populacji przelotnej – do 480 osobników.

Stan zachowania – ocena B, w tym:

Stopień zachowania siedliska II – elementy dobrze zachowane (niekontrolowane usuwanie szuwarów otaczających stawy, płoszenie ptaków podczas żerowania).

Izolacja: ocena C.

A043 Gęgawa *Anser anser* – ocena ogólna C, w tym:

Populacja – ocena C.

Gatunek gnieździ się na stawach rybnych, śródpolnych oczkach wodnych i na jeziorach. Wymaga dobrze zachowanego szuwaru na brzegu.

Populacja lęgowa oszacowana została na 102-245 par.

Stan zachowania – ocena B, w tym:

Stopień zachowania siedliska II – elementy dobrze zachowane (niszczenie naturalnych zbiorników wodnych, niszczenie szuwarów na brzegach zbiorników, płoszenie ptaków podczas wysiadywania).

Izolacja: ocena: C.

A051 Krakwa *Anas strepera* – ocena ogólna B, w tym:

Populacja – ocena B.

Występuje w rozproszeniu na terenie całej ostoi zasiedlając jeziora, oczka wodne, odстойniki i stawy.

Populację lęgową oceniono na 85-147 par.

Stan zachowania – ocena B, w tym:

Stopień zachowania siedliska II – elementy dobrze zachowane (niszczenie naturalnych zbiorników wodnych).

Izolacja: ocena C.

A052 Cyraneczka *Anas crecca* – populacja lęgowa z oceną ogólną B, w tym:

Populacja – ocena B.

Związana z niewielkimi zbiornikami śródleśnymi i zatokami dużych jezior.

Populację lęgową oceniono na 10-31 par.

Stan zachowania – ocena B, w tym:

Stopień zachowania siedliska II – elementy dobrze zachowane (naturalne i antropogeniczne procesy obniżające poziom wód na lęgowskich).

Izolacja: ocena C.

A052 Cyraneczka *Anas crecca* – populacja migrująca z oceną ogólną B, w tym:

Populacja – ocena B.

Związana z niewielkimi zbiornikami śródleśnymi i zatokami dużych jezior.

Populację przelotną ocenia się na ok. 1000 osobników.

Stan zachowania – ocena B, w tym:

Stopień zachowania siedliska II – elementy dobrze zachowane (naturalne i antropogeniczne procesy obniżające poziom wód na lęgowskich).

Izolacja: ocena C.

A055 Cyranka *Anas querquedula* – ocena ogólna C, w tym:

Populacja – ocena C.

Cyranka preferuje jako miejsca lęgowe rozległe zbiorniki wodne, najlepiej w otoczeniu łąkowo-torfowiskowych z niewielkimi zbiornikami wodnymi.

Populacja lęgowa została oszacowana na 12-36 par.

Stan zachowania – ocena B, w tym:

Stopień zachowania siedliska II – elementy dobrze zachowane (intensyfikacja gospodarki łąkarskiej, osuszanie torfowisk).

Izolacja: ocena C.

A067 Gągoł *Bucephala clangula* – ocena ogólna B, w tym:

Populacja – ocena B.

Gągoł gnieździ się w dziuplastych drzewach nad brzegami różnego typu wód na całym obszarze Ostoi.

Populację lęgową oceniono na 129-206 par.

Stan zachowania – ocena B, w tym:

Stopień zachowania siedliska II – elementy dobrze zachowane (usuwanie starych dziuplastych drzew nad brzegami jezior, zabudowa brzegów jezior).

Izolacja: ocena C.

A070 Nurogęś *Mergus merganser* – ocena ogólna C, w tym:

Populacja – ocena C.

Gatunek gnieździ się w dziuplastych drzewach nad brzegami różnego typu wód.

Populację lęgową oceniono na 8 par.

Stan zachowania – ocena B, w tym:

Stopień zachowania siedliska II – elementy dobrze zachowane (usuwanie starych dziuplastych drzew nad brzegami jezior, zabudowa brzegów jezior).

Izolacja: ocena C.

A073 Kania czarna *Milvus migrans* – ocena ogólna C, w tym:

Populacja – ocena C.

Na miejsca lęgów gatunek najczęściej wybiera drzewa nad brzegami jezior.

Populacja lęgowa szacowana jest na 0-8 par.

Stan zachowania – ocena B, w tym:

Stopień zachowania siedliska II – elementy dobrze zachowane.

Izolacja: ocena C.

A074 Kania ruda *Milvus milvus* – ocena ogólna C, w tym:

Populacja – ocena C.

Na terenie ostoi posiada gniazda w obrębie niewielkich obszarów zalesionych.

Populacja lęgowa jest szacowana na 16 par.

Stan zachowania – ocena B, w tym:

stopień zachowania siedliska II – elementy dobrze zachowane (monokulturowa gospodarka rolnicza, intensyfikacja rolnictwa, pestycydy).

Izolacja: ocena C.

A075 Bielik *Haliaeetus albicilla* – populacja lęgowa z oceną ogólną C, w tym:

Populacja – ocena C.

Lęgi odbywa najczęściej w zwartych kompleksach najstarszych klasach drzewostanów iglastych i liściastych.

Są przypadki gniazdowania w drzewostanach bardzo przerzedzonych a nawet na pojedynczych drzewach.

Populacja lęgowa wynosi 18 par.

Stan zachowania – ocena A, w tym:

Stopień zachowania siedliska II – elementy dobrze zachowane (możliwość kolizji z napowietrznymi liniami energetycznymi, zabudowa brzegów jezior utrudniająca żerowanie).

Izolacja: ocena C.

A075 Bielik *Haliaeetus albicilla* – populacja migrująca z oceną ogólną C, w tym:

Populacja – ocena C.

Liczebność populacji przelotnej do 40 osobników.

Stan zachowania – ocena A, w tym:

Stopień zachowania siedliska II – elementy dobrze zachowane (możliwość kolizji z napowietrznymi liniami energetycznymi, zabudowa brzegów jezior utrudniająca żerowanie).

Izolacja: ocena C.

A081 Błotniak stawowy *Circus aeruginosus* – ocena ogólna C, w tym:

Populacja – ocena C.

Gatunek związany z wszelkimi terenami podmokłymi, na których występuje rozległy szuwar trzcinowy, umożliwiający założenie gniazda.

Populacja lęgowa szacowana jest na 45-66 par.

Stan zachowania – ocena B, w tym:

Stopień zachowania siedliska II – elementy dobrze zachowane (niszczenie śródpolnych oczek wodnych, niekontrolowane wypalanie trzcinowisk).

Izolacja: C.

A089 Orlik krzykliwy *Aquila pomarina* – ocena ogólna C, w tym:

Populacja – ocena C.

Gatunek lęnie się najczęściej w starych lasach, na których obrzeżach występują siedliska łąkowe lub polne, na których żeruje.

Populacja lęgowa została oszacowana na 25 par.

Stan zachowania – ocena B, w tym:

Stopień zachowania siedliska II – elementy dobrze zachowane (zalesianie śródleśnych łąk, intensyfikacja rolnictwa).

Izolacja: B.

A122 Derkacz *Crex crex* – ocena ogólna C, w tym:

Populacja - ocena C

Występuje średnio licznie na terenach łąkowych na obszarze całej ostoi.

Wielkość populacji lęgowej w obszarze ocenia się na 55-117 odżywiających się samców.

Stan zachowania – ocena B, w tym:

stopień zachowania siedliska II – elementy dobrze zachowane (miejscami nadmierne osuszanie łąk i intensyfikacja rolnictwa).

Izolacja: ocena C.

A127 Żuraw *Grus grus* – populacja lęgowa z oceną ogólną B, w tym:

Populacja - ocena B.

Występuje dość równomiernie na terenie całej ostoi na śródpolnych oczkach wodnych i rozlewiskach, zabagnionych lasach, podmokłych łąkach.

Wielkość populacji lęgowej w obszarze ocenia się na 300 par. Teren Ostoi stanowi jedno z największych legowisk gatunku w kraju.

Stan zachowania – ocena B, w tym:

stopień zachowania siedliska II – elementy dobrze zachowane (miejscami intensyfikacja rolnictwa i niszczenie śródpolnych oczek wodnych).

Izolacja: ocena C.

A127 Żuraw *Grus grus* – populacja migrująca z oceną ogólną B, w tym:

Populacja - ocena B.

Liczebność populacji przelotnej ocenia się na 1800 do 2000 osobników. Teren Ostoi stanowi istotne miejsce gromadzenia się ptaków dorosłych i młodocianych przed odlotem.

Stan zachowania – ocena B, w tym:

stopień zachowania siedliska II – elementy dobrze zachowane (miejscami intensyfikacja rolnictwa i niszczenie śródpolnych oczek wodnych).

Izolacja: ocena C.

A165 Samotnik *Tringa ochropus* – ocena ogólna C, w tym:

Populacja – ocena B.

Samotnik gnieździ się w starych gniazda ptaków drozdownych w podmokłych lasach.

Populacje lęgową oceniono na 138-211 par.

Stan zachowania – ocena B, w tym:

Stopień zachowania siedliska II – elementy dobrze zachowane (naturalne i antropogeniczne procesy obniżające poziom wód na lęgowskich i żerowskich).

Izolacja: ocena C.

A197 Rybitwa czarna *Chlidonias niger* – ocena ogólna C, w tym:

Populacja – ocena C.

Występuje na stawach rybnych i płytkich terenach zalewowych.

Populacja została oceniona na 9-12 par.

Stan zachowania – ocena B, w tym:

Stopień zachowania siedliska II – elementy dobrze zachowane (utrzymywanie wysokiego poziomu wód na stawach, niszczenie łągowisk).

Izolacja: ocena C.

A215 Puchacz *Bubo bubo* – ocena ogólna C, w tym:

Populacja – ocena C.

Gatunek związany ze starymi i najczęściej podmokłymi borami. Do łągów wykorzystuje gniazda innych ptaków bądź dziuple. Może także gnieździć się na ziemi w miejscach trudno dostępnych (np. na wyspach, pod wykrotami).

Populacja: 1 para.

Stan zachowania – ocena B, w tym:

Stopień zachowania siedliska II – elementy dobrze zachowane.

Izolacja: C.

A229 Zimorodek *Alcedo atthis* – ocena ogólna C, w tym:

Populacja - ocena C

Występuje nad wszystkimi jeziorami w Ostoi. W rozproszeniu także w dolinach rzek i większych kanałów na terenie całej ostoi.

Populację łągową w obszarze oceniono na 50-62 pary.

Stan zachowania – ocena B, w tym:

stopień zachowania siedliska II – elementy dobrze zachowane (zabudowa brzegów jezior, regulacja cieków ograniczająca wzrost populacji).

Izolacja: ocena C

A236 Dzięcioł czarny *Dryocopus martius* – ocena ogólna C, w tym:

Populacja – ocena C.

Gatunek gnieździ się w starszych klasach drzewostanów na obszarze całej Ostoi.

Populację łągową oceniono na 90 par.

Stan zachowania – ocena B, w tym:

Stopień zachowania siedliska II – elementy dobrze zachowane (usuwanie drzew odpowiednich do łągów).

Izolacja: ocena C.

Gatunki ptaków, występujące w obszarze Natura 2000, ale nie będące przedmiotami ochrony - nie spełniają kryteriów liczebności ze względu na małe populacje w stosunku do populacji krajowych (ocena D):

A004 *Tachybaptus ruficollis*, A031 *Ciconia ciconia*, A056 *Anas clypeata*, A059 *Aythya ferina*, A072 *Pernis apivorus*, A119 *Porzana porzana*, A140 *Pluvialis apricaria*, A151 *Philomachus pugnax*, A153 *Gallinago gallinago*, A166 *Tringa glareola*, A193 *Sterna hirundo*, A0196 *Chlidonias hybridus*, A213 *Tyto alba*, A224 *Caprimulgus europaeus*, A238 *Dendrocopos medius*, A246 *Lullula arborea*, A307 *Sylvia nisoria*, A320 *Ficedula parva*, A338 *Lanius collurio*, A379 *Emberiza hortulana*.

*A196 Rybitwa białowłosa *Chlidonias hybridus* – ocena D

Poprzedni wpis był wynikiem popełnionego błędu. W 2002 r. stwierdzono lęgi gatunku na stawach w Dzwonowie. Autorzy obserwacji (mat. niepubl.) ocenili liczebność populacji na 12 a nie na 17 par. Nigdy więcej nie udało się stwierdzić łągów tego gatunku na tym stanowisku ani w ostoi. Możliwe jest zalatywanie osobników tego gatunku oraz sporadyczne przystępowanie do łągów. Gatunek czeka na akceptację zmiany statusu przez Komisję Europejską.

4.3. Zagrożenia, presje i działania mające wpływ na obszar

Najważniejsze oddziaływania i działalność mające duży wpływ na obszar

Oddziaływania negatywne			
Poziom	Zagrożenia i presje [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnętrzne [i o b]
H	E01.03		i

M	B02.04		i
M	F02.03		i
H	A02.01		i
H	C03.03		b
H	J02.01		i
H	K03.04		b
L	A02		i
M	A10		b
M	A03.01		i
M	A03.03		i
M	B01.01		i
M	B02		i
M	B02.02		i
M	B07		i
M	C01.01		i
M	D02.01.01		i
M	F01.01		i
L	F05.05		i
M	G05		i
M	H01.04		i
M	J03.01		i

Oddziaływania pozytywne

Poziom	Działania, zarządzanie [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnętrzne [i o b]
H	A04.02		i
H	A03.02		i

Poziom: H = wysoki, M = średni, L = niski.

Zanieczyszczenie: N = stosowanie azotu, P = stosowanie fosforu/fosforanów, A = stosowanie kwasów/zakwaszanie, T = toksyczne chemikalia nieorganiczne,

O = toksyczne chemikalia organiczne, X = zanieczyszczenia mieszane.

i = wewnętrzne, o = zewnętrzne, b = jednocześnie.

4.4. Własność (opcjonalnie)

Typ		[%]
Publiczna	Krajowa/federalna	0
	Kraj	0
	związkowy/województwo	0
	Lokalna/gminna	0
	Inna publiczna	0
Własność łączna lub współwłasność		0
Prywatna		0
Nieznana		100
Suma		100

4.5. Dokumentacja (opcjonalnie)

1. Borówka R., Friedrich S., Heese T., Jasnowska J., Kochanowska R., Opęchowski M., Stanecka E., Zyska W. (red.) 2004. Przyroda Pomorza Zachodniego. Oficyna In Plus. Szczecin. 2. Chylarecki P., Sikora A.,

Cenian Z. (red.). 2009. Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią. GIOŚ, Warszawa, s.615. <http://www.monitoringptakow.gios.gov.pl/publikacje3>. Gołębiecki K. 2001. Waloryzacja przyrodnicza gminy Radowo Małe w zakresie fauny. Biuro Konserwacji Przyrody, Szczecin;4. Gromadzki M. (red.) 2004. Ptaki. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska. Warszawa. T. 7 (część I), s.314. T. 8 (część II), s. 447. <http://www.monitoringptakow.gios.gov.pl/publikacje5>. Guzikowski P. 2002. Waloryzacja przyrodnicza gminy Drawsko Pomorskie z zakresu fauny. Biuro Konserwacji Przyrody, Szczecin.6. Kalisińska E., Kalisiński M. 1999. Waloryzacja przyrodnicza gminy Łobez, z zakresu fauny. Biuro Konserwacji Przyrody, Szczecin;7. Kuczyński L., Chylarecki P. 2012. Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski. Rozmieszczenie, wybiórczość siedliskowa, trendy. GIOŚ, Warszawa. <http://www.monitoringptakow.gios.gov.pl/publikacje8>. Michoński G., Dokumentacja projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Iłńska PLB320008.9. Monitoring Ptaków Polski (MPM, PMS, MPD, MFGP, MPPL). Państwowy Monitoring Środowiska. <http://monitoringptakow.gios.gov.pl>10. Sikora A., Chylarecki P., Meissner W., Neubauer G. 2011. Monitoring ptaków wodno-błotnych w okresie wędrówek. Poradnik metodyczny. GDOŚ. Warszawa, s. 158.11. Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. (red.). 2007. Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985–2004. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.12. Tracz M. et all. 1999. Waloryzacja przyrodnicza gminy Chociwel z zakresu fauny. Biuro Konserwacji Przyrody, Szczecin.;13. Tracz M. et all. 1999. Waloryzacja przyrodnicza gminy Dobrzany z zakresu fauny. Biuro Konserwacji Przyrody, Szczecin.;14. Tracz M. et all. 1999. Waloryzacja przyrodnicza gminy Iłsko z zakresu fauny. Biuro Konserwacji Przyrody, Szczecin.;15. Tracz M. et all. 1999. Waloryzacja przyrodnicza gminy Węgorzyno z zakresu fauny. Biuro Konserwacji Przyrody, Szczecin.16. Tryjanowski P. 2003. Waloryzacja przyrodnicza gminy Kalisz Pomorski, w zakresie fauny. Biuro Konserwacji Przyrody, Szczecin;17. Waloryzacja przyrodnicza województwa Zachodniopomorskiego. 2010. Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie, Szczecin.18. Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. (red.). 2010. Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce. OTOP, Marki.19. Wysocki D. 1998. Waloryzacja przyrodnicza gminy Marianowo, w zakresie fauny. Biuro Konserwacji Przyrody, Szczecin;20. Zawadzka D., Ciach M., Figarski T., Kajtoch Ł., Rejt Ł. 2013. Materiały do wyznaczania i określania stanu zachowania siedlisk ptasich w obszarach specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. GDOŚ, Warszawa. bip.gdos.gov.pl/doc/ftp/2013/Publikacja.pdf21. Zawal A. et all. 2000. Waloryzacja przyrodnicza gminy Dobra k. Nowogardu, w zakresie fauny. Biuro Konserwacji Przyrody, Szczecin;

5. STATUS OCHRONY OBSZARU (OPCJONALNIE)

5.1. Istniejące formy ochrony na poziomie krajowym i regionalnym:

[Powrót](#)

Kod	Pokrycie [%]	Kod	Pokrycie [%]	Kod	Pokrycie [%]
PL02	0.31	PL04	2.45	PL03	19.98

5.2. Powiązanie opisanego obszaru z innymi formami ochrony:

na poziomie krajowym lub regionalnym:

Kod rodzaju	Nazwa terenu	Rodzaj	Pokrycie [%]
PL03	Iłński Park Krajobrazowy	+	19.98
PL02	Kamienna Buczyna	+	0.01
PL02	Głowacz	+	0.09
PL02	Wyspa Sołtyski	+	0.03
PL02	Bórbagno Miałka	+	0.04
PL02	Źródłiskowe Zbocza	+	0.06
PL04	Obszar Chronionego Krajobrazu D (Choszczno-Drawno)	*	2.45

PL02	Krzemieńskie Źródłiska	+	0.09
------	------------------------	---	------

6. ZARZĄDZANIE OBSZAREM

6.1. Organ lub organy odpowiedzialne za zarządzanie obszarem:

[Powrót](#)

Organizacja:	Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
Adres:	Polska Juliusza Słowackiego 2 71-434 Szczecin
Adres e-mail:	sekretariat@szczecin.rdos.gov.pl

6.2. Plan(-y) zarządzania:

Aktualny plan zarządzania istnieje:

☒	Tak	Nazwa: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Ińska PLB320008 Link: http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/files/obwieszczenia/21928/Zarzadzenie_RDOS_Szczecin_Dz_Urz_Woj_Zacho_1931_2014.pdf
☐	Nie, ale jest w przygotowaniu	
☐	Nie	

7. MAPA OBSZARU

[Powrót](#)

Nr ID INSPIRE:

PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB320008

Mapa załączona jako plik PDF w formacie elektronicznym (opcjonalnie)

☒ Tak ☐ Nie

Odniesienie lub odniesienia do oryginalnej mapy wykorzystanej przy digitalizacji granic elektronicznych (opcjonalnie)

--