



NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

dla obszarów specjalnej ochrony (OSO),
proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (pOZW),
obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW) oraz
specjalnych obszarów ochrony (SOO)

OBSZAR PLB320010
NAZWA
OBSZARU Wybrzeże Trzebiatowskie

ZAWARTOŚĆ

- [1. IDENTYFIKACJA OBSZARU](#)
- [2. POŁOŻENIE OBSZARU](#)
- [3. INFORMACJE PRZYRODNICZE](#)
- [4. OPIS OBSZARU](#)
- [5. STATUS OCHRONY OBSZARU](#)
- [6. POWIĄZANIA OBSZARU](#)
- [7. MAPA OBSZARU](#)

1. IDENTYFIKACJA OBSZARU

1.1. Typ A	1.2. Kod obszaru PLB320010	Powrót
---------------	-------------------------------	------------------------

1.3. Nazwa obszaru

Wybrzeże Trzebiatowskie

1.4. Data opracowania 2002-10	1.5. Data aktualizacji 2025-03
----------------------------------	-----------------------------------

1.6. Instytucja lub osoba przygotowująca wniosek:

Nazwisko/Organizacja:	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Adres:	Polska Al. Jerozolimskie 136 Warszawa 02-305
Adres e-mail:	kancelaria@gdos.gov.pl

1.7. Data wskazania oraz objęcia formą ochrony/klasyfikacji terenu

Data zaklasyfikowania obszaru jako OSO:	2007-10
Krajowe odniesienie prawne dla formy ochrony OSO	rozp. MŚ z dn. 05.09.2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie osop

2. POŁOŻENIE OBSZARU

2.1. Położenie centralnego punktu [wartości dziesiętne stopni]:

15.0024

54.0555

31757.59

0.0

2.5. Kod i nazwa regionu administracyjnego

Nazwa regionu

PLZZ	Region morski
PL42	Zachodniopomorskie

2.6. Region biogeograficzny

Kontynentalny (100.0 %)

3. INFORMACJE PRZYRODNICZE

[Powrót](#)

3.2. Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 2009/147/WE i gatunki wymienione w załączniku II do dyrektywy 92/43/EEG oraz ocena znaczenia obszaru dla tych gatunków

[illegible]

[illegible]

B	A272	Luscinia svecica		r	10	15	p		G	C	B	C	C
B	A073	Milvus migrans		r	2	2	p		G	D			
B	A074	Milvus milvus		r	6	8	p		G	C	B	C	C
B	A160	Numenius arquata		c	90	90	i		G	C	C	C	C
B	A072	Pernis apivorus		r	3	5	p		G	D			
B	A151	Philomachus pugnax		c	330	330	i		G	D			
B	A140	Pluvialis apricaria		c	500	500	i		G	D			
B	A119	Porzana porzana		r	3	7	i		G	D			
B	A195	Sterna albifrons		r	22	22	p		G	D			
B	A190	Sterna caspia		c	7	7	i		G	D			
B	A193	Sterna hirundo		r	10	10	p		G	C	C	C	C
B	A307	Sylvia nisoria		r	50	70	p		G	C	C	C	C
B	A048	Tadorna tadorna		r	1	4	p		G	B	B	C	B
B	A166	Tringa glareola		c	190	190	i		G	D			

- Grupa: A = płazy, B = ptaki, F = ryby, I = bezkręgowce, M = ssaki, P = rośliny, R = gady.
- S: jeśli dane o gatunku są szczególnie chronione i nie mogą być udostępnione publicznie, należy wpisać „tak”.
- NP: jeśli dany gatunek nie występuje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Typ: p = osiadłe, r = wydające potomstwo, c = przelotne, w = zimujące (w przypadku roślin i gatunków niemigrujących należy użyć terminu „osiadłe”).
- Jednostka: i = osobniki pojedyncze, p = pary lub inne jednostki według standardowego wykazu jednostek i kodów zgodnego ze sprawozdawczością na podstawie art. 12 i 17 (zob. [portal referencyjny](#)).
- Kategorie liczebności (kategoria): C = powszechne, R = rzadkie, V = bardzo rzadkie, P = obecne - wypełnić, jeżeli brak jest danych (DD), lub jako uzupełnienie informacji o wielkości populacji.
- Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. zgrubne dane szacunkowe); DD = brak danych (kategorię tę należy stosować wyłącznie, jeśli nie da się dokonać nawet zgrubnej oceny wielkości populacji - w takiej sytuacji można pozostawić puste pole dotyczące wielkości populacji, jednak pole „Kategorie liczebności” musi być wypełnione).

4. OPIS OBSZARU

4.1. Ogólna charakterystyka obszaru

[Powrót](#)

Klasa siedliska przyrodniczego	Pokrycie [%]
N08	0.27
N23	0.93
N17	6.25

N07	0.14
N10	44.08
N19	4.77
N16	4.39
N06	3.05
N01	0.0
N02	0.0
N12	35.94
N04	0.19
Ogółem pokrycia siedliska przyrodniczego	100

Dodatkowa charakterystyka obszaru:

Obszar Natura 2000 PLB320010 Wybrzeże Trzebiatowskie, o powierzchni 31 757,6 ha rozciąga się wzdłuż wybrzeża Bałtyku od miejscowości Kamień Pomorski do Grzybowa koło Kołobrzegu. Pod względem administracyjnym położony jest w województwie zachodniopomorskim na terenie powiatu kamieńskiego (gminy: Kamień Pomorski, Dziwnów, Świerżno), powiatu gryfickiego (gminy: Karnice, Rewal, Trzebiatów), powiatu kołobrzegskiego (gmina: Kołobrzeg). Ostoja znajduje się na terenach administrowanych przez: Nadleśnictwo Gryfice (RDLP w Szczecinie), Nadleśnictwo Gościno (RDLP w Szczecinku).

Zgodnie z regionalizacją fizycznogeograficzną Polski (Kondracki 2000) należy do regionu Pobrzeże Szczecińskie (podprovincia Pobrzeża Południowobałtyckie). W większości obejmuje obszar mezoregionu Wybrzeże Trzebiatowskie, a jedynie jego południowe krańce sięgają obszaru mezoregionu Równiny Gryfickiej.

Wg regionalizacji geobotanicznej J.M. Matuszkiewicza (1993) obszar ten należy do Działu Pomorskiego i położony jest w Krainie Południowego Brzegu Bałtyku (Okręg Wybrzeża Trzebiatowsko-Świnoujskiego, Podokręg Dziwnowski i Mrzeżyński) oraz w Krainie Pobrzeża Południowobałtyckiego (Okręg Koszalińsko-Woliński, Podokręg Kamieńskopomorski i Trzebiatowsko-Koszaliński).

Krajobraz odznacza się tu występowaniem zbiorowisk związanych z bezpośrednim oddziaływaniem morza. Dominują siedliska na podłożu piasków akumulacji morskiej, na których potencjalnym zbiorowiskiem jest nadmorski bór bażynowy. Zespół ten jest najbardziej rozprzestrzenionym typem roślinności leśnej w strefie wydm nadmorskich w obszarze. Pas wydm nadmorskich z wykształconą wydmą białą i wydmą szarą rozciąga się w granicach obszaru między Pogorzelią a Kołobrzegiem. Na zapleczu ustabilizowanych wydm ciągnie się pas borów i lasów mieszanych. Od Niechorza, aż do ujścia Regi wydmy osiągają do 40 m wysokości n.p.m. tworząc formy o kształtach parabolicznych oraz dużych barchanów. Dalej na zachód, aż do ujścia Parsęty, pas wydm nadmorskich jest znacznie węższy i składa się jedynie z pojedynczych wałów ciągnących się wzdłuż linii brzegowej. W wielu miejscach są one jednak niemal zupełnie zniszczone przez procesy abrazyjne. Przybrzeżna akumulacja piasków odcięła od morza jeziora Resko Przymorskie (5,8 km², głębokość 2,5 m) oraz Liwia Łuża (2,1 km², głębokość 1,7 m). Na wschód od niego położone jest tzw. Bagno Pogorzelićkie (jez. Konarzewo), zbiornik wytopiskowy, ale o bardzo posuniętym procesie zarastania i wypłykania (głębokość do 2,0 m). Między pasem wydm a Pradoliną Pomorską rozpościera się nisko położona równina denno-morenowa, dochodząca miejscami do 20 m n.p.m. Ponad nią wznoszą się jedynie pojedyncze pagórki kemów. W ostoi w pasie przymorskim wykształciły się gleby bielcowe, w obniżeniach Pradoliny Pomorskiej występują gleby bagienne, na południowych krańcach ostoi na równinie morenowej dominują gleby brunatne.

W ostoi dominują obszary rolnicze. Ich trzon stanowią siedliska łąkowe, na których po kilkunastoletniej przerwie przywracane jest gospodarowanie (głównie wykaszanie). W zachodniej części ostoi teren jest często zalewany przez wody rzeki Świniec i Niemica. Znaczną powierzchnię terenów zalewanych porasta trzcina i wikliny nadrzeczne. Lasy i zadrzewienia pokrywają tylko ok. 13% powierzchni ostoi i jedynie między Pogorzelią a Mrzeżynem tworzą zwarty kompleks, na pozostałym obszarze ich fragmenty są rozproszone w krajobrazie rolniczym. Obecność wilgotnych łąk w dolinach rzecznych, torfowisk, jezior, a także rozproszonych zadrzewień i lasów, tworzących zróżnicowany, mozaikowy krajobraz, sprzyja występowaniu bogactwa ornitofauny.

4.2. Jakość i znaczenie

W ostoi odnotowano 205 gatunków ptaków, z czego 144 lęgowe. Stwierdzono 49 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, w tym 27 to ptaki lęgowe na tym obszarze. Notowano tu 24 gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt, spośród których sześć regularnie gniazduje na terenie ostoi. Na obszarze ostoi gnieździ się około 2% liczebności populacji krajowej gęgawy, 3% populacji krajowej ohara, ponad 1% populacji krajowej kani rudej oraz śmieszki, podróżniczka i słowika szarego. Stanowi ona także ważne miejsce lęgowe dla błotniaka łąkowego oraz derkacza. Na terenie ostoi podczas migracji zatrzymują się duże stada ptaków blaszkodziobych (gęś zbożowa, gęś białoczelna, gęgawa, świstun), siewkowatych (czajka, siewka złota) oraz żurawi.

Na terenie obszaru Natura 2000 znajdują się 3 rezerваты przyrody: Roby (84,40 ha), Nadmorski bór bażynowy w Mrzeżynie (8,92 ha, 2010), Jezioro Liwia Łuża (239,68 ha, 1959) oraz niewielka, zachodnia część obszaru chronionego krajobrazu Koszaliński Pas Nadmorski (36 229 ha, 1975).

Przedmiotem ochrony w obszarze są następujące gatunki ptaków: A074 kania ruda *Milvus milvus*, A084 błotniak łąkowy *Circus pygargus*, A122 derkacz *Crex crex*, A127 żuraw *Grus grus*, A160 kulik wielki *Numenius arquata*, A193 rybitwa rzeczna *Sterna hirundo*, A222 sowa błotna *Asio flammeus*, A229 zimorodek *Albedo atthis*, A272 podróżniczek *Luscinia svecica*, A307 jarzębatka *Sylvia nisoria*, A338 gąsiorek *Lanius collurio*, A039 gęś zbożowa *Anser fabalis*, A041 gęś białoczelna *Anser albifrons*, A043 gęgawa *Anser anser*, A048 ohar *Tadorna tadorna*, A051 krakwa *Anas strepera*, A179 śmieszka *Larus ridibundus*, A270 słowik szary *Luscinia luscinia*, A371 dziwonia *Carpodacus erythrinus*.

A074 kania ruda *Milvus milvus* – ocena ogólna C, w tym:

Populacja - ocena C

Na terenie ostoi posiada gniazda w obrębie niewielkich obszarów zalesionych. Populacja lęgowa jest szacowana na 7-8 par (Inwentaryzacja ornitologiczna OSO Natura 2000: PLB320010 Wybrzeże Trzebiatowskie. 2011. ECO-EXPERT Szczecin dla GDOŚ; Lachowicz A. 2001. Waloryzacja przyrodnicza gminy Świerzno z zakresu fauny, RDOŚ, Szczecin; Dylawski M, Dylawska J. K. 2005. Materiały do planu ochrony rezerwatu przyrody Jezioro Liwia Łuża. Acer. Szczecin; Kalisińska E., Kalisiński M. 1997. Waloryzacja przyrodnicza gminy Trzebiatów z zakresu fauny, RDOŚ, Szczecin; Kościów R. i in. 2002. Waloryzacja przyrodnicza gminy Kołobrzeg z zakresu fauny RDOŚ, Szczecin; Michał Jasiński 2013. inf. ustna. opiekuna Ostoi Trzebiatowskiej), co stanowi ok. 1,2% populacji polskiej (Sikora i in. 2007).

Stan zachowania – ocena B, w tym:

stopień zachowania siedliska II – elementy dobrze zachowane (duża liczba elektrowni wiatrowych na terenie i w pobliżu ostoi, brak wyznaczonych stref ochronnych wokół gniazd, utrata żerowisk z powodu melioracji i regulacji cieków).

Izolacja: ocena C [2, 7]

A084 błotniak łąkowy *Circus pygargus* – ocena ogólna C, w tym:

Populacja - ocena C

Występuje w rozproszeniu na terenach nieleśnych (doliny rzeczne, torfowiska) na obszarze ostoi. Wielkość populacji lęgowej ocenia się na 8-10 par (Inwentaryzacja ornitologiczna OSO Natura 2000: PLB320010 Wybrzeże Trzebiatowskie. 2011. ECO-EXPERT Szczecin dla GDOŚ; Zyska P., Zyska E. 1996. Waloryzacja przyrodnicza gminy Rewal z zakresu fauny, RDOŚ, Szczecin; Lachowicz A. 2001. Waloryzacja przyrodnicza gminy Świerzno z zakresu fauny, RDOŚ, Szczecin; Kalisińska E., Kalisiński M. 1997. Waloryzacja przyrodnicza gminy Trzebiatów z zakresu fauny, RDOŚ, Szczecin; Kaliciuk J. i in. 2007. Waloryzacja przyrodnicza gminy Kamień Pomorski z zakresu fauny, RDOŚ, Szczecin), co stanowi około 0,8% ogólnokrajowej populacji lęgowej (Sikora i in. 2007). Ostoja Trzebiatowska jest ważnym miejscem lęgowym dla tego gatunku – populacja lęgowa błotniaka jest największa na Pomorzu Zachodnim.

Stan zachowania – ocena C, w tym:

stopień zachowania siedliska III – elementy w średnim stanie (duża liczba elektrowni wiatrowych na terenie i w pobliżu ostoi, brak wyznaczonych stref ochronnych wokół gniazd, utrata żerowisk z powodu melioracji i regulacji cieków).

Możliwości odtworzenia: możliwe przy średnim nakładzie środków (utworzenie stref ochronnych wokół gniazd, uregulowanie stosunków wodnych w obszarze – opracowanie programu gospodarowania wodami w obszarze).

Izolacja: ocena C [2, 7]

A122 derkacz *Crex crex* – ocena ogólna C, w tym:

Populacja - ocena C

Występuje licznie na terenach łąkowych na obszarze całej ostoi. Wielkość populacji lęgowej w obszarze ocenia się na 210-250 odżywiających się samców (Inwentaryzacja ornitologiczna OSO Natura 2000: PLB320010 Wybrzeże Trzebiatowskie. 2011. ECO-EXPERT Szczecin dla GDOŚ; Lachowicz A. 2001.

Waloryzacja przyrodnicza gminy Świerzno z zakresu fauny RDOŚ, Szczecin; Lachowicz A., Rygielski T. 2000.

Waloryzacja przyrodnicza gminy Karnice z zakresu fauny RDOŚ, Szczecin; Zyska P. 1996.

Waloryzacja przyrodnicza gminy Rewal z zakresu fauny RDOŚ, Szczecin; Jakuczun B., Zyska P. 1997.

Waloryzacja przyrodnicza gminy Dziwnów z zakresu flory i roślinności, fauny oraz przyrody nieożywionej RDOŚ, Szczecin; Kaliciuk J. i in. 2007. Waloryzacja przyrodnicza gminy Kamień Pomorski z zakresu fauny RDOŚ, Szczecin; Kalisińska E., Kalisiński M. 1997. Waloryzacja przyrodnicza gminy Trzebiatów z zakresu fauny RDOŚ, Szczecin; Kościów R. i in. 2002. Waloryzacja przyrodnicza gminy Kołobrzeg z zakresu fauny, RDOŚ, Szczecin), co stanowi 0,8% ogólnokrajowej populacji lęgowej (Sikora i in. 2007) – jedna z największych ostoi tego gatunku na Pomorzu.

Stan zachowania – ocena B, w tym:

stopień zachowania siedliska II – elementy dobrze zachowane (miejscami nadmierne osuszanie łąk i intensyfikacja rolnictwa, z drugiej strony spotykane zarastanie wilgotnych łąk przez trzcinę).

Izolacja: ocena C [2, 7]

A127 żuraw *Grus grus* – ocena ogólna C, w tym:

Populacja - ocena C

Występuje rozproszony na terenie całej ostoi na śródpolnych oczkach wodnych i rozlewiskach, zabagnionych lasach, podmokłych łąkach. Wielkość populacji lęgowej w obszarze ocenia się na 75-90 par (Inwentaryzacja ornitologiczna OSO Natura 2000: PLB320010 Wybrzeże Trzebiatowskie. 2011. ECO-EXPERT Szczecin dla GDOŚ; Lachowicz A. 2001. Waloryzacja przyrodnicza gminy Świerzno z zakresu fauny, RDOŚ, Szczecin; Kaliciuk J. i in. 2007. Waloryzacja przyrodnicza gminy Kamień Pomorski z zakresu fauny, RDOŚ, Szczecin; Zyska P., Zyska E. 1996. Waloryzacja przyrodnicza gminy Rewal z zakresu fauny, RDOŚ, Szczecin; Lachowicz A., Rygielski T. 2000. Waloryzacja przyrodnicza gminy Karnice z zakresu fauny, RDOŚ, Szczecin; Kalisińska E., Kalisiński M. 1997. Waloryzacja przyrodnicza gminy Trzebiatów z zakresu fauny, RDOŚ, Szczecin; Dylawski M., Dylawska J. K. 2005. Materiały do planu ochrony rezerwatu przyrody Jezioro Liwia Łuża. Acer. Szczecin; Gawroński A., Gawrońska A. 2011. Plan ochrony rezerwatu Roby na okres 01.01.2012-31.12.2031 r. FRUGILE. Poznań; Kościów R. i in. 2002. Waloryzacja przyrodnicza gminy Kołobrzeg z zakresu fauny, RDOŚ, Szczecin), co stanowi ok. 0,6% populacji polskiej (Sikora i in. 2007) – jedna z większych na Pomorzu Zachodnim populacji lęgowych. Liczebność ptaków migrujących jesienią osiągała w ostatnich latach do 750 osobników.

Stan zachowania – ocena B, w tym:

stopień zachowania siedliska II – elementy dobrze zachowane (miejscami intensyfikacja rolnictwa i osuszanie terenu, duża koncentracja elektrowni wiatrowych).

Izolacja: ocena C [2, 7]

A160 kulik wielki *Numenius arquata* – ocena ogólna C, w tym:

Populacja - ocena C

Gatunek obserwowany w ostoi na przelotach, w 2013 roku na stawach w Głowaczewie (noclegowisko) obserwowano 90 osobników. Ptaki zatrzymują się na dłużej w czasie wędrówki, odpoczywają na stawach, a żerują na polach i łąkach. Do niedawna ok. 20 osobników nocowało na zalanych łąkach koło Gorzysławia, jednak po osuszeniu rozlewisk już się na nich nie zatrzymują (Michał Jasiński 2013. inf. ustna opiekuna Ostoi Trzebiatowskiej).

Stan zachowania – ocena C, w tym:

stopień zachowania siedliska III – elementy w średnim stanie (postępujące osuszanie rozlewisk nadrzecznych, eliminujące żerowiska ptaków).

Możliwości odtworzenia: możliwe przy średnim nakładzie środków (opracowanie optymalnego programu gospodarowania wodami i przywrócenie naturalnych obszarów zalewowych w dolinach cieków wodnych oraz ekstensywna gospodarka kośno-pastwiskowa).

Izolacja: ocena C [2, 7]

A193 rybitwa rzeczna *Sterna hirundo* – ocena ogólna C, w tym:

Populacja - ocena C

Gnieździ się na jez. Liwia Łuża oraz na stawach k/Głowaczewa i osadnikach k/Pobierowa.

Wielkość populacji lęgowej w obszarze ocenia się na 10 par lęgowych (Inwentaryzacja ornitologiczna OSO Natura 2000: PLB320010 Wybrzeże Trzebiatowskie. 2011. ECO-EXPERT Szczecin dla GDOŚ; Dylawski M, Dylawska J. K. 2005. Materiały do planu ochrony rezerwatu przyrody Jezioro Liwia Łuża. Acer. Szczecin; Zyska P., Zyska E. 1996. Waloryzacja przyrodnicza gminy Rewal z zakresu fauny, RDOŚ, Szczecin), co stanowi 0,25% populacji krajowej (Sikora i in. 2007), dodatkowo uznana za przedmiot ochrony z oceną C ze względu na realizację ustaleń z Komisją Europejską, w zakresie wypełniania warunków środowiskowych dla realizacji inwestycji budowy drogi ekspresowej S3 na odcinku Szczecin-Gorzów Wielkopolski.

Stan zachowania – ocena C, w tym:

stopień zachowania siedliska III – elementy w średnim stanie (zasiedlone jeziora podlegają presji turystycznej – płoszenie ptaków, opuszczone stawy rybne stopniowo zarastają roślinnością oraz podlegają stałym wahaniom poziomu wody).

Możliwości odtworzenia: łatwe (uregulowanie poziomu wody i usuwanie roślinności ze stawów oraz zmniejszenie presji turystycznej na jeziorach pozwoli na polepszenie stanu siedliska, umieszczenie platform gniazdowych na wybranych zbiornikach wodnych wpłynie na zwiększenie sukcesu lęgowego).

Izolacja: ocena C [2, 7]

A222 sowa błotna *Asio flammeus* – ocena ogólna C, w tym:

Populacja - ocena C

Gatunek bardzo nielicznie obserwowany jako lęgowy na obszarze ostoi. W ciągu ostatnich 10 lat nie notowano par lęgowych, choć nie można wykluczyć jego gniazdowania na terenie ostoi, szczególnie w dolinie Świńca, Włodarki (gdzie był obserwowany wcześniej - Kaliciuk J. i in. 2007. Waloryzacja przyrodnicza gminy Kamień Pomorski z zakresu fauny, RDOŚ, Szczecin) oraz Reska, co wymaga przeprowadzenia dokładnych badań. Stosunkowo licznie notowany natomiast na przelotach, np. nad jeziorem Liwia Łuża (Michał Jasiński 2013. inf. ustna, Robert Kościów 2013. inf. ustna).

Stan zachowania – ocena B, w tym:

stopień zachowania siedliska II – elementy dobrze zachowane (miejscami intensyfikacja rolnictwa i osuszanie rozlewisk nadrzecznych).

Izolacja: ocena C [2, 7]

A229 zimmerodek *Albedo atthis* – ocena ogólna C, w tym:

Populacja - ocena C

Występuje w rozproszeniu w dolinach rzek i większych kanałów na terenie całej ostoi. Populację lęgową w obszarze oceniono na max. 14 par (ECO-EXPERT Szczecin dla GDOŚ; Dylawski M, Dylawska J. K. 2005. Materiały do planu ochrony rezerwatu przyrody Jezioro Liwia Łuża. Acer. Szczecin; Michał Jasiński 2013. inf. ustna.), co stanowi 0,6% populacji krajowej (Sikora i in. 2007), dodatkowo uznana za przedmiot ochrony z oceną C ze względu na realizację ustaleń z Komisją Europejską, w zakresie wypełniania warunków środowiskowych dla realizacji inwestycji budowy drogi ekspresowej S3 na odcinku Szczecin-Gorzów Wielkopolski. Wymaga to jednak dalszych badań, ponieważ powodem stwierdzonej niskiej liczebności mogły być wyjątkowo mroźne zimy poprzedzające przeprowadzoną inwentaryzację.

Stan zachowania – ocena C, w tym:

stopień zachowania siedliska III – elementy w średnim stanie (regulacja cieków ograniczająca wzrost populacji).

Możliwości odtworzenia: trudne lub niemożliwe (opracowanie optymalnego programu gospodarowania wodami i renaturalizacja przynajmniej niektórych odcinków cieków).

Izolacja: ocena C [2, 7]

A272 podróżniczek *Luscinia svecica* – ocena ogólna C, w tym:

Populacja - ocena C

Gniazduje w dolinie Świńca i Regi, na osadnikach k/Pobierowa oraz przy jez. Liwia Łuża. Populację lęgową w obszarze oceniono na 10-15 par (Inwentaryzacja ornitologiczna OSO Natura 2000: PLB320010 Wybrzeże Trzebiatowskie. 2011. ECO-EXPERT Szczecin dla GDOŚ; Dylawski M, Dylawska J. K. 2005. Materiały do planu ochrony rezerwatu przyrody Jezioro Liwia Łuża. Acer. Szczecin), co stanowi ok. 1,1% populacji polskiej (Sikora i in. 2007).

Stan zachowania – ocena B, w tym:

stopień zachowania siedliska II – elementy dobrze zachowane (miejscami osuszanie rozlewisk nadrzecznych, regulowanie cieków wodnych powiązane z usuwaniem zadrzewień i zakrzewień nadrzecznych).

Izolacja: ocena C [2, 7]

A307 jarzębatka *Sylvia nisoria* – ocena ogólna C, w tym:

Populacja - ocena C

Rozproszona na terenach nieleśnych na obszarze całej ostoi. Populacja lęgowa w obszarze jest szacowana na 50-70 par (inwentaryzacja ornitologiczna OSO Natura 2000: PLB320010 Wybrzeże Trzebiatowskie. 2011. ECO-EXPERT Szczecin dla GDOŚ; Kalisińska E., Kalisiński M. 1997. Waloryzacja przyrodnicza gminy Trzebiatów z zakresu fauny, RDOŚ, Szczecin; Zyska P., Zyska E. 1996. Waloryzacja przyrodnicza gminy Rewal z zakresu fauny, RDOŚ, Szczecin; Kaliciuk J. i in. 2007. Waloryzacja przyrodnicza gminy Kamień Pomorski z zakresu fauny, RDOŚ, Szczecin), co stanowi ok. 0,35% populacji krajowej (Sikora i in. 2007), dodatkowo uznana za przedmiot ochrony z oceną C ze względu na realizację ustaleń z Komisją Europejską, w zakresie wypełniania warunków środowiskowych dla realizacji inwestycji budowy drogi ekspresowej S3 na odcinku Szczecin-Gorzów Wielkopolski.

Stan zachowania – ocena C, w tym:

stopień zachowania siedliska III – elementy w średnim stanie (niedostateczna ilość zarośli i zadrzewień wzdłuż polnych dróg i miedz, cieków wodnych, kęp krzewów i drzew śródpolnych i żywopłotów).

Możliwości odtworzenia: łatwe (Pozostawianie zadrzewień i zakrzewień wzdłuż cieków wodnych, dróg polnych, a także pozostawianie kęp krzewów i drzew śródpolnych i żywopłotów oraz w miarę możliwości dosadzanie ich).

Izolacja: ocena C [2, 7]

A338 gąsiorek *Lanius collurio* – ocena ogólna C, w tym:

Populacja - ocena C

Występuje w rozproszeniu na terenach nieleśnych na obszarze całej ostoi. Wielkość populacji lęgowej w obszarze ocenia się na 250-300 par (Inwentaryzacja ornitologiczna OSO Natura 2000: PLB320010 Wybrzeże Trzebiatowskie. 2011. ECO-EXPERT Szczecin dla GDOŚ; Lachowicz A., Rygielski T. 2000. Waloryzacja przyrodnicza gminy Karnice z zakresu fauny, RDOŚ, Szczecin; Zyska P., Zyska E. 1996. Waloryzacja przyrodnicza gminy Rewal z zakresu fauny, RDOŚ, Szczecin; Dylawski M, Dylawska J. K. 2005. Materiały do planu ochrony rezerwatu przyrody Jezioro Liwia Łuża. Acer. Szczecin; Kalisińska E., Kalisiński M. 1997. Waloryzacja przyrodnicza gminy Trzebiatów z zakresu fauny, RDOŚ, Szczecin; Kościów R. i in. 2002. Waloryzacja przyrodnicza gminy Kołobrzeg z zakresu fauny, RDOŚ, Szczecin), co stanowi około 0,15% ogólnokrajowej populacji lęgowej (Sikora i in. 2007), dodatkowo uznana za przedmiot ochrony z oceną C ze względu na realizację ustaleń z Komisją Europejską, w zakresie wypełniania warunków środowiskowych dla realizacji inwestycji budowy drogi ekspresowej S3 na odcinku Szczecin-Gorzów Wielkopolski.

Stan zachowania – ocena C, w tym:

stopień zachowania siedliska III – elementy w średnim stanie (niedostateczna ilość zarośli i zadrzewień wzdłuż polnych dróg i miedz, cieków wodnych, kęp krzewów i drzew śródpolnych i żywopłotów).

Możliwości odtworzenia: łatwe (Pozostawianie zadrzewień i zakrzewień wzdłuż cieków wodnych, dróg polnych, a także pozostawianie kęp krzewów i drzew śródpolnych i żywopłotów oraz w miarę możliwości dosadzanie ich).

Izolacja: ocena C [2, 7]

A039 gęś zbożowa *Anser fabalis* – ocena ogólna B, w tym:

Populacja - ocena C

Na przelotach notowano w obszarze do 4000 os., podczas migracji jesiennej. Na terenie ostoi posiada noclegowiska na jeziorach Liwia Łuża i Resko, a głównymi żerowiskami są pola i łąki na SE od Bagna Pogorzelińskiego (Rogozina), na NE od Sadlna, k/Rybic, między Sarbią a Nowogardkiem oraz między Trzebuszem, Robami i Gorzysławiem (Kościów R. i in. 2002. Inwentaryzacja w zakresie fauny do waloryzacji przyrodniczej gminy Kołobrzeg, RDOŚ, Szczecin; Michał Jasiński 2013. inf. ustna; Dylawski M, Dylawska J. K. 2005. Materiały do planu ochrony rezerwatu przyrody Jezioro Liwia Łuża. Acer. Szczecin)

Stan zachowania – ocena B, w tym:

stopień zachowania siedliska II – elementy dobrze zachowane (w ciągu ostatnich kilku lat wykonane prace

melioracyjne i regulacje rzek, a także nasadzenia drzew zmniejszyły powierzchnię żerowisk gęsi).
Izolacja: ocena C [2, 7]

A041 gęś białoczelna *Anser albifrons* – ocena ogólna B, w tym:

Populacja - ocena C

Na przelotach notowano w obszarze do 7000 os., podczas migracji jesiennej. Na terenie ostoi posiada noclegowiska na jeziorach Liwia Łuża i Resko a głównymi żerowiskami są pola i łąki na SE od Bagna Pogorzelickiego (Rogozina), na NE od Sadlna, k/Rybic, między Sarbią a Nowogardkiem oraz między Trzebuszem, Robami i Gorzysławiem (Kościów R. i in. 2002. Inwentaryzacja w zakresie fauny do waloryzacji przyrodniczej gminy Kołobrzeg, RDOŚ, Szczecin; Michał Jasiński 2013. inf. ustna; Dylawski M, Dylawska J. K. 2005. Materiały do planu ochrony rezerwatu przyrody Jezioro Liwia Łuża. Acer. Szczecin)

Stan zachowania – ocena B, w tym:

stopień zachowania siedliska II – elementy dobrze zachowane (w ciągu ostatnich kilku lat wykonane prace melioracyjne i regulacje rzek, a także nasadzenia drzew zmniejszyły powierzchnię żerowisk gęsi).

Izolacja: ocena C [2, 7]

A043 gęgawa *Anser anser* – ocena ogólna B, w tym:

Populacja - ocena B

Występuje w rozproszeniu na terenie całego obszaru, gnieźdząc się głównie na brzegach jezior, oczek wodnych, stawów, ale i osadników. Liczebność populacji lęgowej stwierdzona w obszarze to 51-65 par (Inwentaryzacja ornitologiczna OSO Natura 2000: PLB320010 Wybrzeże Trzebiatowskie. 2011.

ECO-EXPERT Szczecin dla GDOŚ; Lachowicz A. 2001. Waloryzacja przyrodnicza gminy Świerżno z zakresu fauny, RDOŚ, Szczecin; Lachowicz A., Rygielski T. 2000. Waloryzacja przyrodnicza gminy Karnice z zakresu fauny, RDOŚ, Szczecin; Zyska P., Zyska E. 1996. Waloryzacja przyrodnicza gminy Rewal z zakresu fauny; Dylawski M, Dylawska J. K. 2005. Materiały do planu ochrony rezerwatu przyrody Jezioro Liwia Łuża. Acer. Szczecin; Kalisińska E., Kalisiński M. 1997. Waloryzacja przyrodnicza gminy Trzebiatów z zakresu fauny, RDOŚ, Szczecin; Kościów R. i in. 2002. Waloryzacja przyrodnicza gminy Kołobrzeg z zakresu fauny, RDOŚ, Szczecin), co stanowi ok. 2% populacji polskiej (Sikora i in. 2007). Na przelotach obserwowane jest w ostoi do 2000 os.

Stan zachowania – ocena B, w tym:

stopień zachowania siedliska II – elementy dobrze zachowane (w ciągu ostatnich kilku lat wykonane prace melioracyjne i regulacje rzek, a także nasadzenia drzew zmniejszyły powierzchnię żerowisk gęsi, usuwanie/wycinanie pasów szuwarów wokół zbiorników wodnych, presja turystyczna – płoszenie ptaków na jeziorach, presja drapieżników).

Izolacja: ocena C [2, 7]

A048 ohar *Tadorna tadorna* – ocena ogólna B, w tym:

Populacja - ocena B

Gnieździ się na obszarze jez. Resko, na osadnikach k/Kamienia Pomorskiego oraz na stawach k/Głowaczewa. Wielkość populacji lęgowej w obszarze ocenia się na 1-4 par (Inwentaryzacja ornitologiczna OSO Natura 2000: PLB320010 Wybrzeże Trzebiatowskie. 2011. ECO-EXPERT Szczecin dla GDOŚ; Michał Jasiński 2013. inf. ustna), co stanowi ok. 3,3% populacji polskiej (Sikora i in. 2007).

Stan zachowania – ocena B, w tym:

stopień zachowania siedliska II – elementy dobrze zachowane (płoszenie ptaków w okresie lęgowym przez turystów, wędkarzy, presja drapieżników).

Izolacja: ocena C [2, 7]

A051 krakwa *Anas strepera* – ocena ogólna B, w tym:

Populacja - ocena B

Występuje w rozproszeniu na terenie całej ostoi zasiedlając jeziora, oczka wodne, odstojniki i stawy. Wielkość populacji lęgowej w obszarze ocenia się na 32-50 par (Inwentaryzacja ornitologiczna OSO Natura 2000: PLB320010 Wybrzeże Trzebiatowskie. 2011. ECO-EXPERT Szczecin dla GDOŚ; Lachowicz A., Rygielski T. 2000. Waloryzacja przyrodnicza gminy Karnice z zakresu fauny, RDOŚ, Szczecin), co stanowi blisko 2,5% ogólnokrajowej populacji lęgowej (Sikora i in. 2007).

Stan zachowania – ocena B, w tym:

stopień zachowania siedliska II – elementy dobrze zachowane (usuwanie/wycinanie pasów szuwarów wokół zbiorników wodnych, presja turystyczna – płoszenie ptaków na jeziorach, presja drapieżników).

Izolacja: ocena C [2, 7]

A179 śmieszka *Larus ridibundus* – ocena ogólna C, w tym:

Populacja - ocena C

Gniazduje na Jeziorze Liwia Łuża, Jez. Jatkowskim, Bagnie Pogorzelićkim oraz na stawach w Głowaczewie. Wielkość populacji lęgowej w obszarze ocenia się na 1215 par (Inwentaryzacja ornitologiczna OSO Natura 2000: PLB320010 Wybrzeże Trzebiatowskie. 2011. ECO-EXPERT Szczecin dla GDOŚ; Zyska P., Zyska E. 1996. Waloryzacja przyrodnicza gminy Rewal z zakresu fauny, RDOŚ, Szczecin; Dylawski M, Dylawska J. K. 2005. Materiały do planu ochrony rezerwatu przyrody Jezioro Liwia Łuża. Acer. Szczecin; Michał Jasiński 2013. inf. ustna), co stanowi ok. 1,5% populacji polskiej (Sikora i in. 2007).

Stan zachowania – ocena C, w tym:

stopień zachowania siedliska III – elementy w średnim stanie (uregulowanie poziomu wody i usuwanie roślinności ze stawów oraz zmniejszenie presji turystycznej na jeziorach pozwoli na polepszenie stanu siedliska, umieszczenie platform gniazdowych na wybranych zbiornikach wodnych wpłynie na zwiększenie sukcesu lęgowego)

Możliwości odtworzenia: łatwe (uregulowanie poziomu wody i usuwanie roślinności ze stawów oraz zmniejszenie presji turystycznej na jeziorach w okresie lęgowym pozwoli na polepszenie stanu siedliska, umieszczenie platform gniazdowych na wybranych zbiornikach wodnych wpłynie na zwiększenie sukcesu lęgowego).

Izolacja: ocena C [2, 7]

A270 słowik szary *Luscinia luscinia* – ocena ogólna C, w tym:

Populacja - ocena C

Rozproszony na całym obszarze ostoi. Wielkość populacji lęgowej w obszarze ocenia się na 800-1200 par lęgowych (Dylawski M, Dylawska J. K. 2005. Materiały do planu ochrony rezerwatu przyrody Jezioro Liwia Łuża. Acer. Szczecin; Kościów R. i in. 2002. Waloryzacja przyrodnicza gminy Kołobrzeg z zakresu fauny, RDOŚ, Szczecin; Michał Jasiński 2013. inf. ustna), co stanowi ok. 1,3% populacji krajowej (Sikora i in. 2007).

Stan zachowania – ocena C, w tym:

stopień zachowania siedliska III – elementy w średnim stanie (miejscami osuszanie terenu, regulacja cieków wodnych powiązana z usuwaniem pasów zadrzewień i zakrzewień).

Możliwości odtworzenia: możliwe przy średnim nakładzie środków (pozostawianie zadrzewień i zakrzewień lęgowych wzdłuż cieków wodnych, uregulowanie stosunków wodnych w obszarze).

Izolacja: ocena C [2, 7]

A371 dziwonka *Carpodacus erythrinus* – ocena ogólna C, w tym:

Populacja - ocena C

Występuje w rozproszeniu na terenach nieleśnych na obszarze całej ostoi.

Wielkość populacji lęgowej w obszarze ocenia się na 80-100 par (Inwentaryzacja ornitologiczna OSO Natura 2000: PLB320010 Wybrzeże Trzebiatowskie. 2011. ECO-EXPERT Szczecin dla GDOŚ; Zyska P., Zyska E. 1996. Waloryzacja przyrodnicza gminy Rewal z zakresu fauny, RDOŚ, Szczecin; Dylawski M, Dylawska J. K. 2005. Materiały do planu ochrony rezerwatu przyrody Jezioro Liwia Łuża. Acer. Szczecin; Kościów R. i in. 2002. Waloryzacja przyrodnicza gminy Kołobrzeg z zakresu fauny, RDOŚ, Szczecin), co stanowi około 0,8% ogólnokrajowej populacji lęgowej (Sikora i in. 2007).

Stan zachowania – ocena C, w tym:

stopień zachowania siedliska III – elementy w średnim stanie (regulacja cieków wodnych powiązana z usuwaniem pasów zadrzewień i zakrzewień, miejscami osuszanie terenu).

Możliwości odtworzenia: możliwe przy średnim nakładzie środków (pozostawianie zadrzewień i zakrzewień lęgowych wzdłuż cieków wodnych, uregulowanie stosunków wodnych w obszarze).

Izolacja: ocena C [2, 7]

Gatunki ptaków, występujące w Ostoi, ale nie będące przedmiotem ochrony - nie spełniają kryteriów reprezentatywności ze względu na małe populacje w stosunku do populacji krajowych (ocena D): A021 *Botaurus stellaris*, A030 *Ciconia nigra*, A031 *Ciconia ciconia*, A037 *Cygnus columbianus bewickii*, A038 *Cygnus cygnus*, A072 *Pernis apivorus*, A073 *Milvus migrans*, A074 *Milvus milvus*, A075 *Haliaeetus albicilla*,

A081 Circus aeruginosus, A082 Circus cyaneus, A089 Aquila pomarina, A098 Falco columbarius, A103 Falco peregrinus, A119 Porzana porzana, A140 Pluvialis apricaria, A151 Philomachus pugnax [2, 7]

4.3. Zagrożenia, presje i działania mające wpływ na obszar

Najważniejsze oddziaływania i działalność mające duży wpływ na obszar

Oddziaływania negatywne			
Poziom	Zagrożenia i presje [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnętrzne [i o b]
M	F02.03		i
H	K03.04		i
M	A04.03		i
H	J02.01		i
H	A03.03		i
H	C03.03		i
H	E01.03		i
M	A02.02		i
L	A02.03		i
M	E01.04		i
L	F03.01		i
L	G01		i
M	G05.07		i
M	K02.01		i
M	J02.03		i
M	J03.01		i
Oddziaływania pozytywne			
Poziom	Działania, zarządzanie [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnętrzne [i o b]
H	A04.02		i
H	A03.02		i

Poziom: H = wysoki, M = średni, L = niski.

Zanieczyszczenie: N = stosowanie azotu, P = stosowanie fosforu/fosforanów, A = stosowanie kwasów/zakwaszanie, T = toksyczne chemikalia nieorganiczne, O = toksyczne chemikalia organiczne, X = zanieczyszczenia mieszane.
i = wewnętrzne, o = zewnętrzne, b = jednoczesne.

4.4. Własność (opcjonalnie)

Typ		[%]
Publiczna	Krajowa/federalna	0
	Kraj	0
	związkowy/województwo	0
	Lokalna/gminna	0
	Inna publiczna	0
Własność łączna lub współwłasność		0
Prywatna		0

Nieznana	100
Suma	100

4.5. Dokumentacja (opcjonalnie)

1. Borówka R., Friedrich S., Heese T., Jasnowska J., Kochanowska R., Opęchowski M., Stanecka E., Zyska W. (red.) 2004. Przyroda Pomorza Zachodniego. Oficyna In Plus. Szczecin. 2. Bosiacka B. 2013. Dokumentacja projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLB320010 Wybrzeże Trzebiatowskie. 3. Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z. (red.). 2009. Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią. GIOŚ, Warszawa, s.615. <http://www.monitoringptakow.gios.gov.pl/publikacje> 4. Dylawerski M., Dylawerska J. K. 2005. Materiały do planu ochrony rezerwatu przyrody Jezioro Liwia Łuża. Acer. Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie. Mscr. 5. Gawroński A., Gawrońska A. 2011. Plan ochrony rezerwatu Roby na okres 01.01.2012-31.12.2031 r. FRUGILE, Poznań. RDOŚ w Szczecinie. Mscr. 6. Gromadzki M. (red.) 2004. Ptaki. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska. Warszawa. T. 7 (część I), s.314. T. 8 (część II), s. 447. <http://www.monitoringptakow.gios.gov.pl/publikacje> 7. Bosiacka B. 2013. Mapa rozmieszczenia gatunków dla obszaru Natura 2000 PLB320010 Wybrzeże Trzebiatowskie. 8. Inwentaryzacja ornitologiczna OSO Natura 2000: PLB320010 Wybrzeże Trzebiatowskie. 2011. ECO-EXPERT Szczecin, GDOŚ. Mscr. 9. Jakuczun B., Zyska P. 1997. Waloryzacja przyrodnicza gminy Dziwnów z zakresu flory i roślinności, fauny oraz przyrody nieożywionej. Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie. Mscr. 10. Kaliciuk J., Staszewski A., Śmietana P., Wysocki D. 2007. Waloryzacja przyrodnicza gminy Kamień Pomorski z zakresu fauny. Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie. Mscr. 11. Kalisińska E., Kalisiński M. 1997. Waloryzacja przyrodnicza gminy Trzebiatów z zakresu fauny. Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie. Mscr. 12. Kościów R. 2004. Mokradła powiatu kołobrzeskiego jako cenne ostoje ptaków wodno-błotnych. Część I - jeziora. W: Czeraszewicz R., Oleksiak A. (red.) Ptaki wodno-błotne na Pomorzu Zachodnim. Wyniki liczeń w sezonie 2003/2004, ekologia i ochrona. Wyd. ZTO i PZŁ, Szczecin: 36-42. 13. Kościów R., Ratajczyk I., Janicki D. 2002. Waloryzacja przyrodnicza gminy Kołobrzeg z zakresu fauny. Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie. Mscr. 14. Kuczyński L., Chylarecki P. 2012. Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski. Rozmieszczenie, wybiórczość siedliskowa, trendy. GIOŚ, Warszawa. <http://www.monitoringptakow.gios.gov.pl/publikacje> 15. Lachowicz A. 2001. Waloryzacja przyrodnicza gminy Świerzno z zakresu fauny. Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie. Mscr. 16. Lachowicz A., Rygielski T. 2000. Waloryzacja przyrodnicza gminy Karnice z zakresu fauny. Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie. Mscr. 17. Ławicki Ł., Staszewski A., Czeraszewicz R. 2010. Wędrowka i zimowanie gęsi zbożowej Anser fabalis i gęsi białoczelnej Anser albifrons na Pomorzu Zachodnim w latach 1991-2008. Ornithologia Pol. 51: 93-106. 18. Michał Jasiński 2013. Dane niepublikowane. 19. Monitoring Ptaków Polski (MPM, PMŚ, MPD, MFGP, MPPL). Państwowy Monitoring Środowiska. <http://monitoringptakow.gios.gov.pl> 20. Richling A., Ostaszewska K. (red.) 2005. Geografia fizyczna Polski. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, s. 345. 21. Robert Kościów 2013. Dane niepublikowane. 22. Sikora A., Chylarecki P., Meissner W., Neubauer G. 2011. Monitoring ptaków wodno-błotnych w okresie wędrówek. Poradnik metodyczny. GDOŚ. Warszawa, s. 158. 23. Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. (red.). 2007. Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985–2004. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań. 24. Waloryzacja przyrodnicza województwa Zachodniopomorskiego. 2010. Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie, Szczecin. 25. Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. (red.). 2010. Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce. OTOP, Marki. 26. Zawadzka D., Ciach M., Figarski T., Kajtoch Ł., Rejt Ł. 2013. Materiały do wyznaczania i określania stanu zachowania siedlisk ptasich w obszarach specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. GDOŚ, Warszawa. bip.gdos.gov.pl/doc/ftp/2013/Publikacja.pdf 27. Zyska E., Zyska P. 1996. Waloryzacja przyrodnicza gminy Rewal z zakresu fauny. Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie. Mscr.

5. STATUS OCHRONY OBSZARU (OPCJONALNIE)

5.1. Istniejące formy ochrony na poziomie krajowym i regionalnym:

[Powrót](#)

Kod	Pokrycie [%]	Kod	Pokrycie [%]	Kod	Pokrycie [%]
PL02	1.05	PL04	0.44		

5.2. Powiązanie opisanego obszaru z innymi formami ochrony:

na poziomie krajowym lub regionalnym:

Kod rodzaju	Nazwa terenu	Rodzaj	Pokrycie [%]
PL02	Jezioro Liwia Łuża	*	0.75
PL02	Nadmorski bór bażynowy w Mrzeżynie	+	0.03
PL04	Obszar Chronionego Krajobrazu "Koszaliński Pas Nadmorski"	*	0.44
PL02	Roby	+	0.26

6. ZARZĄDZANIE OBSZAREM

6.1. Organ lub organy odpowiedzialne za zarządzanie obszarem:

[Powrót](#)

Organizacja:	Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
Adres:	Polska Juliusza Słowackiego 2 71-434 Szczecin
Adres e-mail:	sekretariat@szczecin.rdos.gov.pl

6.2. Plan(-y) zarządzania:

Aktualny plan zarządzania istnieje:

☒	Tak	Nazwa: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski PLH320017 DZ. URZ. WOJ. 2014.1657 Link: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1657
☐	Nie, ale jest w przygotowaniu	
☐	Nie	

7. MAPA OBSZARU

[Powrót](#)

Nr ID INSPIRE:

PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB320010

Mapa załączona jako plik PDF w formacie elektronicznym (opcjonalnie)

☒ Tak ☐ Nie

Odniesienie lub odniesienia do oryginalnej mapy wykorzystanej przy digitalizacji granic elektronicznych (opcjonalnie)

--
