



NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

dla obszarów specjalnej ochrony (OSO),
proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (pOZW),
obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW) oraz
specjalnych obszarów ochrony (SOO)

OBSZAR PLB320012
NAZWA
OBSZARU Puszcza Goleniowska

ZAWARTOŚĆ

- [1. IDENTYFIKACJA OBSZARU](#)
- [2. POŁOŻENIE OBSZARU](#)
- [3. INFORMACJE PRZYRODNICZE](#)
- [4. OPIS OBSZARU](#)
- [5. STATUS OCHRONY OBSZARU](#)
- [6. POWIĄZANIA OBSZARU](#)
- [7. MAPA OBSZARU](#)

1. IDENTYFIKACJA OBSZARU

1.1. Typ A	1.2. Kod obszaru PLB320012	Powrót
---------------	-------------------------------	------------------------

1.3. Nazwa obszaru

Puszcza Goleniowska

1.4. Data opracowania 2002-10	1.5. Data aktualizacji 2025-02
----------------------------------	-----------------------------------

1.6. Instytucja lub osoba przygotowująca wniosek:

Nazwisko/Organizacja:	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Adres:	Polska Al. Jerozolimskie 136 Warszawa 02-305
Adres e-mail:	kancelaria@gdos.gov.pl

1.7. Data wskazania oraz objęcia formą ochrony/klasyfikacji terenu

Data zaklasyfikowania obszaru jako OSO:	2007-10
Krajowe odniesienie prawne dla formy ochrony OSO	rozp. MŚ z dn. 05.09.2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie osop

2. POŁOŻENIE OBSZARU

[Powrót](#)

2.1. Położenie centralnego punktu [wartości dziesiętne stopni]:

Długość geograficzna
14.7262

Szerokość geograficzna
53.6928

2.2. Powierzchnia [ha]:

25039.24

2.3. Obszar morski [%]

0.0

2.5. Kod i nazwa regionu administracyjnego

Kod poziomu NUTS 2

Nazwa regionu

PLZZ	Region morski
PL42	Zachodniopomorskie

2.6. Region biogeograficzny

Kontynentalny (100.0
%)

3. INFORMACJE PRZYRODNICZE

3.2. Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 2009/147/WE i gatunki wymienione w załączniku II do dyrektywy 92/43/EEG oraz ocena znaczenia obszaru dla tych gatunków

[Powrót](#)

Gatunki					Populacja na obszarze						Ocena obszaru			
Grupa	Kod	Nazwa naukowa	S	NP	Typ	Wielkość		Jednostka	Kategoria	Jakość danych	A B C D	A B C		
						Min	Maks		C R V P		Populacja	Stan zachowania	Izolacja	Ogólnie
B	A223	Aegolius funereus			p	3	6	p		M	D			
B	A229	Alcedo atthis			r	20	30	p		M	C	B	C	C
B	A052	Anas crecca			r	10	20	p		M	C	B	C	C
B	A050	Anas penelope			c	250	280	i		M	D			
B	A053	Anas platyrhynchos			r	200	300	p		M	D			
B	A053	Anas platyrhynchos			c	250	300	i		M	D			
B	A055	Anas querquedula			r	5	10	p		M	D			
B	A051	Anas strepera			r	25	40	p		M	C	B	C	C
B	A051	Anas strepera			c	100	100	i		M	D			
B	A043	Anser anser			r	40	50	p		M	C	B	C	C
B	A089	Aquila pomarina			r	2	3	p		M	D			
B	A059	Aythya ferina			r	1	2	p		M	D			
B	A061	Aythya fuligula			r	5	10	p		M	D			

B	A021	Botaurus stellaris		r	5	15	males		M	D			
B	A215	Bubo bubo		p	1	1	p		M	D			
B	A067	Bucephala clangula		r	25	35	p		G	C	B	C	C
B	A224	Caprimulgus europaeus		r	15	25	p		P	D			
B	A136	Charadrius dubius		r	1	5	p		M	D			
B	A031	Ciconia ciconia		r	4	10	p		M	D			
B	A030	Ciconia nigra		c				P	DD	D			
B	A081	Circus aeruginosus		r	8	10	p		M	D			
B	A082	Circus cyaneus		c				V	DD	D			
B	A084	Circus pygargus		r	1	1	p		M	D			
B	A207	Columba oenas		r	45	70	p		M	D			
B	A122	Crex crex		r	100	180	males		G	C	B	C	C
B	A037	Cygnus columbianus bewickii		c	26	26	i		M	D			
B	A038	Cygnus cygnus		w	5	310	i		M	D			
B	A038	Cygnus cygnus		c	150	700	i		M	C	B	C	C
B	A036	Cygnus olor		c	200	250	i		M	D			
B	A238	Dendrocopos medius		p	4	9	p		M	D			
B	A238	Dendrocopos medius		r	70	90	p		M	C	B	C	C
B	A236	Dryocopus martius		p	50	100	p		M	D			
B	A103	Falco peregrinus		c	1	1	p		P	D			
B	A099	Falco subbuteo		r	5	6	p		M	D			
B	A320	Ficedula parva		r	50	100	p		M	D			
B	A125	Fulica atra		r	10	15	p		M	D			
B	A153	Gallinago gallinago		r	120	200	p		M	C	B	C	C
B	A123	Gallinula chloropus		r	5	15	p		M	D			
B	A127	Grus grus		r	60	100	p		G	C	B	C	C
B	A075	Haliaeetus albicilla		w	25	50	i		M	C	B	C	B
B	A075	Haliaeetus albicilla		c	30	72	i		M	C	B	C	B
B	A075	Haliaeetus albicilla		r	13	16	p		G	C	B	C	B
B	A022	Ixobrychus minutus		r				R	DD	D			
B	A338	Lanius collurio		r	230	380	p		M	D			

B	A340	Lanius excubitor		r	15	20	p		M	D			
B	A292	Locustella luscinioides		r	80	120	p		M	D			
B	A246	Lullula arborea		r	70	140	p		M	D			
B	A272	Luscinia svecica		r	30	60	p		M	B	B	C	B
B	A073	Milvus migrans		r				R	DD	D			
B	A074	Milvus milvus		r	10	15	p		G	C	B	C	C
B	A261	Motacilla cinerea		r	5	10	p		M	D			
B	A277	Oenanthe oenanthe		r	3	6	p		M	D			
B	A094	Pandion haliaetus		c				R	DD	D			
B	A323	Panurus biarmicus		r	14	14	p		M	D			
B	A072	Pernis apivorus		r	5	10	p		M	D			
B	A151	Philomachus pugnax		c	24	24	i		M	D			
B	A235	Picus viridis		r	25	35	p		M	D			
B	A005	Podiceps cristatus		r	20	25	p		M	D			
B	A120	Porzana parva		r	1	3	males		M	D			
B	A119	Porzana porzana		r	1	8	males		M	D			
B	A118	Rallus aquaticus		r	30	60	p		M	D			
B	A276	Saxicola torquatus		r	5	15	p		M	D			
B	A210	Streptopelia turtur		r	5	10	p		M	D			
B	A307	Sylvia nisoria		r	20	80	p		M	D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis		r	3	6	p		M	D			
B	A166	Tringa glareola		c	5	105	i		P	D			
B	A165	Tringa ochropus		r	50	70	p		M	C	B	C	C
B	A142	Vanellus vanellus		r	20	30	p		M	D			

- Grupa: A = płazy, B = ptaki, F = ryby, I = bezkręgowce, M = ssaki, P = rośliny, R = gady.
- S: jeśli dane o gatunku są szczególnie chronione i nie mogą być udostępnione publicznie, należy wpisać „tak”.
- NP: jeśli dany gatunek nie występuje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Typ: p = osiadłe, r = wydające potomstwo, c = przelotne, w = zimujące (w przypadku roślin i gatunków niemigrujących należy użyć terminu „osiadłe”).
- Jednostka: i = osobniki pojedyncze, p = pary lub inne jednostki według standardowego wykazu jednostek i kodów zgodnego ze sprawozdawczością na podstawie art. 12 i 17 (zob. [portal referencyjny](#)).
- Kategorie liczebności (kategoria): C = powszechne, R = rzadkie, V = bardzo rzadkie, P = obecne - wypełnić, jeżeli brak jest danych (DD), lub jako uzupełnienie informacji o wielkości populacji.

- Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. zgrubne dane szacunkowe); DD = brak danych (kategorię tę należy stosować wyłącznie, jeśli nie da się dokonać nawet zgrubnej oceny wielkości populacji - w takiej sytuacji można pozostawić puste pole dotyczące wielkości populacji, jednak pole „Kategorie liczebności” musi być wypełnione).

4. OPIS OBSZARU

4.1. Ogólna charakterystyka obszaru

[Powrót](#)

Klasa siedliska przyrodniczego	Pokrycie [%]
N19	13.97
N06	2.47
N17	32.61
N10	23.63
N16	13.72
N23	0.09
N02	0.01
N07	3.72
N12	9.78
N01	0.0
Ogółem pokrycia siedliska przyrodniczego	100

Dodatkowa charakterystyka obszaru:

Obszar Natura 2000 Puszcza Goleniowska PLB320012 leży na wschodnim wybrzeżu Zalewu Szczecińskiego w makroregionie Pobrzeża Szczecińskiego, i obejmuje część mezoregionu Równiny Goleniowskiej oraz Doliny Dolnej Odry. Administracyjnie teren ten znajduje się w województwie zachodniopomorskim na terenie powiatu goleniowskiego (gminy: Goleniów, Przybiernów, Stepnica) oraz powiatu kamieńskiego (gmina Wolin). W granicach obszaru znajdują się 4 rezerваты przyrody: Uroczysko Święta im. prof. M. Jasnowskiego, Wiejkowski Las, Jezioro Czarne oraz Olszanka. Granice obszaru OSO są tożsame z granicami międzynarodowej ostoi ptaków IBA Puszcza Goleniowska PL009 (Wilk et al. 2010).

Obszar ostoi to bogata mozaika siedlisk. Obejmuje on wschodnią część rozległego i zwartego kompleksu Puszczy Goleniowskiej, przylegającą do łąk i pól położonych przy Roztoce Odrzańskiej i Zalewie Szczecińskim. Lasy obejmujące większą część obszaru (ponad 60%), przedstawiają dużą wartość przyrodniczą. Wśród występujących tu zbiorowisk można wyróżnić bory i lasy bagienne (dominują bory sosnowe – 54%), a także lasy mieszane i liściaste, w tym fragmenty cennych lasów dębowych, kwaśne buczyny, grądy oraz łągi olszowe i jesionowe. Wśród najcenniejszych dla awifauny siedlisk należy tu wymienić kompleks leśny na północ (rezerwat Olszanka) i południe (rezerwat Uroczysko Święta im. Prof. Mieczysława Jasnowskiego) od rzeki Krępa, obejmujący m.in. podmokłe, ponad 80 letnie drzewostany z olszą i dębami, a także występujące tu bory z ponad 100 letnimi sosnami, liściaste drzewostany w dolinach cieków oraz starodrzewia borowe i mieszane. Przez ostoję przepływają rzeki Gowienica, Krępa, Grzybnica oraz wiele mniejszych strumieni, stanowiące w dużej mierze cenne przyrodniczo ciek o naturalnym charakterze. Południową granicę obszaru stanowi rzeka Ina. Występują tu także liczne jeziora (duże, takie jak Ostrowo i Przybiernowskie, oraz mniejsze – Dołgie, Trzęsacz, Lewino i Zielonczyn), duże kompleksy stawów rybnych (w Miodowicach i Krokorzycach), a także tereny bagienne (m.in. torfianki k. Świętej) i torfowiska (w tym duże torfowisko typu bałtyckiego w rezerwacie „Olszanka”). Na większości zbiorników występuje roślinność wynurzona i pas szuwarów. Sieć hydrograficzna jest na tym terenie bardzo gęsta. Dotyczy to głównie jego południowej części, pokrytej bardzo dużą liczbą połączonych ze sobą kanałów i rowów

melioracyjnych. Bagna południowej części obszaru w większości położone są poniżej poziomu morza. Sieć hydrograficzna środkowej i północnej części obszaru jest mniej gęsta, choć występujące tutaj miejscami tereny łąkowo-bagienne (zwłaszcza na zachód od Jez. Ostrowo, w okolicy Rzystnowa, Zabierzewa, Brzozowa i Bogusława) również poprzecinane są wieloma rowami melioracyjnymi. Siedliska otwarte, na które składają się łąki, pastwiska, niewielkie fragmenty pól uprawnych oraz śródleśne polany, zajmują niecałe 30% powierzchni obszaru. Największe kompleksy łąk znajdują się w południowej części OSO, w dolinie rzeki Iny, rzeki Krępy oraz wzdłuż wschodniego brzegu Odry. Tereny rolne na południe od Stepnicy, w okolicach Rzystnowa, Miodowic i na północ od Przybiernowa, stanowią najcenniejsze żerowiska ptaków szponiastych w ostoi, zaś obszar tzw. Bagien Krępskich stanowi najważniejsze na Pomorzu łęgowisko podróźniczka, oraz miejsca skupienia większości lokalnej populacji łęgowej kszyska.

4.2. Jakość i znaczenie

Ostoja o znaczeniu międzynarodowym (IBA Puszcza Goleniowska PL009), spełniająca kryteria BirdLife International A1, B2, C1, C6. Stwierdzono tu występowanie 34 gatunków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, z czego 21 gatunków stanowią ptaki łęgowe, a status pozostałych określono jako przelotne lub zalatujące z pobliskich łęgów. W związku z wysoką liczebnością oraz zagęszczeniem stwierdzonych populacji, za przedmiot ochrony w obszarze uznano gatunki:

A051 krakwa (*Anas strepera*), pop. rozrodcza

Ocena ogólna: C, w tym:

- populacja: ocena C (wielkość populacji oszacowano na poziomie 25-40 par, co stanowi powyżej 1% populacji krajowej)
- stan zachowania: ocena B, stopień zachowania siedliska: II (znaczna liczba zbiorników wodnych z dogodną ilością miejsc do gniazdowania)
- izolacja: ocena C (populacja nieizolowana w obrębie rozległego obszaru występowania)

A229 zimorodek *Alcedo atthis*, pop. rozrodcza

Ocena ogólna: C, w tym:

- populacja: ocena C (wielkość populacji oszacowano na poziomie 20-30 par, co stanowi powyżej 1% populacji krajowej)
- stan zachowania: ocena B, stopień zachowania siedliska: II (odpowiednie warunki siedliskowe i żerowiskowe nad ciekami w lasach. Pary łęgowe zasiedlają głównie rzeki: Krępę, Inę, Gowienicę, Wolą Strugę oraz Grzybnicę, a także pojedynczo wzdłuż niewielkich cieków lub przy jeziorach)
- izolacja: ocena C (populacja nieizolowana w obrębie rozległego obszaru występowania)

A052 cyraneczka *Anas crecca*, pop. rozrodcza

Ocena ogólna: C, w tym:

- populacja: ocena C (wielkość populacji oszacowano na poziomie 10-20 par łęgowych, co stanowi powyżej 1% populacji krajowej)
- stan zachowania: ocena B, stopień zachowania siedliska: II (znaczna liczba zbiorników wodnych i cieków z dogodną ilością miejsc do gniazdowania)
- izolacja: ocena C (populacja nieizolowana w obrębie rozległego obszaru występowania)

A043 gęgawa *Anser anser*, pop. rozrodcza

Ocena ogólna: C, w tym:

- populacja: ocena C (wielkość populacji oszacowano na poziomie 45-50 par łęgowych, co stanowi powyżej 0,5% populacji krajowej)
- stan zachowania: ocena B, stopień zachowania siedliska: II (znaczna liczba zbiorników wodnych z dogodną ilością miejsc do gniazdowania)
- izolacja: ocena C (populacja nieizolowana w obrębie rozległego obszaru występowania)

A067 gągoł *Bucephala clangula*, pop. rozrodcza

Ocena ogólna: C, w tym:

- populacja: ocena C (wielkość populacji oszacowano na poziomie 25-35 par łęgowych, co w odniesieniu do populacji krajowej stanowi od 0,5% do ponad 1% populacji krajowej)
- stan zachowania: ocena B, stopień zachowania siedliska: II (znaczna liczba zbiorników wodnych i cieków w otoczeniu starszych drzewostanów)

•izolacja: ocena C (populacja nieizolowana w obrębie rozległego obszaru występowania)

A122 derkacz *Crex crex*, pop. rozrodca

Ocena ogólna: C, w tym:

- populacja: ocena C (wielkość populacji oszacowano na poziomie 100-180 terytorialnych samców, co w odniesieniu do populacji krajowej stanowi ok 0,5% populacji krajowej)
- stan zachowania: ocena B, stopień zachowania siedliska: II (znaczna powierzchnia łąk – w tym śródleśnych i terenów otwartych o odpowiedniej strukturze siedliskowej)
- izolacja: ocena C (populacja nieizolowana w obrębie rozległego obszaru występowania)

A038 łabędź krzykliwy *Cygnus cygnus*, pop. migrująca

Ocena ogólna: C, w tym:

- populacja: ocena C (wielkość populacji przelotnej spełnia kryterium C2 BirdLife International – obszar regularnie grupuje przynajmniej 1% populacji przelotnej gatunku; w okresie migracji stwierdzano zgrupowania 150-700 osobników)
- stan zachowania: ocena B, stopień zachowania siedliska: II (znaczna powierzchnia żerowisk i miejsc przestankowych o odpowiedniej strukturze siedliskowej)
- izolacja: ocena C (populacja nieizolowana w obrębie rozległego obszaru występowania)

A036 łabędź niemy *Cygnus olor*, pop. rozrodca

Ocena ogólna: C, w tym:

- populacja: ocena C (wielkość populacji oszacowano na poziomie 35-40 par lęgowych, co w odniesieniu do populacji krajowej stanowi ok 0,5%)
- stan zachowania: ocena B, stopień zachowania siedliska: II (znaczna liczba zbiorników wodnych z dogodną ilością miejsc do gniazdowania))
- izolacja: ocena C (populacja nieizolowana w obrębie rozległego obszaru występowania)

A038 dzięcioł średni *Dendrocoptes medius*, pop. rozrodca

Ocena ogólna: C, w tym:

- populacja: ocena C (wielkość populacji oszacowano na poziomie 70-90 par lęgowych, co w odniesieniu do populacji krajowej stanowi ok 0,5%)
- stan zachowania: ocena B, stopień zachowania siedliska: II (znaczna powierzchnia odpowiednich do gniazdowania fragmentów drzewostanów liściastych na siedliskach podmokłych, znaczna część stanowisk lęgowych jest chroniona w rez. Olszanka)
- izolacja: ocena C (populacja nieizolowana w obrębie rozległego obszaru występowania)

A038 dzięcioł średni *Dendrocoptes medius*, pop. rozrodca

Ocena ogólna: C, w tym:

- populacja: ocena C (wielkość populacji oszacowano na poziomie 70-90 par lęgowych, co w odniesieniu do populacji krajowej stanowi ok 0,5%)
- stan zachowania: ocena B, stopień zachowania siedliska: II (znaczna powierzchnia odpowiednich do gniazdowania fragmentów drzewostanów liściastych na siedliskach podmokłych; duża część stanowisk lęgowych jest skoncentrowana w rez. Olszanka)
- izolacja: ocena C (populacja nieizolowana w obrębie rozległego obszaru występowania)

A153 kszyszek *Gallinago gallinago*, pop. rozrodca

Ocena ogólna: C, w tym:

- populacja: ocena C (wielkość populacji oszacowano na poziomie 120-200 par lęgowych, co w odniesieniu do populacji krajowej stanowi ok 0,5%)
- stan zachowania: ocena B, stopień zachowania siedliska: II (populacja skoncentrowana na podmokłych łąkach – Bagnach Krępskich – w południowej części obszaru)
- izolacja: ocena C (populacja nieizolowana w obrębie rozległego obszaru występowania)

A127 żuraw *Grus grus*, pop. rozrodca

Ocena ogólna: C, w tym:

- populacja: ocena C (wielkość populacji oszacowano na poziomie 60-100 par lęgowych, co w odniesieniu do populacji krajowej stanowi ok 0,5%)

•stan zachowania: ocena B, stopień zachowania siedliska: II (duża dostępność dogodnych siedlisk lęgowych i żerowisk)

•izolacja: ocena C (populacja nieizolowana w obrębie rozległego obszaru występowania)

A075 bielik *Haliaeetus albicilla*, pop. rozrodcza

Ocena ogólna: C, w tym:

•populacja: ocena C (wielkość populacji oszacowano na poziomie 13-16 par lęgowych, co w odniesieniu do populacji krajowej stanowi od 0,5%-1%)

•stan zachowania: ocena B, stopień zachowania siedliska: II (znaczna powierzchnia odpowiednich do gniazdowania fragmentów drzewostanów, stanowiska lęgowe chronione poprzez ochronę strefową, bogata baza żerowiskowa na pobliskim Zalewie Szczecińskim; większość populacji lęgowej skoncentrowana w rezerwacie Olszanka)

•izolacja: ocena C (populacja nieizolowana w obrębie rozległego obszaru występowania)

A272 podróżniczek *Luscinia svecica*, pop. rozrodcza

Ocena ogólna: B, w tym:

•populacja: ocena B (wielkość populacji oszacowano na poziomie 30-60 par lęgowych, co w odniesieniu do populacji krajowej stanowi od 3,5%-4,5%)

•stan zachowania: ocena B, stopień zachowania siedliska: II (odpowiednie warunki siedliskowe, w szczególności na Bagnach Krępskich w południowej części obszaru, gdzie skoncentrowana jest większość populacji. Poza Bagnami Krępskimi, największe skupienia par występują w dolinie rzeki Iny (w międzywalu i sąsiadujących podmokłych łąkach) oraz w dolinie rzeki Krępy (zabagnione łąki na północ od rzeki oraz sąsiadujący fragment refulatu „Mańków”)

•izolacja: ocena C (populacja nieizolowana w obrębie rozległego obszaru występowania)

A074 kania ruda *Milvus milvus*, pop. rozrodcza

Ocena ogólna: C, w tym:

•populacja: ocena C (wielkość populacji oszacowano na poziomie 10-15 par lęgowych, co w odniesieniu do populacji krajowej stanowi od 0,7 do 1,0%)

•stan zachowania: ocena B, stopień zachowania siedliska: II (duża dostępność dogodnych siedlisk lęgowych i żerowisk)

•izolacja: ocena C (populacja nieizolowana w obrębie rozległego obszaru występowania)

A165 samotnik *Tringa ochropus*, pop. rozrodcza

Ocena ogólna: C, w tym:

•populacja: ocena C (wielkość populacji oszacowano na poziomie 50-70 par lęgowych, co w odniesieniu do populacji krajowej stanowi ok 0,5%)

•stan zachowania: ocena B, stopień zachowania siedliska: II (duża dostępność dogodnych siedlisk lęgowych i żerowisk)

•izolacja: ocena C (populacja nieizolowana w obrębie rozległego obszaru występowania)

4.3. Zagrożenia, presje i działania mające wpływ na obszar

Najważniejsze oddziaływania i działalność mające duży wpływ na obszar

Oddziaływania negatywne			
Poziom	Zagrożenia i presje [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnętrzne [i o b]
L	F03.01		b
L	K03.04		b
M	B01		i
H	D02.01.01		b
L	A02.03		i
L	A03.03		i

M	B02		i
L	C03.02		b
M	C03.03		b
M	E01.03		i
L	G01		b
M	G05.11		b
M	H01		b
M	I01		b
M	J02.01.02		b
L	J02.01.03		i
M	J02.02		i
H	M01.02		b
M	B02.02		i
M	D02.02		i
M	J01		b
M	J02.07		b
M	F03		i
H	J02.01		b
Oddziaływania pozytywne			
Poziom	Działania, zarządzanie [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnętrzne [i o b]
H	X		b

Poziom: H = wysoki, M = średni, L = niski.

Zanieczyszczenie: N = stosowanie azotu, P = stosowanie fosforu/fosforanów, A = stosowanie kwasów/zakwaszanie, T = toksyczne chemikalia nieorganiczne,

O = toksyczne chemikalia organiczne, X = zanieczyszczenia mieszane.

i = wewnętrzne, o = zewnętrzne, b = jednocześnie.

4.4. Własność (opcjonalnie)

Typ		[%]
Publiczna	Krajowa/federalna	0
	Kraj	0
	związkowy/województwo	0
	Lokalna/gminna	0
	Inna publiczna	0
Własność łączna lub współwłasność		0
Prywatna		0
Nieznana		100
Suma		100

4.5. Dokumentacja (opcjonalnie)

1) Staszewski A. 2010. Awifauna lęgowa Bagien Krępskich. Ptaki Pomorza 1: 17-26; 2) Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. (red). 2010. Ostoje ptaków o znaczeniu w Polsce. OTOP, Marki; 3) Przybycin P. 2014. Dokumentacja projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Goleniowska PLB320012. Mscr. wykonany na zlecenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie; 4) Guentzel S., Ławicki Ł. 2015. Inwentaryzacja ornitologiczna obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 PLB320012 Puszcza Goleniowska w sezonie 2014/2015. Mscr. wykonany na zlecenie Generalnego

Dyrektora Ochrony Środowiska;5) Chodkiewicz T., Chylarecki P., Sikora A. Wardecki Ł. Bobrek R., Neubauer G., Marchowski D., Dmoch A., Kuczyński L. 2019. Raport z wdrażania art. 12 Dyrektywy Ptasiej w Polsce w latach 2013-2018: stan, zmiany, zagrożenia. Biuletyn Monitoringu Przyrody 20: 1-80;6) Ławicki Ł., Staszewski A., Raclawski B., Barcz M., Jasiński M., Kajzer Z., Stańczak P., Guentzel S. 2020. Ocena liczebności populacji wybranych gatunków lęgowych ptaków obszaru Natura 2000 Puszcza Goleniowska. Ornithopolonica 61: 14-31;7) Jasiński M. 2022. Ekspertyza przyrodnicza na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy w obszarach Natura 2000 województwa zachodniopomorskiego: Puszcza Goleniowska PLB320012. Inwentaryzowane przedmioty ochrony: A074 kania ruda *Milvus milvus*, A075 bielik *Haliaeetus albicilla*, A153 kszyszek *Gallinago gallinago*, A229 zimorodek *Alcedo atthis*, A272 podróżniczek *Luscinia svecica*. Mscr. wykonany na zlecenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie.

5. STATUS OCHRONY OBSZARU (OPCJONALNIE)

5.1. Istniejące formy ochrony na poziomie krajowym i regionalnym:

[Powrót](#)

Kod	Pokrycie [%]	Kod	Pokrycie [%]	Kod	Pokrycie [%]
PL02	6.93				

5.2. Powiązanie opisanego obszaru z innymi formami ochrony:

na poziomie krajowym lub regionalnym:

Kod rodzaju	Nazwa terenu	Rodzaj	Pokrycie [%]
PL02	Uroczysko Święta im. Profesora Mieczysława Jasnowskiego	+	0.83
PL02	Wiejkowski Las	+	0.52
PL02	Jezioro Czarne	+	0.16
PL02	Olszanka	+	5.41

6. ZARZĄDZANIE OBSZAREM

6.1. Organ lub organy odpowiedzialne za zarządzanie obszarem:

[Powrót](#)

Organizacja:	Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
Adres:	Polska Juliusza Słowackiego 2 71-434 Szczecin
Adres e-mail:	sekretariat@szczecin.rdos.gov.pl

6.2. Plan(-y) zarządzania:

Aktualny plan zarządzania istnieje:

☒	Tak	Nazwa: ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Goleniowska PLB320012 Link: http://szczecin.rdos.gov.pl/files/artykuly/14580/Puszcza_Goleniowska_PLB320012.zip
☐	Nie, ale jest w przygotowaniu	
☐		

☐ Nie

7. MAPA OBSZARU

[Powrót](#)

Nr ID INSPIRE:

PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB320012

Mapa załączona jako plik PDF w formacie elektronicznym (opcjonalnie)

☒ Tak ☐ Nie

Odniesienie lub odniesienia do oryginalnej mapy wykorzystanej przy digitalizacji granic elektronicznych (opcjonalnie)