



NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

dla obszarów specjalnej ochrony (OSO),
proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (pOZW),
obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW) oraz
specjalnych obszarów ochrony (SOO)

OBSZAR PLH020015
NAZWA
OBSZARU Wrzosowisko Przemkowskie

ZAWARTOŚĆ

- [1. IDENTYFIKACJA OBSZARU](#)
- [2. POŁOŻENIE OBSZARU](#)
- [3. INFORMACJE PRZYRODNICZE](#)
- [4. OPIS OBSZARU](#)
- [5. STATUS OCHRONY OBSZARU](#)
- [6. POWIĄZANIA OBSZARU](#)
- [7. MAPA OBSZARU](#)

1. IDENTYFIKACJA OBSZARU

1.1. Typ B	1.2. Kod obszaru PLH020015	Powrót
---------------	-------------------------------	------------------------

1.3. Nazwa obszaru

Wrzosowisko Przemkowskie

1.4. Data opracowania 2002-11	1.5. Data aktualizacji 2024-03
----------------------------------	-----------------------------------

1.6. Instytucja lub osoba przygotowująca wniosek:

Nazwisko/Organizacja:	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Adres:	Polska Al. Jerozolimskie 136 Warszawa 02-305
Adres e-mail:	kancelaria@gdos.gov.pl

Data zaproponowania obszaru jako OZW:	2004-04
Data zatwierdzenia obszaru jako OZW(*):	2008-01
Data objęcia obszaru ochroną SOO:	2022-07
Krajowe odniesienie prawne dla formy ochrony SOO:	rozp. MKiŚ z dn. 13 czerwca 2022 r. w spr. soo Wrzosowisko Przemkowskie (PLH020015)

Wyjaśnienia:	Powiększenie pow. - 11.2019 r.
--------------	--------------------------------

2. POŁOŻENIE OBSZARU

2.1. Położenie centralnego punktu [wartości dziesiętne stopni]:

[Powrót](#)

Długość geograficzna
15.6799

Szerokość geograficzna
51.4334

2.2. Powierzchnia [ha]:
6675.91

2.3. Obszar morski [%]
0.0

2.5. Kod i nazwa regionu administracyjnego

Kod poziomu NUTS 2 Nazwa regionu

PL51	Dolnośląskie
------	--------------

2.6. Region biogeograficzny

Kontynentalny (100.0
%)

3. INFORMACJE PRZYRODNICZE

3.1. Typy siedlisk przyrodniczych występujących na terenie obszaru i ocena znaczenia obszaru dla tych siedlisk:

[Powrót](#)

Typy siedlisk wymienione w załączniku I						Ocena obszaru			
Kod	PF	NP	Pokrycie [ha]	Jaskinie [liczba]	Jakość danych	A B C D	A B C		
						Reprezentatywność	Powierzchnia względna	Stan zachowania	Ocena ogólna
2330			26.37		G	A	C	A	B
4030			1050.02		G	A	A	B	A
91T0			6.14		G	C	C	C	C

- PF: dla typów siedlisk, do których mogą odnosić się zarówno formy priorytetowe, jak i niepriorytetowe (6210, 7130, 9430) należy wpisać „x” w kolumnie PF celem wskazania formy priorytetowej.
- NP: jeśli dany typ siedliska nie istnieje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Pokrycie: można wpisywać z dokładnością do wartości dziesiętnych.
- Jaskinie: w przypadku siedlisk typu 8310 i 8330 (jaskinie) należy podać liczbę jaskiń, jeśli nie są dostępne szacunkowe dane na temat powierzchni.
- Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. zgrubne dane szacunkowe).

3.2. Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 2009/147/WE i gatunki wymienione w załączniku II do dyrektywy 92/43/EEWG oraz ocena znaczenia obszaru dla tych gatunków

Gatunki	Populacja na obszarze	Ocena obszaru
---------	-----------------------	---------------

Grupa	Kod	Nazwa naukowa	S	NP	Typ	Wielkość		Jednostka	Kategoria	Jakość danych	A B C D	A B C		
						Min	Maks		C R V P		Populacja	Stan zachowania	Izolacja	Ogólnie
M	1308	Barbastella barbastellus			w				P	G	C	C	C	C
A	1188	Bombina bombina			p					G	D			
M	1352	Canis lupus			p				R	G	C	B	B	B
M	1323	Myotis bechsteinii			p					G	D			
M	1324	Myotis myotis			w				P	G	C	C	C	C

- Grupa: A = płazy, B = ptaki, F = ryby, I = bezkręgowce, M = ssaki, P = rośliny, R = gady.
- S: jeśli dane o gatunku są szczególnie chronione i nie mogą być udostępnione publicznie, należy wpisać „tak”.
- NP: jeśli dany gatunek nie występuje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Typ: p = osiadłe, r = wydające potomstwo, c = przelotne, w = zimujące (w przypadku roślin i gatunków niemigrujących należy użyć terminu „osiadłe”).
- Jednostka: i = osobniki pojedyncze, p = pary lub inne jednostki według standardowego wykazu jednostek i kodów zgodnego ze sprawozdawczością na podstawie art. 12 i 17 (zob. [portal referencyjny](#)).
- Kategorie liczebności (kategoria): C = powszechne, R = rzadkie, V = bardzo rzadkie, P = obecne - wypełnić, jeżeli brak jest danych (DD), lub jako uzupełnienie informacji o wielkości populacji.
- Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. zgrubne dane szacunkowe); DD = brak danych (kategorię tę należy stosować wyłącznie, jeśli nie da się dokonać nawet zgrubnej oceny wielkości populacji - w takiej sytuacji można pozostawić puste pole dotyczące wielkości populacji, jednak pole „Kategorie liczebności” musi być wypełnione).

4. OPIS OBSZARU

4.1. Ogólna charakterystyka obszaru

[Powrót](#)

Klasa siedliska przyrodniczego	Pokrycie [%]
N08	0.71
N19	67.76
N09	11.36
N23	0.0
N17	20.16
N12	0.01
Ogółem pokrycia siedliska przyrodniczego	100

Dodatkowa charakterystyka obszaru:

Obszar Natura 2000 Wrzosowisko Przemkowskie PLH020015 położony jest w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego, na obszarze powiatu bolesławieckiego, w północnej części gminy Gromadka i w północno-wschodnim zasięgu gminy wiejskiej Bolesławiec. Obejmuje on głównie tereny dawnego poligonu przemkowskiego, znajdujące się pod zarządem Nadleśnictw Chocianów i Przemków oraz tereny jedynie w niewielkim stopniu podlegające władzom gminnym. Północna część obszaru leży w zachodniej części Wysoczyzny Lubińskiej zwanej Wzgórzami Chocianowskimi. Buduje je płaski garb moreny ablacyjnej dochodzący do wysokości 188 m n.p.m., zbudowany z glin morenowych częściowo pokrytych lessem. Część

południowa leży na obszarze mezoregionu Borów Dolnośląskich, w ich wschodniej części zwanej Równiną Nadbobrańską, pokrytej piaskami luźnymi. Tereny otwarte stanowią ok. 70% powierzchni obszaru, resztę pokrywają lasy, głównie bory sosnowe. Niewielki fragment obszaru leży w zasięgu Równiny Legnickiej, a dokładnie jej zachodniej części zwanej Doliną Czarnej Wody. Jest to płaskodenna dolina rzeczna zajęta przez łąki, pastwiska oraz bagienne bory sosnowe i lasy brzoźowe, pośród których występują torfowiska. Północna część obszaru położona jest w obrębie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego (22 338 ha) i jego otuliny (15 467 ha). W zasięgu granic obszaru zlokalizowany jest również użytek ekologiczny „Cietrzewiowe Wrzosowisko” o powierzchni 457,26 ha. Obszar Natura 2000 Wrzosowisko Przemkowskie PLH020015 leży w całości w granicach Obszaru Specjalnej Ochrony ptaków Bory Dolnośląskie PLB020005. W bliskim sąsiedztwie ostoi, po drugiej stronie Bobru znajduje się obszar Natura 2000 Wrzosowiska Świętoszowsko - Ławszowskie PLH020063.

Obszar zlokalizowany jest głównie na terenach leśnych, w mniejszej części terenach użytkowanych rolniczo. W związku z tym główną działalnością realizowaną w granicach obszaru jest działalność z zakresu gospodarki leśnej. Ze względu na znaczny udział wrzosowisk w obszarze ma on również duże znaczenie dla gospodarki pasiecznej w regionie. Nie przewiduje się, aby w perspektywie kolejnych lat w granicach obszaru nastąpiła zmiana dotychczasowych sposobów jego wykorzystywania.

4.2. Jakość i znaczenie

Obszar jest istotny dla zachowania leśnych oraz nieleśnych siedlisk przyrodniczych, szczególnie siedlisk o charakterze kserotermicznym i związanych z nimi cennymi gatunkami zwierząt stanowiącymi przedmioty ochrony obszaru.

Siedlisko 2330 Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis)

Na opisywanym obszarze siedlisko to ma charakter antropogeniczny. Ograniczone jest do miejsc, gdzie prowadzono niegdyś największą aktywność związaną z działaniem poligonu - mechaniczne rozjeżdżanie, eksplozje. W części centralnej siedlisko niemal całkowicie pozbawione jest roślinności. Na obrzeżach oraz w niektórych fragmentach w większych ilościach rośnie trzęślica modra *Molinia caerulea*, pojawia się również szczotlika siwa *Corynephorus canescens*, wrzos *Calluna vulgaris* oraz gatunki mszaków, głównie płonnik włosisty *Polytrichum piliferum*. Wiosną obserwuje się kilka gatunków terofitów, m.in.: chroszcz nagołodygowy *Teesdalia nudicaulis* i sporek wiosenny *Spergula morisonii*. Mniejsze fragmenty płatów siedliska w wyniku ustania czynników zaburzających przekształciły się we wrzosowiska. Jedynie na największym płacie siedliska obserwowano wyraźne procesy eoliczne. Siedlisko stanowi kilka płatów zlokalizowanych w południowej części Obszaru. Zajmuje powierzchnię ponad 26 ha, co mieści się w przedziale $2\% \geq p > 0\%$ powierzchni tego siedliska przyrodniczego występującego w całej Polsce (względna powierzchnia – „C”). Reprezentatywność oraz stan zachowania siedliska w obszarze oceniono na A (ocena doskonała). Ogólna ocena siedliska w obszarze B (dobra).

Siedlisko 4030 Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunetum, Calluno-Arctostaphylon)

Siedlisko na całym obszarze reprezentowane jest przez wariant 4030-2 - wrzosowisko knotnikowe Pohlio-Callunetum. Charakteryzuje się dość prostym składem gatunkowym roślin naczyniowych. Dominuje wrzos zwyczajny *Calluna vulgaris*, ponadto licznie występuje mietlica pospolita *Agrostis capillaris*, kostrzewa owcza *Festuca rubra*, jatrzębiec kosmaczek *Hieracium pilosella*, żarnowiec miotlasty *Cytisus scoparius* (miejscami). W niektórych miejscach (bardziej wilgotnych) rośnie trzęślica modra *Molinia caerulea* - niekiedy licznie. Charakterystyczna jest bogata w gatunki i dobrze rozwinięta warstwa mszysto-porostowa. Siedlisko wytwarza się na kwaśnych, ubogich i piaszczystych glebach. Płaty mogą mieć od kilku arów powierzchni (zwykle w lukach zadrzewień), aż po kilkadziesiąt hektarów. Wrzosowiska charakteryzują się antropogenicznym pochodzeniem. Wykształciły się na poligonie, gdzie dochodziło do mechanicznego niszczenia roślinności - rozjeżdżania przez pojazdy, wycinania roślinności drzewiastej, niekiedy również pożarów. Wrzosowisko jest pośrednim stadium sukcesyjnym pomiędzy wydumą a borem sosnowym, dlatego część powierzchni oznaczonych jako wydma (2330)

w wyniku ustania czynników zaburzających (głównie rozjeżdżania) przekształciła się w inicjalne postaci wrzosowisk. Siedlisko zajmuje w Obszarze powierzchnię ponad 1050 ha, co mieści się w przedziale $100\% \geq p > 15\%$ powierzchni tego siedliska przyrodniczego występującego w całej Polsce (względna powierzchnia – „A”). Aktualizacja danych na temat stanu zachowania siedliska w Obszarze w trakcie prac nad planem zadań ochronnych wykazała, że w stosunku do momentu powoływania Obszaru stan siedliska uległ pogorszeniu z powodu naturalnych przemian i zachodzącej na nim intensywnej sukcesji wtórnej. O końcowej ocenie stanu

zachowania siedliska zdecydowały obniżone oceny stopnia zachowania struktury, stopnia zachowania funkcji oraz możliwości odtworzenia siedliska, które mogą generować wysokie koszty w związku z wielkością powierzchni siedliska w Obszarze (stan zachowania oceniono na B - dobry). Reprezentatywność siedliska w obszarze oceniono na A (ocena doskonała). Ogólna ocena siedliska w obszarze A (ocena doskonała).

Siedlisko Sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum) Śródlądowy bór chrobotkowy występuje na skrajnie ubogich i suchych siedliskach leśnych, na których z reguły zajmuje niewielką powierzchnię pozostając w otoczeniu boru świeżego. W Obszarze siedlisko spotyka się głównie na suchych szczytach śródlądowych wydm, gdzie zajmuje zwykle powierzchnię od kilku do kilkunastu arów. Drzewostan na siedlisku buduje sosna *Pinus sylvestris* o słabym zwarcu wraz z brzozą brodawkowatą *Betula pendula*, która w dużej liczbie miejsc ma udział podobny do sosny, a w niektórych miejscach nawet większy. Runo boru buduje szereg gatunków porostów z rodzaju *Cladonia* (*C. rangiferina*, *C. arbuscula*, *C. mitis*, *C. gracilis*, *C. coccifera*) oraz płucnica islandzka *Cetraria islandica* decydując o charakterystycznym szarym zabarwieniu runa. Z porostami współwystępuje głównie rokit pospolity *Pleurozium schreberi* i knotnik zwisty *Pohlia nutans*, rzadziej widłoząb falisty *Dicranum polysetum*. Siedlisko zajmuje w Obszarze powierzchnię ponad 6 ha, co mieści się w przedziale $2\% \geq p > 0\%$ powierzchni tego siedliska przyrodniczego występującego w całej Polsce (względna powierzchnia – „C”). Reprezentatywność oraz stan zachowania siedliska w obszarze oceniono na C (ocena znacząca). Ogólna ocena siedliska w obszarze to również C (ocena znacząca).

1308 Mopek *Barbastella barbastellus*, 1324 Nocek duży *Myotis myotis*

Szacunkowa wielkość populacji wskazanych gatunków mieści się w przedziale $2\% \geq p > 0\%$ populacji krajowej (ocena C). Obszar dla wszystkich gatunków nietoperzy będących przedmiotami ochrony stanowi głównie tereny żerowiskowe. W zasięgu granic ostoi znane są jedynie dwa bardziej znaczące miejsca hibernacji obu gatunków, stanowiące niewielkie bunkry. Większe znane miejsca hibernacji znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie Obszaru (bunkry Wilkocin I, Wilkocin II). Gatunki mogą znajdować swoje letnie schronienia również na terenach przyległych do obszaru miejscowości, np. Trzebienia czy Starej Olesznej. Pozostałe parametry stan zachowania, izolacja i ocena ogólna oceniono na C (ocena znacząca).

1352 Wilk *Canis lupus*

Obszar jest fragmentem terytorium grupy rodzinnej wilków (tzw. watahy Przemków) zamieszkującej północno-wschodnią część Borów Dolnośląskich. Wataha ta jest częścią tzw. populacji niemiecko-zachodniopolskiej (Germany/Western Poland), która ma status krytycznie zagrożonej. Wataha Przemków jest jedną z siedmiu watah żyjących na terenie Borów Dolnośląskich. Użytkuje ona obszar położony pomiędzy rzeką Bóbr na zachodzie, drogą wojewódzką 328 łączącą Chojnow z Przemkowem na wschodzie, autostradą A18 na południu i drogą krajową nr 12 łączącą Szprotawę z Przemkowem na północy. W trakcie badań terenowych, prowadzonych w latach 2010-2012, regularnie stwierdzano obecność wilków w Obszarze. Wilki rejestrowano w całym obszarze, jednak najczęściej ślady ich obecności obserwowano na północ i północny-wschód od linii kolejowej łączącej Żagań z Legnicą na terenie Nadleśnictwa Przemków. Szacunkowa wielkość populacji gatunku wynosi 6-10 osobników, co mieści się w przedziale $2\% \geq p > 0\%$ populacji krajowej (ocena C). Pozostałe parametry stan zachowania, izolacja i ocena ogólna oceniono na B (ocena dobra).

1188 Kumak nizinny *Bombina bombina*

W ramach prowadzonych badań nie potwierdzono występowania gatunku w obszarze. Nie odnaleziono również publikacji, inwentaryzacji ani innych danych wskazujących miejsca rozrodu gatunku w Obszarze. W związku z tym populacji gatunku nadano ocenę D - populacja nieistotna.

4.3. Zagrożenia, presje i działania mające wpływ na obszar

Najważniejsze oddziaływania i działalność mające duży wpływ na obszar

Oddziaływania negatywne			
	Zagrożenia i presje	Zanieczyszczenie (opcjonalnie)	Wewnętrzne

Poziom	[kod]	[kod]	zewnątrzne [i o b]
H	K02.01		i
H	G04.02		i
H	D01.01		i
M	G05.07		b
M	B02.06		i
M	J03.01		i
M	D01.02		o
M	G01		b
M	K03.03		b
L	E03		i
L	H05.01		i

Oddziaływania pozytywne

Poziom	Działania, zarządzanie [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnątrzne [i o b]
L	X	X	i

Poziom: H = wysoki, M = średni, L = niski.

Zanieczyszczenie: N = stosowanie azotu, P = stosowanie fosforu/fosforanów, A = stosowanie kwasów/zakwaszanie, T = toksyczne chemikalia nieorganiczne,

O = toksyczne chemikalia organiczne, X = zanieczyszczenia mieszane.

i = wewnętrzne, o = zewnętrzne, b = jednocześnie.

4.4. Własność (opcjonalnie)

Typ	[%]
Publiczna	Krajowa/federalna
	Kraj
	związkowy/województwo
	Lokalna/gminna
Inna publiczna	
Własność łączna lub współwłasność	
Prywatna	
Nieznana	
Suma	

4.5. Dokumentacja (opcjonalnie)

1. Gula R., Brewczyński P. 2011. Program ochrony wilka *Canis lupus* w Polsce. Projekt, wersja z dnia 28.11.2011 r. SGGW Warszawa. Program przygotowany w ramach projektu pt. „Opracowanie krajowych strategii gospodarowania wybranymi gatunkami zagrożonymi lub konfliktowymi” koordynowanego przez SGGW w Warszawie. 2. Jędrzejewski W., Nowak S., Schmidt K., Jędrzejewska B. 2002. Wilk i ryś w Polsce – wyniki inwentaryzacji w 2001 roku. *Kosmos* 51: 491-4993. Jędrzejewski W., Niedziałkowska M., Hayward M. W., Goszczyński J., Jędrzejewska B., Borowik T., Bartoń K. A., Nowak S., Harmuszkiewicz J., Juszczyk A., Kałamarz T., Kloch A., Koniuch J., Kotiuk K., Mysłajek R. W., Nędzyńska M., Olczyk A., Teleon M., Wojtulewicz M. 2012. Prey choice and diet of wolves related to ungulate communities and wolf subpopulations in Poland. *Journal of Mammalogy* 93: 1480-14924. Kaźmierczak T. 2009. Florystyczna i fitosocjologiczna charakterystyka zbiorowisk z udziałem wrzosu zwyczajnego *Calluna vulgaris* (L.) Hull na terenie użytku ekologicznego „Cietrzewiowe Wrzosowisko”. Praca magisterska wykonana w Zakładzie Bioróżnorodności i Ochrony Szaty Roślinnej Instytutu Biologii Roślin Uniwersytetu Wrocławskiego. 5. Łupicki

D. 2012. Raport z prac terenowych prowadzonych w OZW Wrzosowisko Przemkowskie PLH020015 w zakresie chirofauny.6. Malicki M., Pielech R., Wójcicka A. 2012. Raport z prac terenowych prowadzonych w OZW Wrzosowisko Przemkowskie PLH020015 w zakresie rozmieszczenia i stanu zachowania siedlisk przyrodniczych.7. Mysłajek R. W., Pierużek-Nowak S., Nowak C., Harms V. 2011. Przeprowadzenie monitoringu populacji wilka *Canis lupus* w Borach Dolnośląskich. Raport: Wyniki monitoringu populacji wilka *Canis lupus* w Borach Dolnośląskich. Etap I. Wildlife Consulting, Twardorzeczka.8. Mysłajek R. W., Pierużek-Nowak S., Nowak C., Harms V. 2012. Przeprowadzenie monitoringu populacji wilka *Canis lupus* w Borach Dolnośląskich. Raport: Wyniki monitoringu populacji wilka *Canis lupus* w Borach Dolnośląskich. Etap II. Wildlife Consulting, Twardorzeczka.9. Nowak S., Mysłajek R. W., Jędrzejewska B. 2008. Density and demography of wolf *Canis lupus* population in the western-most part of the Polish Carpathian Mountains, 1996-2003. *Folia Zoologica* 57: 392-402.10. Nowak S., Mysłajek R.W. 2011. Wilki na zachód od Wisły. Stowarzyszenie dla Natury "Wilk", Twardorzeczka.11. Nowak S., Mysłajek R. W., Kłosińska A., Gabryś G. 2011. Diet and prey selection of wolves (*Canis lupus*) recolonising Western and Central Poland. *Mammal Biol.* doi: 10.1016/j.mambio.2011.06.007.12. Pierużek-Nowak S., Mysłajek R. W. 2013. Ekspertyza przyrodnicza w zakresie wilka *Canis lupus* na potrzeby projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wrzosowisko Przemkowskie PLH020015. Wildlife Consulting, Twardorzeczka, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu.13. Ruszlewicz A. 2006. Plan lokalnej współpracy na rzecz ochrony obszaru Natura 2000 - PLH020015 Wrzosowiska Przemkowskie. Ministerstwo Środowiska.14. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Plan zadań ochronnych obszaru Natura 2000 Wrzosowisko Przemkowskie PLH020015, 2012-2013.

5. STATUS OCHRONY OBSZARU (OPCJONALNIE)

5.1. Istniejące formy ochrony na poziomie krajowym i regionalnym:

[Powrót](#)

Kod	Pokrycie [%]	Kod	Pokrycie [%]	Kod	Pokrycie [%]
PL03	62.08				

5.2. Powiązanie opisanego obszaru z innymi formami ochrony:

na poziomie krajowym lub regionalnym:

Kod rodzaju	Nazwa terenu	Rodzaj	Pokrycie [%]
PL03	Przemkowski Park Krajobrazowy	*	62.08

6. ZARZĄDZANIE OBSZAREM

6.1. Organ lub organy odpowiedzialne za zarządzanie obszarem:

[Powrót](#)

Organizacja:	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Adres:	Polska Al. Jana Matejki 6 50-333 Wrocław
Adres e-mail:	sekretariat@rdos.wroclaw.pl

6.2. Plan(-y) zarządzania:

Aktualny plan zarządzania istnieje:

☒	Tak	Nazwa: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia
-------------------------------------	-----	--

18 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wrzosowisko Przemkowskie PLH020015

Link: <https://edzienniki.duw.pl/legalact/2014/2813/>

Nazwa: Plan zadań ochronnych dla Obszaru Specjalnej Ochrony ptaków Bory Dolnośląskie PLB020005

Link: <http://wroclaw.rdos.gov.pl/>

Nazwa: Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Przemków na okres od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2023r.

Link: <http://www.przemkow.wroclaw.lasy.gov.pl/>

Nazwa: Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Chocianów na okres od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2023r.

Link: <http://www.chocianow.wroclaw.lasy.gov.pl/>

Nazwa: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 19 października 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wrzosowisko Przemkowskie PLH020015

Link: <https://edzienniki.duw.pl/legalact/2017/4299/>

☐ Nie, ale jest w przygotowaniu

☐ Nie

6.3. Środki ochrony (opcjonalne)

W obrębie obszaru Natura 2000 w miejscach lokalizacji siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków stanowiących przedmioty ochrony zaplanowane są działania z zakresu ochrony czynnej związane z modyfikacją metod gospodarowania w zakresie gospodarki leśnej i przeciwdziałaniem sukcesji wtórnej. Poza ochroną czynną plan zadań ochronnych wskazuje na potrzebę podjęcia działań monitoringowych i uzupełniających wiedzę na temat wybranych przedmiotów ochrony.

7. MAPA OBSZARU

[Powrót](#)

Nr ID INSPIRE:

PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH020015

Mapa załączona jako plik PDF w formacie elektronicznym (opcjonalnie)

☒ Tak ☐ Nie

Odniesienie lub odniesienia do oryginalnej mapy wykorzystanej przy digitalizacji granic elektronicznych (opcjonalnie)