



NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

dla obszarów specjalnej ochrony (OSO),
proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (pOZW),
obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW) oraz
specjalnych obszarów ochrony (SOO)

OBSZAR PLH020021
NAZWA
OBSZARU Wzgórze Kielczyńskie

ZAWARTOŚĆ

- [1. IDENTYFIKACJA OBSZARU](#)
- [2. POŁOŻENIE OBSZARU](#)
- [3. INFORMACJE PRZYRODNICZE](#)
- [4. OPIS OBSZARU](#)
- [5. STATUS OCHRONY OBSZARU](#)
- [6. POWIĄZANIA OBSZARU](#)
- [7. MAPA OBSZARU](#)

1. IDENTYFIKACJA OBSZARU

1.1. Typ B	1.2. Kod obszaru PLH020021	Powrót
---------------	-------------------------------	------------------------

1.3. Nazwa obszaru

Wzgórze Kielczyńskie

1.4. Data opracowania 2003-11	1.5. Data aktualizacji 2025-01
----------------------------------	-----------------------------------

1.6. Instytucja lub osoba przygotowująca wniosek:

Nazwisko/Organizacja:	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Adres:	Polska Al. Jerozolimskie 136 Warszawa 02-305
Adres e-mail:	kancelaria@gdos.gov.pl

Data zaproponowania obszaru jako OZW:	2006-09
Data zatwierdzenia obszaru jako OZW(*):	2009-02
Data objęcia obszaru ochroną SOO:	2021-10
Krajowe odniesienie prawne dla formy ochrony SOO:	rozp. MKiŚ z dn. 2 września 2021 r. w spr. soo Wzgórze Kielczyńskie (PLH020021)

Wyjaśnienia:	Powiększenie - 03.2007 r.
--------------	---------------------------

2. POŁOŻENIE OBSZARU

2.1. Położenie centralnego punktu [wartości dziesiętne stopni]:

[Powrót](#)

Długość geograficzna
16.6301

Szerokość geograficzna
50.8184

2.2. Powierzchnia [ha]:
403.64

2.3. Obszar morski [%]
0.0

2.5. Kod i nazwa regionu administracyjnego

Kod poziomu NUTS 2 Nazwa regionu

PL51	Dolnośląskie
------	--------------

2.6. Region biogeograficzny

Kontynentalny (100.0
%)

3. INFORMACJE PRZYRODNICZE

3.1. Typy siedlisk przyrodniczych występujących na terenie obszaru i ocena znaczenia obszaru dla tych siedlisk:

[Powrót](#)

Typy siedlisk wymienione w załączniku I						Ocena obszaru			
Kod	PF	NP	Pokrycie [ha]	Jaskinie [liczba]	Jakość danych	A B C D	A B C		
						Reprezentatywność	Powierzchnia względna	Stan zachowania	Ocena ogólna
6210			0.43		G	C	C	C	C
6510			0.23		M	D			
8150			0.1		G	D			
8220			1.38		G	A	C	A	A
9170			36.39		G	C	C	C	C
9110			28.25		G	C	C	C	C

- PF: dla typów siedlisk, do których mogą odnosić się zarówno formy priorytetowe, jak i niepriorytetowe (6210, 7130, 9430) należy wpisać „x” w kolumnie PF celem wskazania formy priorytetowej.
- NP: jeśli dany typ siedliska nie istnieje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Pokrycie: można wpisywać z dokładnością do wartości dziesiętnych.
- Jaskinie: w przypadku siedlisk typu 8310 i 8330 (jaskinie) należy podać liczbę jaskiń, jeśli nie są dostępne szacunkowe dane na temat powierzchni.
- Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. zgrubne dane szacunkowe).

3.2. Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 2009/147/WE i gatunki wymienione w załączniku II do dyrektywy

92I43IEWG oraz ocena znaczenia obszaru dla tych gatunków

Gatunki					Populacja na obszarze						Ocena obszaru			
Grupa	Kod	Nazwa naukowa	S	NP	Typ	Wielkość		Jednostka	Kategoria	Jakość danych	A B C D	A B C		
						Min	Maks		C R V P		Populacja	Stan zachowania	Izolacja	Ogólnie
P	4066	Asplenium adulterinum			p	300	500	i	P	G	A	B	A	A
M	1324	Myotis myotis			r	51	100	i	R	M	C	B	C	C

- Grupa: A = płazy, B = ptaki, F = ryby, I = bezkręgowce, M = ssaki, P = rośliny, R = gady.
- S: jeśli dane o gatunku są szczególnie chronione i nie mogą być udostępnione publicznie, należy wpisać „tak”.
- NP: jeśli dany gatunek nie występuje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Typ: p = osiadłe, r = wydające potomstwo, c = przelotne, w = zimujące (w przypadku roślin i gatunków niemigrujących należy użyć terminu „osiadłe”).
- Jednostka: i = osobniki pojedyncze, p = pary lub inne jednostki według standardowego wykazu jednostek i kodów zgodnego ze sprawozdawczością na podstawie art. 12 i 17 (zob. [portal referencyjny](#)).
- Kategorie liczebności (kategoria): C = powszechne, R = rzadkie, V = bardzo rzadkie, P = obecne - wypełnić, jeżeli brak jest danych (DD), lub jako uzupełnienie informacji o wielkości populacji.
- Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. zgrubne dane szacunkowe); DD = brak danych (kategorię tę należy stosować wyłącznie, jeśli nie da się dokonać nawet zgrubej oceny wielkości populacji - w takiej sytuacji można pozostawić puste pole dotyczące wielkości populacji, jednak pole „Kategorie liczebności” musi być wypełnione).

3.3. Inne ważne gatunki fauny i flory (opcjonalnie)

Gatunek					Populacja na obszarze				Motywacja						
Grupa	KOD	Nazwa naukowa	S	NP	Wielkość		Jednostka	Kategoria	Gatunki wymienione w załączniku		Inne kategorie				
					Min	Maks		C R V P	IV	V	A	B	C	D	
M	1314	Myotis daubentonii			11	50	i	C	X				X		
M	1309	Pipistrellus pipistrellus			11	50	i	C	X				X		

- Grupa: A = płazy, B = ptaki, F = ryby, Fu = grzyby, I = bezkręgowce, L = porosty, M = ssaki, P = rośliny, R = gady.
- KOD: w odniesieniu do ptaków z gatunków wymienionych w załączniku IV i V należy zastosować nazwę naukową oraz kod podany na portalu referencyjnym.
- S: jeśli dane o gatunku mają charakter poufny i nie mogą być udostępnione publicznie, należy wpisać „tak”.
- NP: jeśli dany gatunek nie występuje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Jednostka: i = osobniki pojedyncze, p = pary lub inne jednostki Według standardowego Wykazu jednostek i kodów zgodnego ze sprawozdawczością na podstawie art. 12 i 17 (zob. [portal referencyjny](#)).
- Kategoria: kategorie liczebności (kategoria): C = powszechne, R = rzadkie, V = bardzo rzadkie, P = występuje.
- Kategorie motywacji: IV, V: gatunki z załączników do dyrektywy siedliskowej, A: dane z Krajowej Czerwonej Listy; B: gatunki endemiczne; C: konwencje międzynarodowe; D: inne powody

4. OPIS OBSZARU

[Powrót](#)

4.1. Ogólna charakterystyka obszaru

Klasa siedliska przyrodniczego	Pokrycie [%]
N16	32.23
N17	28.96
N19	33.77
N12	5.04
Ogółem pokrycia siedliska przyrodniczego	100

Dodatkowa charakterystyka obszaru:

Obszar o powierzchni 403,64 ha położony jest na Przedgórzu Sudeckim, na zachód od Masywu Ślęży w województwie dolnośląskim (powiat dzierżoniowski, gmina Dzierżonów oraz powiat świdnicki, gmina Marcinowice). Wzgórza stanowią niewielkie, zbudowane z serpentynitu, pasmo zalesionego terenu rozciągniętego wrzecionowato ze wschodu na zachód. Najwyższa ich część to skalisty wierzchołek Szczytna (466 m n. p. m.). Obszar obejmuje głównie siedliska leśne należące do Skarbu Państwa w zarządzie PGL - Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Miękinia. Przedmiotami ochrony w obszarze są 9170 grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (*Galio-Carpinetum*, *Tilio-Carpinetum*) i 9110 ciepłolubne dąbrowy (*Quercetalia pubescenti-petraeae*) z licznymi wychodniami skalnymi tworzącymi siedliska 8220 ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z *Androsacion vandellii* oraz 6210 murawy kserotermiczne (*Festuco-Brometalia*). Kluczowy przedmiot ochrony w obszarze to paproć zanokcica serpentynowa (*Asplenium adnigrum*).

4.2. Jakość i znaczenie

Siedlisko 6210 Murawy kserotermiczne (*Festuco-Brometalia* i ciepłolubne murawy z *Asplenion septentrionalis-Festucion pallescens*)

Murawy kserotermiczne zachowały się tylko we fragmentach, na granicy pomiędzy lasem a polami oraz na jednej z polan w szczytowej partii zachodniej części Wzgórz Kielczyńskich. Fragment murawy kserotermicznej nad nieczynnym kamieniołomem koło Książnicy jest obsadzony sosną zwyczajną *Pinus sylvestris*. Występują tu gatunki ciepłolubne takie jak strzępica nadobna *Koeleria macrantha*, kostrzewa owcza *Festuca ovina*, goździk kartuzek *Dianthus carthusianorum*, macierzanka zwyczajną *Thymus pulegioides* oraz zanokcica klinowata *Asplenium cuneifolium* – w murawach tych ma swoje ostatnie znane stanowisko na Dolnym Śląsku leniec alpejski *Thesium alpinum*. Obecnie na siedlisku nie jest prowadzone użytkowanie kośno-pastwiskowe. Siedlisko zachowane jest w stopniu złym, ekstensywny wypas (lub koszenie) powinno zapewnić poprawę stanu ochrony siedliska. Siedlisko zajmuje niewielką powierzchnię około 0,11% obszaru, (0,43 ha), jako bardzo rzadkie w Sudetach powinno podlegać ochronie czynnej.

Siedlisko 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (*Arrhenatherion elatioris*)

Skrajnie rzadkie na terenie obszaru (jeden płat siedliska o powierzchni 0,23 ha, stanowiący około 0,06 % powierzchni obszaru). Z uwagi na występowanie siedliska na skrajnie małej powierzchni i niewielką wartość ochronną – reprezentatywność siedliska oceniono jako nieistotną (kategoria D).

Siedlisko 8150 Środkowoeuropejskie wyżynne piargi i gołoborza krzemianowe

Jedyny płat siedliska w obszarze zlokalizowany jest pod szczytem najwyższego wzniesienia Wzgórz Kielczyńskich - Szczytniej. Gołoborze serpentynitowe z licznym udziałem ciemniężka białokwiatowego *Vincetoxicum hirundinaria* i narecznicy samczej *Dryopteris filix-mas*. Pomimo, iż siedlisko występuje w obszarze na znikomej powierzchni (0,1 ha, co stanowi około 0,02 %, powierzchni obszaru) i charakteryzuje się złym stanem zachowania, to z uwagi na fakt, iż jest rzadkie w Polsce (znane tylko z Dolnego Śląska gdzie posiada obecnie 6-8 stanowisk oraz na pojedynczych stanowiskach z Beskidu i Bieszczad), proponuje się

wpisanie ww. siedliska do SDF z kategorią D.

Siedlisko 8220 Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z *Androsacetalia vandellii*
W szczelinach skalnych – zarówno na skałach naturalnych, jak i w odkrywkach dawnych kamieniołomów -
rozwijają się pionierskie zbiorowiska paproci skalnych z udziałem zanokcicy serpentynowej *Asplenium*
adulterinum, zanokcicy klinowatej *Asplenium cuneifolium*, zanokcicy skalnej *Asplenium trichomanes* i
paprotki zwyczajnej *Polypodium vulgare*. Stanowiska te zajmują powierzchnię około 1,39 ha (około 0,35 %
powierzchni obszaru). Z uwagi na fakt, iż w obrębie siedliska występuje największa w kraju populacja
zanokcicy serpentynowej *Asplenium adulterinum*, siedlisko to jest szczególnie ważne dla zachowania
różnorodności biologicznej obszaru i kluczowe dla utrzymania populacji zanokcicy serpentynowej *Asplenium*
adulterinum.

9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (*Galio-Carpinetum*, *Tilio-Carpinetum*)

Występowanie siedliska na terenie Wzgórz Kiełczyńskich potwierdzono w 2015 roku w ramach uzupełnienia
stanu wiedzy o przedmiotach ochrony obszaru Natura 2000. Występowanie siedliska stwierdzono w
miejscach wskazanych w planie zadań ochronnych jako siedlisko 9190 kwaśne dąbrowy (*Quercion*
robori-petraeae), które na terenie Wzgórz Kiełczyńskich zostało stwierdzone w ramach powszechnej
inventaryzacji Lasów Państwowych w 2007 roku. Wówczas do tego typu siedliska zakwalifikowano zarówno
dojrzałe drzewostany dębowe, jak i lasy gospodarcze z wysokim udziałem sosny, a nawet olchy. Część
płatów siedliska nie była objęta rozpoznaniem terenowym, a wszystkie drzewostany dębowe zweryfikowane
w latach 2010-2013 wykazały przynależność do siedliska 9110. Pozostałe płaty zakwalifikowane wówczas
jako siedlisko 9190, przynależą do siedliska 9170, za wyjątkiem szczytowej partii wydzielania 13-17-2-14-250
k, gdzie rozwija się siedlisko 9110.

Kombinacja gatunkowa odpowiada najbardziej skrajnym postaciom acydofilnych grądów wysokich. Siedlisko
zajmuje powierzchnię 36,39 ha, co stanowi 9,02 % powierzchni obszaru Natura 2000. Stan zachowania 4
płatów siedliska oceniono na niezadowalający, a 3 na zły. Ponadto z uwagi na planowane zabiegi trzebieży,
które mogą spowodować pogorszenie stanu siedliska, perspektywy ochrony oceniono jako niezadowalające.

Siedlisko *9110 Ciepłolubne dąbrowy (*Quercetalia pubescenti-petraeae*)

Na terenie Wzgórz Kiełczyńskich siedlisko występuje na stokach południowych oraz na kopułach
szczytowych, w miejscach gdzie podłoże serpentynitowe jest pokryte cienką warstwą gleby. Zgodnie
z najnowszą analizą syntaksonomiczną należą one do zbiorowiska *Galium verum-Quercus petraea*,
zbliżonego do niżowych dąbrów świetlistych *Potentillo albae-Quercetum*. Charakteryzuje je występowanie,
nawet w niewielkich liczebnościach, gatunków takich jak zanokcica klinowata *Asplenium cuneifolium*, lepnica
rozdęta *Silene vulgaris* czy przytulia właściwa *Galium verum*. Siedlisko o wysokiej randze w obszarze,
ponieważ stwierdzona tu postać geograficzno-ekologiczna ciepłolubnych dąbrów związana z podłożem
serpentynitowym występuje w Polsce wyłącznie w obszarach Natura 2000 Wzgórz Kiełczyńskie PLH020021
oraz Masyw Ślęży PLH020040. Siedlisko zajmuje powierzchnię 30,21 ha (około 7,49 % powierzchni
obszaru).

4066 Zanokcica serpentynowa (*Asplenium adulterinum*)

Gatunek paproci ściśle związany z siedliskami serpentynitowymi, występujący w Polsce wyłącznie
na Dolnym Śląsku w Sudetach i na ich Przedgórzu. Na chwilę obecną łącznie znanych jest nie więcej jak
600 kęp tego gatunku, przy czym około 80% populacji utrzymuje się w obszarze Wzgórz Kiełczyńskie.
Zanokcica serpentynowa *Asplenium adulterinum* jest kluczowym przedmiotem ochrony
w obszarze, który został utworzony głównie z uwagi na występowanie tego gatunku. Łącznie populacja
występuje na 7 stanowiskach w obszarze.

1324 Nocek duży (*Myotis myotis*)

Populacja rozrodcza mająca schronienie na strychu kościoła w Kiełczynie (obszar mający znaczenie dla
Wspólnoty Kiełczyn PH020099) nierównomiernie wykorzystuje cały obszar Wzgórz Kiełczyńskich jako
żerowisko. Populacja w obszarze to około 51-100 osobników, co stanowi mniej niż 1% populacji krajowej.
Stopień zachowania siedliska trudny do oceny ze względu na brak odpowiednich wskaźników dla
prawidłowej oceny żerowisk nocka dużego *Myotis myotis*. Populacja nieizolowana, w obrębie rozległego
obszaru występowania.

1314 Nocek rudy (*Myotis daubentonii*)

1309 Karlik malutki (*Pipistrellus pipistrellus*)

Z pośród innych gatunków nietoperzy najliczniej na terenie Wzgórz Kieleczyńskich rejestrowano nocki rude *Myotis daubentonii* i karliki malutkie *Pipistrellus pipistrellus* – gatunki nietoperzy z załącznika IV Dyrektywy siedliskowej oraz chronione przez Konwencję Berneńską i Konwencję Bońską. Oba te gatunki wykorzystują cały obszar leśny Wzgórz Kieleczyńskich jako żerowisko kolonii rozrodnych zlokalizowanych najprawdopodobniej na terenie okolicznych miejscowości. W przypadku nocka rudego *Myotis daubentonii* odnotowano przelot kilku osobników koło kościoła w Kieleczynie, co może wskazywać na obecność kolonii w tej miejscowości.

Zanokcica klinowata *Asplenium cuneifolium*

Gatunek paproci ściśle związany z siedliskami serpentynitowymi, występujący w Polsce wyłącznie na Dolnym Śląsku w Sudetach i na ich Przedgórzu, często towarzyszy zanokcicy serpentynowej *Asplenium adulterinum*. Na chwilę obecną łącznie znanych jest nie więcej jak 1000 kęp tego gatunku, przy czym około 90% populacji utrzymuje się na terenie Wzgórz Oleszeńskich i na Raduni (w granicach obszaru Natura 2000 Masyw Ślęży PLH020040), Populacje na terenie Wzgórz Kieleczyńskich podlegają podobnym zagrożeniom jak zanokcica serpentynowa *Asplenium adulterinum* i są bardzo nieliczne. Gatunek należy do gatunków kluczowych siedliska 8220 ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z *Androsacetalia vandellii* w Polsce.

Leniec alpejski *Thesium alpinum*

Gatunek związany w Polsce z murawami kserotermicznymi, wszystkie stanowiska znane na Dolnym Śląsku w wieku XIX wydają się być obecnie wygasłe. Stanowisko na terenie Wzgórz Kieleczyńskich jest ostatnim ze znanych, a gatunek utrzymuje się tu w liczbie nie przekraczającej 10 okazów. Jest gatunkiem kluczowym siedliska 6210 – murawy kserotermiczne.

W poprzednich wersjach SDF wykazywane było siedlisko przyrodnicze: 9190 Kwaśne dąbrowy (*Quercion robori-petraeae*) – w 2019 Komisja Europejska zaakceptowała usunięcie ich z listy przedmiotów ochrony w obszarze

4.3. Zagrożenia, presje i działania mające wpływ na obszar

Najważniejsze oddziaływania i działalność mające duży wpływ na obszar

Oddziaływania negatywne			
Poziom	Zagrożenia i presje [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnętrzne [i o b]
M	A10.01		o
M	F04.01		o
H	A03.03		i
M	J01.01		o
M	G01.04		o
H	I01		i
H	K02.01		i
M	G05.04		o
H	I02		i
H	J03.01		i
Oddziaływania pozytywne			
Poziom	Działania, zarządzanie [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnętrzne [i o b]
M	X		b

Poziom: H = wysoki, M = średni, L = niski.

Zanieczyszczenie: N = stosowanie azotu, P = stosowanie fosforu/fosforanów, A = stosowanie kwasów/zakwaszanie, T = toksyczne chemikalia nieorganiczne, O = toksyczne chemikalia organiczne, X = zanieczyszczenia mieszane.
i = wewnętrzne, o = zewnętrzne, b = jednocześnie.

4.4. Własność (opcjonalnie)

Typ		[%]
Publiczna	Krajowa/federalna	0
	Kraj	0
	związkowy/województwo	0
	Lokalna/gminna	0
	Inna publiczna	0
Własność łączna lub współwłasność		0
Prywatna		0
Nieznana		100
Suma		100

4.5. Dokumentacja (opcjonalnie)

1. Świerkosz K. Reczyńska K. 2015. Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiotach ochrony w obszarze Natura 2000 Wzgórza Kielczyńskie PLH020021 w zakresie siedlisk przyrodniczych 9190 kwaśne dąbrowy oraz 9110 ciepłolubne dąbrowy 2. Gottfried T. 2013. Ekspertyza przyrodnicza wykonana na potrzeby opracowania planu zadań ochronnych Wzgórza Kielczyńskie PLH020021. Nietoperze.3. Kaźmierczakowa R., Zarzycki K. (red.) 2001. Polska Czerwona Księga Roślin Inst. Bot. PAN, Inst. Ochr. Przyr. PAN, Kraków 4. Świerkosz K. Reczyńska K. 2013. Ekspertyza przyrodnicza wykonana na potrzeby opracowania planu zadań ochronnych Wzgórza Kielczyńskie PLH020021. Siedliska przyrodnicze. 5. Świerkosz K., Szczęśniak E. 2003. Stan populacji i zagrożenia wybranych gatunków naskalnych na Dolnym Śląsku. W: Z. Kącki (red.) Zagrożone gatunki flory naczyniowej Dolnego Śląska. Inst. Biol. Rośl. UW-PTOP „pro Natura”, Wrocław. 69-83.6. Świerkosz K., Żołnierz L., Kromer K., Kordiak E., Malinowski B., Góral G., Drozdowska M., Zając O., Mazur L., Dzięcielski J., Zaremba W., Cieślak M., Śnigucki P. 2007 Krajowy plan zarządzania gatunkiem zanokcica serpentynowa *Asplenium adulterinum*. Ministerstwo Środowiska pp. 1-23.7. Żołnierz L., Kromer K., Świerkosz K. 2008. Ladder spleenwort (*Asplenium adulterinum* Milde) in Poland - distribution, population state and conservation plan framework W: Club mosses, horsetails and ferns in Poland - resources and protection / Ewa Szczęśniak, Edyta Gola (editors) : Polish Botanical Society ; Institute of Plant Biology University of Wrocław. P. 29-45

5. STATUS OCHRONY OBSZARU (OPCJONALNIE)

5.1. Istniejące formy ochrony na poziomie krajowym i regionalnym:

[Powrót](#)

Kod	Pokrycie [%]	Kod	Pokrycie [%]	Kod	Pokrycie [%]
PL03	98.21				

5.2. Powiązanie opisanego obszaru z innymi formami ochrony:

na poziomie krajowym lub regionalnym:

Kod rodzaju	Nazwa terenu	Rodzaj	Pokrycie [%]

6. ZARZĄDZANIE OBSZAREM

6.1. Organ lub organy odpowiedzialne za zarządzanie obszarem:

[Powrót](#)

Organizacja:	Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Adres:	Polska plac Powstańców Warszawy 1 50-153 Wrocław
Adres e-mail:	sekretariat@rdos.wroclaw.pl

6.2. Plan(-y) zarządzania:

Aktualny plan zarządzania istnieje:

☒ Tak	Nazwa: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 21 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wzgórza Kiełczyńskie PLH020021 Link: https://edzienniki.duw.pl/legalact/2017/3918/
☐ Nie, ale jest w przygotowaniu	
☐ Nie	

7. MAPA OBSZARU

[Powrót](#)

Nr ID INSPIRE:

PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH020021

Mapa załączona jako plik PDF w formacie elektronicznym (opcjonalnie)

☒ Tak ☐ Nie

Odniesienie lub odniesienia do oryginalnej mapy wykorzystanej przy digitalizacji granic elektronicznych (opcjonalnie)

--