



NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

dla obszarów specjalnej ochrony (OSO),
proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (pOZW),
obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW) oraz
specjalnych obszarów ochrony (SOO)

OBSZAR PLH020039
NAZWA
OBSZARU Grodczyn i Homole koło Dusznik

ZAWARTOŚĆ

- [1. IDENTYFIKACJA OBSZARU](#)
- [2. POŁOŻENIE OBSZARU](#)
- [3. INFORMACJE PRZYRODNICZE](#)
- [4. OPIS OBSZARU](#)
- [6. POWIĄZANIA OBSZARU](#)
- [7. MAPA OBSZARU](#)

1. IDENTYFIKACJA OBSZARU

1.1. Typ B	1.2. Kod obszaru PLH020039	Powrót
---------------	-------------------------------	------------------------

1.3. Nazwa obszaru

Grodczyn i Homole koło Dusznik

1.4. Data opracowania 2004-08	1.5. Data aktualizacji 2025-01
----------------------------------	-----------------------------------

1.6. Instytucja lub osoba przygotowująca wniosek:

Nazwisko/Organizacja:	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Adres:	Polska Al. Jerozolimskie 136 Warszawa 02-305
Adres e-mail:	kancelaria@gdos.gov.pl

Data zaproponowania obszaru jako OZW:	2006-09
Data zatwierdzenia obszaru jako OZW(*):	2009-02
Data objęcia obszaru ochroną SOO:	2022-08
Krajowe odniesienie prawne dla formy ochrony SOO:	rozp. MKiŚ z dn. 13 czerwca 2022 r. w spr. soo Grodczyn i Homole koło Dusznik (PLH020039)

Wyjaśnienia:	Powiększenie - 03.2007 r. Powiększenie pow. - 11.2019 r.
--------------	--

2. POŁOŻENIE OBSZARU

[Powrót](#)

2.1. Położenie centralnego punktu [wartości dziesiętne stopni]:

Długość geograficzna
16.3548

Szerokość geograficzna
50.4042

2.2. Powierzchnia [ha]:

331.21

2.3. Obszar morski [%]

0.0

2.5. Kod i nazwa regionu administracyjnego

Kod poziomu NUTS 2

Nazwa regionu

PL51	Dolnośląskie
------	--------------

2.6. Region biogeograficzny

Kontynentalny (100.0
%)

3. INFORMACJE PRZYRODNICZE

[Powrót](#)

3.1. Typy siedlisk przyrodniczych występujących na terenie obszaru i ocena znaczenia obszaru dla tych siedlisk:

Typy siedlisk wymienione w załączniku I						Ocena obszaru			
Kod	PF	NP	Pokrycie [ha]	Jaskinie [liczba]	Jakość danych	A B C D	A B C		
						Reprezentatywność	Powierzchnia względna	Stan zachowania	Ocena ogólna
6210	X		4.58		G	A	C	B	B
6230			3.09		G	B	C	C	C
6410			0.09		G	D			
6430			0.15		G	A	C	B	B
6510			27.16		G	B	C	A	B
6520			101.5		G	A	C	B	B
7140			0.13		G	B	C	B	C
7230			2.46		G	A	C	B	B
8210			0.05		G	D			
9110			5.65		G	A	C	B	B
9130			4.33		G	B	C	B	B
9180			0.76		G	A	C	B	B
91E0			1.76		G	B	C	B	B

- PF: dla typów siedlisk, do których mogą odnosić się zarówno formy priorytetowe, jak i niepriorytetowe (6210, 7130, 9430) należy wpisać „x” w kolumnie PF celem wskazania formy priorytetowej.
- NP: jeśli dany typ siedliska nie istnieje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).

- Pokrycie: można wpisywać z dokładnością do wartości dziesiętnych.
- Jaskinie: w przypadku siedlisk typu 8310 i 8330 (jaskinie) należy podać liczbę jaskiń, jeśli nie są dostępne szacunkowe dane na temat powierzchni.
- Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. zgrubne dane szacunkowe).

3.2. Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 2009/147/WE i gatunki wymienione w załączniku II do dyrektywy 92/43/EEG oraz ocena znaczenia obszaru dla tych gatunków

Gatunki					Populacja na obszarze					Ocena obszaru			
Grupa	Kod	Nazwa naukowa	S	NP	Typ	Wielkość		Jednostka	Kategoria	Jakość danych	A B C D	A B C	
						Min	Maks		C R V P		Populacja	Stan zachowania	Izolacja Ogólnie
P	4094	Gentianella bohemica			p	10	30	i		G	C	B	B B
I	6179	Phengaris nausithous			p				P	DD	C	A	C C
I	6177	Phengaris teleius			p	100	150	i	P	M	C	B	C C

- Grupa: A = płazy, B = ptaki, F = ryby, I = bezkręgowce, M = ssaki, P = rośliny, R = gady.
- S: jeśli dane o gatunku są szczególnie chronione i nie mogą być udostępnione publicznie, należy wpisać „tak”.
- NP: jeśli dany gatunek nie występuje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Typ: p = osiadłe, r = wydające potomstwo, c = przelotne, w = zimujące (w przypadku roślin i gatunków niemigrujących należy użyć terminu „osiadłe”).
- Jednostka: i = osobniki pojedyncze, p = pary lub inne jednostki według standardowego wykazu jednostek i kodów zgodnego ze sprawozdawczością na podstawie art. 12 i 17 (zob. [portal referencyjny](#)).
- Kategorie liczebności (kategoria): C = powszechne, R = rzadkie, V = bardzo rzadkie, P = obecne - wypełnić, jeżeli brak jest danych (DD), lub jako uzupełnienie informacji o wielkości populacji.
- Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. zgrubne dane szacunkowe); DD = brak danych (kategorię tę należy stosować wyłącznie, jeśli nie da się dokonać nawet zgrubnej oceny wielkości populacji - w takiej sytuacji można pozostawić puste pole dotyczące wielkości populacji, jednak pole „Kategorie liczebności” musi być wypełnione).

4. OPIS OBSZARU

4.1. Ogólna charakterystyka obszaru

[Powrót](#)

Klasa siedliska przyrodniczego	Pokrycie [%]
N10	27.54
N19	20.89
N17	9.73
N12	41.84
Ogółem pokrycia siedliska przyrodniczego	100

Dodatkowa charakterystyka obszaru:

Obszar obejmuje południowo-wschodnią część Lewińskich Wzgórz, w pobliżu przełęczy Polskie Wrota. Teren

jest pokryty głównie przez bogate gatunkowo górskie łąki kośne, murawy kserotermiczne oraz ekstensywnie użytkowane pastwiska. Na wzgórzu Homole występują niewielkie, lecz dobrze zachowane płaty klonowo-lipowych lasów zboczowych *Aceri-Tilietum* oraz buczyn.

4.2. Jakość i znaczenie

W obszarze stwierdzono płaty 13 typów siedlisk przyrodniczych z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej (przy czym 11 z nich stanowi przedmioty ochrony obszaru), 1 gatunku rośliny oraz 2 gatunków motyli.

6210 Murawy kserotermiczne (*Festuco-Brometea*) są głównym i priorytetowym przedmiotem ochrony w obszarze. Siedlisko występuje głównie w części zachodniej obszaru, większość powierzchni i najlepiej zachowane płaty zidentyfikowano na terenie osady Zielone, na grzbiecie będącym zachodnią odnogą wzgórza Grzywacz. Ocena ogólna B, w tym:

Reprezentatywność: ocena A - są to kwietne murawy kserotermiczne (podtyp 6210-3 siedliska) należące do związku *Bromion erecti* i cechujące się dominacją traw stokłosa prostej *Bromus erectus*, strzępicy piramidalnej *Koeleria pyramidata* (w przypadku zubożałych płatów także kłosownicy prostej *Brachypodium pinnatum*) oraz udziałem takich gatunków jak: chaber driakiewnik *Centaurea scabiosa*, zerwa kulista *Phyteuma orbiculare*, dziewięciśń bezłodygowy *Carlina acaulis*, posłonek rozesłany *Helianthemum nummularium*, szalwia okrągowa *Salvia verticillata*, len przeczyszczający *Linum catharticum*, goryczuszka orzęsiona *Gentianella ciliata*, koniczyna pagórkowa *Trifolium montanum*, turzyca pagórkowa *Carex montana*, topornica pstra *Coronilla varia*, fałdownik trzyczędowy *Rhytidadelphus triquetrus*, jodłówka pospolita *Abietinella abietina*. Murawy ze związku *Bromion erecti* są rzadkim typem w Polsce, występującym głównie na ziemi kłodzkiej (wyłącznie w Sudetach), wykształconym tutaj na krańcach zasięgowych i z tego powodu ze zubożałym składem gatunkowym w stosunku do centrum zasięgowego związku w południowej i zachodniej Europie. Mimo tego większość płatów siedliska w obszarze jest priorytetowa, występują liczne gatunki storczykowatych, a ponadto murawy w obszarze są siedliskiem kilkunastu gatunków roślin zagrożonych w Polsce (w tym umieszczonych w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin) i na Dolnym Śląsku oraz gatunków chronionych, np. lilia bulwkowata *Lilium bulbiferum*, goryczuszka czeska *Gentianella bohemica*, pępawa różyczkolistna *Crepis praemorsa*, zaraza wielka *Orobancha elatior*, podkolan zielonawy *Platanthera chlorantha*, gółka długoostrogowa gęstokwiatowa *Gymnadenia conopsea* subsp. *densiflora*, orlik pospolity *Aquilegia vulgaris*.

Powierzchnia względna: ocena C (poniżej 2% powierzchni krajowej).

Stan zachowania: ocena B – na ocenę stanu zachowania siedliska wpływa ekspansja krzewów i podrostu drzew oraz stwierdzenie rodzimych gatunków ekspansywnych roślin zielnych na części stanowisk siedliska w obszarze.

6230 Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (*Nardion* - płaty bogate florystycznie)

Ocena ogólna C, w tym:

Reprezentatywność: ocena B – największy płat stwierdzono na terenie osady Ludowe. Siedlisko w obszarze to suche podgórskie murawy bliźniczkowe (podtyp 6230-4), reprezentujące związek *Violion caninae* (klasa *Nardo-Callunetea*), wykształcone na ubogim siedlisku i suchych glebach brunatnych, miejscami silnie kamienistym płytkim podłożu. W płatach dominuje bliźniczka psia trawka *Nardus stricta* i śmiełek pogięty *Deschampsia flexuosa*, występują też dziewięciśń bezłodygowy *Carlina acaulis*, goździk kropkowany *Dianthus deltoides*, wrzos zwyczajny *Calluna vulgaris*, izgrzyca przyziemna *Danthonia decumbens*, jastrzębce *Hieracium* spp. i borówki *Vaccinium myrtillus*, *V. vitis-idaea*.

Powierzchnia względna: ocena C (poniżej 2% krajowych zasobów siedliska).

Stan zachowania: ocena C – na ocenę wpływ mają oceny wskaźników: „gatunki charakterystyczne”, „ekspansja krzewów i podrostu drzew” oraz „gatunki ekspansywne i inwazyjne”, co świadczy o zaburzonej strukturze siedliska, perspektywy zachowania siedliska także otrzymały ocenę U1.

6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (*Molinion*)

Siedlisko nie stanowi przedmiotu ochrony w obszarze (reprezentatywność: ocena D). W obszarze stwierdzono zaledwie jeden niewielki płat siedliska 6410 występuje na północnym zboczu wzgórza Grzywacz na południowy- zachód od wsi Słoszów, w kompleksie torfowisk niskich. Jest to zbiorowisko łąki zmiennowilgotnej należące do zespołu *Selino carvifoliae*-*Molinietum* (związek *Molinion*).

6430 Ziołorośla górskie (*Adenostylion alliariae*) i ziołorośla nadrzeczne (*Convolvuletalia sepium*) – siedlisko występuje głównie na obrzeżach obszaru na siedliskach wilgotnych, w dolinkach potoków, w postaci

niewielkich powierzchniowo płatów.

Ocena ogólna B, w tym:

Reprezentatywność: ocena A - siedlisko reprezentowane jest przez trzy różne podtypy: ziołorośla reglowe z parzydłem leśnym *Aruncus sylvestris*, ciemną zieloną *Veratrum lobelianum* i różą alpejską *Rosa pendulina* (*Arunco-Doronicetum austriaci* (podtyp 6430-1), ziołorośla lepiężnikowe z lepiężnikiem różowym *Petasitetum hybridi* (podtyp 6430-2) oraz przez wilgotne ziołorośla wiązkowe (zbiorowisko z *Filipendula ulmaria*, *Geranio palustris*-*Filipenduletum ulmariae*).

Powierzchnia względna: ocena C (poniżej 2% krajowych zasobów siedliska).

Stan zachowania: ocena B – większość płatów siedliska zachowana jest we właściwym stanie; natomiast w przypadku niektórych płatów niewłaściwy stan zachowania jest wynikiem większego udziału ekspansywnych gatunków nitrofilnych ziół (pokrzywa zwyczajna *Urtica dioica*, świerzabek korzenny *Chaerophyllum aromaticum*).

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (*Arrhenatherion elatioris*)

Ocena ogólna: B, w tym:

Reprezentatywność: ocena B - siedlisko w obszarze położone jest w północno-wschodniej części obszaru, gdzie zbocza wzgórza Kukułka ulegają wypłaszczeniu. Ruń siedliska jest trawiasto-zielna, dominują w niej kostrzewa czerwona *Festuca rubra*, dziurawiec czteroboczny *Hypericum maculatum*, przywrotnik pasterski *Alchemilla monticola* oraz mietlica pospolita *Agrostis capillaris*. W runi licznie występują gatunki charakterystyczne dla niżowych łąk świeżych, takie jak: rajgras wyniosły *Arrhenatherum elatius*, dzwonek rozpięchły *Campanula patula*, pępawa dwuletnia *Crepis biennis*, świerzbnica polna *Knautia arvensis*, kozibród łąkowy *Tragopogon pratensis*, przytulia właściwa *Galium mollugo* i bodziszek łąkowy *Geranium pratense*.

Powierzchnia względna: ocena C (poniżej 2% krajowych zasobów siedliska).

Stan zachowania: A (doskonale), w tym: stopień zachowania struktury: I (doskonale zachowana). Siedlisko w obszarze posiada liczną reprezentację gatunków charakterystycznych, stosunki ilościowe w runi są prawidłowe. Brak jest istotnych zagrożeń mogących wpłynąć na pogorszenie stanu siedliska.

6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (*Polygono-Trisetion*)

Ocena ogólna B, w tym:

Reprezentatywność: ocena A - ruń siedliska w obszarze zazwyczaj jest trawiasto-zielna, najczęściej dominuje w niej kostrzewa czerwona *Festuca rubra* przy współdominacji różnorodnych ziół (m.in. dziurawiec czteroboczny *Hypericum maculatum*, brodawnik zwyczajny *Leontodon hispidus*, koniczyna łąkowa *Trifolium pratense*). W runi siedliska występuje szereg gatunków charakterystycznych dla górskich łąk świeżych – szalęznik włochoły *Rhinanthus alectorolophus*, chaber perukowy *Centaurea phrygia*, lilia bulwkowata *Lilium bulbiferum*, zerwa kulista *Phyteuma orbiculare*, zerwa kłosowa *P. spicatum*, mietlica pospolita *Agrostis capillaris*, rdest wężownik *Polygonum bistorta*, konietlica łąkowa *Trisetum flavescens*, bodziszek leśny *Geranium sylvaticum*, kostrzewa czerwona *Festuca rubra*, pępawa czarcikęsolistna *Crepis succisifolia*, szalęznik większy *Rhinanthus serotinus*, przywrotnik pasterski *Alchemilla monticola*, rzeżusznik *Halleria Cardaminopsis halleri*, chaber ostrołuskowy *Centaurea oxylepis*, pępawa miękka *Crepis mollis*. Obszar ma istotne znaczenie dla zachowania siedliska w regionie Sudetów Środkowych. W obszarze występują płaty bardzo bogate gatunkowo (nawet do 50 gatunków na 25 mkw), z liczną reprezentacją gatunków charakterystycznych. Dodatkowo w runi siedliska występuje szereg gatunków roślin chronionych i rzadkich, takich jak: lilia złotogłów *Lilium bulbiferum*, zerwa kulista *Phyteuma orbiculare*, pełnik europejski *Trollius europaeus*, podkolan białawy *Platanthera bifolia*, listera jajowata *Listera ovata*, czy dziewięciśń bezłodygowy *Carlina acaulis*.

Powierzchnia względna: ocena C (poniżej 2% krajowych zasobów siedliska).

Stan zachowania: ocena B - siedlisko w obszarze znajduje się w zróżnicowanym stanie zachowania.

Większość płatów jest w niezadowalającym stanie zachowania (U1), pojedyncze – ze względu na brak użytkowania - są w złym stanie zachowania (U2). Większość płatów jest użytkowana kośnie, jednakże niektóre z nich są mulczowane, co powoduje zniekształcenie struktury ilościowej siedliska. Podobnie jest w przypadku łąk użytkowanych pastwiskowo, gdzie stwierdzono, że płaty siedliska mają charakter pośredni pomiędzy łąką a pastwiskiem. Przy wdrożeniu właściwych działań ochronnych możliwa jest poprawa stanu siedliska i perspektyw jego zachowania.

7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z *Scheuchzeria-Caricetea*) – siedlisko w obszarze występuje w postaci niewielkich płatów w centralnej i południowej części obszaru.

Ocena ogólna: C, w tym:

Reprezentatywność: ocena B - trzęsawiska ze zbiorowiskami ze związku *Caricion nigrae* zasilane są głównie wodami wysiękowymi. W warstwie mchów licznie występują torfowce i mchy brunatne (*Sphagnum fallax*, *Climacium dendroides*, *Calliergonella cuspidata*, *Aulacomnium palustre*), w warstwie zielnej – turzyce: *Carex canescens*, *Carex panicea*, *Carex flava*, *Carex nigra*, *Carex rostrata*, sity: *Juncus filiformis*, *J. conglomeratus*, welnianka wąskolistna *Eriophorum angustifolium*, kozłek dwupienny *Valeriana dioica* i fiołek błotny *Viola palustris*.

Powierzchnia względna: ocena C (poniżej 2% krajowych zasobów siedliska).

Stan zachowania: ocena B – płyty zachowane w stanie niezadowolającym, z uwagi na obecność rodzimych gatunków ekspansywnych roślin zielnych oraz fragmentaryczne wykształcenie siedliska.

7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk - siedlisko w obszarze związane jest z wysiękami wód gruntowych zasobnych w węglan wapnia - największa koncentracja wystąpień ma miejsce w obszarze źródłiskowym potoku Bramecka Woda na północnych zboczach wzgórza Grzywacz (na SW od wsi Słoszów). Poza tym dwa płyty stwierdzono w dolince potoku Jastrzębnik na Przełęczy Polskie Wrota i jeden w obszarze źródłiskowym potoku Trzmiele.

Ocena ogólna: B, w tym:

Reprezentatywność: ocena A - siedlisko bardzo rzadkie w Sudetach. Są to zbiorowiska o charakterze młak źródłiskowych ze związku *Caricion davallianae* (*Valeriano dioicae*-*Caricetum davallianae*) i *Calthion palustris* (*Cirsietum rivularis caricetosum davallianae*). W poszczególnych płatach dominują zwykle mchy brunatne (*Cratoneuron filicinum*, *Tomentypnum nitens*, *Palustriella commutata*, *Limprichtia cossonii*, *Climacium dendroides*, *Calliergonella cuspidata*, *Bryum pseudotriquetrum*, *Campylium stellatum*), warstwa roślinności naczyniowej jest w dobrze zachowanych płatach słabiej rozwinięta i występują tam: turzyca *Davalla* *Carex davalliana*, turzyca żółta *Carex flava*, turzyca prosowata *Carex panicea*, welnianka szerokolistna *Eriophorum latifolium*, kozłek dwupienny *Valeriana dioica*, kruszczyk błotny *Epipactis palustris*, dziewięciornik błotny *Parnassia palustris*, świbka błotna *Triglochin palustre*, pełnik europejski *Trollius europaeus*, mieczyk dachówkowaty *Gladiolus imbricatus* oraz skrzyp olbrzymi *Equisetum telmateia*.

Powierzchnia względna: ocena C (poniżej 2% krajowych zasobów siedliska).

Stan zachowania: ocena B – ocena stanu zachowania siedliska związana jest z ekspansją ziołorośli, krzewów i podrostu drzew.

8210 Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami *Potentilletalia caulescentis*

Siedlisko nie stanowi przedmiotu ochrony w obszarze (reprezentatywność – ocena D). W obszarze stwierdzono zaledwie 3 niewielkie płyty siedliska na łącznej powierzchni 0,05 ha. Siedlisko związane jest z odsłonięciami skał węglanowych, głównie antropogenicznymi – są to zacienione ściany starych łomów wapienia lub ruiny wapiennika (na terenie dawnej osady Raczyn). Zbiorowiska z rzędu *Potentilletalia caulescentis* budowane są przez zanokcicę skalną *Asplenium trichomanes*, zanokcicę murową *Asplenium ruta-muraria* (*Asplenium trichomano ruta-murariae*), paprotnicę kruchą *Cystopteris fragilis*, paprotnika kolczystego *Polystichum aculeatum* (*Cystopteridum fragilis*), bodziszką cuchnącego *Geranium robertianum* i charakteryzują się znacznym pokryciem mszaków, np. *Tortella tortuosa*, *Encalypta streptocarpa*, *Mnium stellare*, *Rhytidiadelphus triquetrus*.

9110 Kwaśne buczyny (*Luzulo-Fagetum*)

Ocena ogólna: B, w tym:

Reprezentatywność: ocena A - siedlisko występuje głównie w kompleksie leśnym w południowej części obszaru, na podłożu niezasobnym w węglan wapnia i zakwaszonym. Drzewostan buduje prawie wyłącznie buk, w płatach zdegenerowanych w większej ilości występuje świerk, w runie dominują gatunki acydofilne.

Powierzchnia względna: ocena C (poniżej 2% krajowych zasobów siedliska).

Stan zachowania: ocena B - ogólny stan zachowania w obszarze jest niezadowolający, jednak duży powierzchniowo płat kwaśnej buczyny na południowych zboczach wzgórza Gomół jest zachowany w stopniu właściwym. Głównym zagrożeniem dla struktury i funkcji siedliska są zabiegi gospodarki leśnej niezgodne ze specyfiką siedliska: protegowanie świerka oraz odnawianie dużymi powierzchniami zrębowymi, które ułatwia wnikanie gatunków obcych i niepożądanych w runo buczyn (niecierpek drobnokwiatowy *Impatiens parviflora*, jeżyny *Rubus* spp., trzcinnik leśny *Calamagrostis arundinacea*).

9130 Żyzne buczyny (*Dentario glandulosae* Fagenion, *Galio odorati*-Fagenion)

Ocena ogólna: B, w tym:

Reprezentatywność: ocena B – płyty siedliska występują w większym rozproszeniu niż buczyny acidofilne i zajmują mniejsze powierzchnie. Związane jest z żyznym i zwykle wilgotnym podłożem zasobnym w węglan wapnia. Zostało zidentyfikowane na zboczach o ekspozycji południowej. Drzewostan buduje głównie buk ze znaczącą domieszką jaworu i – w wilgotnych płatach - jesionu.

Powierzchnia względna: ocena C (poniżej 2% krajowych zasobów siedliska).

Stan zachowania: ocena B - ogólny stan zachowania w obszarze jest niezadowolający. Głównym zagrożeniem dla struktury i funkcji siedliska są zabiegi gospodarki leśnej niezgodne ze specyfiką siedliska: protegowanie świerka, odnowienie dużymi powierzchniami zrębowymi ułatwia wnikanie gatunków obcych i niepożądanych w runo buczyn tj. niecierpek drobnokwiatowy *Impatiens parviflora*, jeżyny *Rubus* spp., trzcinnik leśny *Calamagrostis arundinacea*.

9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (*Tilio platyphyllis*-*Acerion pseudoplatani*)

Ocena ogólna: B, w tym:

Reprezentatywność: ocena A – w obszarze występuje tylko jeden płat siedliska na stromym północnym i północno-zachodnim zboczu wzgórza Gomoła. Wykształcona tam na podłożu zasobnym w węglan wapnia jaworzyna miesięcznicowa *Lunario-Aceretum pseudoplatani* (podtyp 9180-4) charakteryzuje się wielogatunkowym drzewostanem liściastym (jawor, wiąz górski, buk, jesion) i ziołoroślowym runem, w którym dominuje miesięcznica trwała *Lunaria rediviva*. Poza tym stwierdzono takie gatunki jak: podagrycznik pospolity *Aegopodium podagraria*, lilia złotogłów *Lilium martagon*, szczyr trwały *Mercurialis perennis*, czerniec gronkowy *Actaea spicata*, zerwa kłosowa *Phyteuma spicatum*, kopytnik pospolity *Asarum europaeum*, niecierpek pospolity *Impatiens noli-tangere* i pokrzywa zwyczajna *Urtica dioica*.

Powierzchnia względna: ocena C (poniżej 2% krajowych zasobów siedliska).

Stan zachowania: ocena B - stan zachowania jest właściwy, jednak biegnąca przez płat ścieżka piesza i szlak turystyczny na szczyt wzgórza do ruin Zamku Homole powoduje stałą penetrację płatu przez turystów i związane z tym oddziaływania antropogeniczne (ze względu na stromość zbocza zbaczanie ze ścieżki jest trudne), które stanowią główne zagrożenie dla stanu zachowania siedliska.

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (*Salicetum albae*, *Populetum albae*, *Alnenion glutinoso-incanae*) i olsy źródliskowe

Ocena ogólna: B, w tym:

Reprezentatywność ocena B - w obszarze siedlisko występuje w dolinach potoków w południowej części obszaru w postaci pasów podgórskiego łągu jesionowego *Carici remotae*-*Fraxinetum* (podtyp 91E0-5). Drzewostan budują głównie klon jawor i jesion wyniosły, a w płatach silnie zdegenerowanych również olcha czarna. W runie w dwóch płatach (nad potokami Trzmiele i Jastrzębnik) stwierdzono gatunek charakterystyczny zespołu turzycę zwisłą *Carex pendula*.

Powierzchnia względna < 2% powierzchni krajowej - ocena C,

Stan zachowania ocena B - Stan zachowania w obszarze jest niezadowolający, a w jednym płacie zły (wtórny drzewostan z dominacją olszy czarnej). Ten sam płat wyróżnia także przejściowy charakter między łągami podgórskimi i niżowymi – udział czeremchy *Padum avium* w podszybie. Głównym zagrożeniem dla struktury i funkcji siedliska jest niezgodne ze specyfiką siedliska prowadzenie zabiegów gospodarki leśnej (protegowanie olchy czarnej nad jesionem i jaworem, prowadzenie dróg leśnych w poprzek dolin potoków).

4094 Goryczuszka czeska *Gentianella bohemica*

W Polsce obecnie znane są 4 stanowiska gatunku, z czego w obszarze Natura 2000 Grodczyn i Homole koło Dusznik obecne jest 1 stanowisko. Gatunek występuje na grzbiecie wzgórza Grzywacz na terenie osady Zielone. Areal populacji wynosi 0,66 ha, siedliskiem są murawy kserotermiczne ze związku *Bromion erecti* z licznymi wystąpieniami storczykowatych (priorytetowe siedlisko przyrodnicze 6210). Gatunek w obszarze odkryto w 2009 roku, wcześniej podawany był tu pod innymi nazwami (*Gentianella germanica*, *G. amarella*, *G. lutescens*) i błędnie identyfikowany. Jest to roślina dwuletnia, dla której - jak wskazują wyniki badań - charakterystyczne są duże wahania liczebności w poszczególnych sezonach wegetacyjnych, co z kolei powoduje niekorzystne efekty dla różnorodności genetycznej (np. efekty bottleneck).

Ocena ogólna: B, w tym:

Populacja ocena: C - szacunkowa wielkość populacji stanowi poniżej 2% populacji krajowej.

Stan zachowania: ocena B – stan siedliska gatunku oceniany jest poprawnie, jednak na obniżenie oceny wpływ ma obecność gatunków ekspansywnych traw, zauważalny jest też wzrost wysokości runa z powodu użytkowania kośnego niewielkiego fragmentu muraw na stanowisku. Ponadto stwierdzono negatywny wpływ

wynikający z użytkowania turystycznego (wydeptywanie, zaśmiecanie).
 Izolacja: ocena B – stanowisko populacji na peryferiach zasięgu gatunku.

6177 modraszek telejus Phengaris teleuis

Ocena ogólna: C, w tym:

Populacja: ocena C - szacunkowa wielkość populacji to poniżej 2% populacji krajowej.

Stan zachowania: ocena B, w tym: stopień zachowania siedliska: II elementy dobrze zachowane; siedlisko gatunku w obszarze oceniono poprawnie, ale zidentyfikowano również niską dostępność rośliny żywicielskiej, co związane jest z niewłaściwą gospodarką na stanowiskach gatunku.

Izolacja: populacja nieizolowana - ocena C.

6179 modraszek nausitous Phengaris nausithous

Ocena ogólna C, w tym:

Populacja ocena C - wielkość populacji to poniżej 2% populacji krajowej.

Stan zachowania: ocena B, w tym: stopień zachowania siedliska: II elementy dobrze zachowane; siedlisko gatunku w obszarze oceniono poprawnie, ale zidentyfikowano również niską dostępność rośliny żywicielskiej, co związane jest z niewłaściwą gospodarką na stanowiskach gatunku.

Izolacja: populacja nieizolowana - ocena C.

4.3. Zagrożenia, presje i działania mające wpływ na obszar

Najważniejsze oddziaływania i działalność mające duży wpływ na obszar

Oddziaływania negatywne			
Poziom	Zagrożenia i presje [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnętrzne [i o b]
H	K02		i
M	A04		i
H	A03		i
M	G01.02		i
M	K04.01		i
M	K05.02		i
M	I02		i
M	I01		i
M	J03.01		i
Oddziaływania pozytywne			
Poziom	Działania, zarządzanie [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnętrzne [i o b]

Poziom: H = wysoki, M = średni, L = niski.

Zanieczyszczenie: N = stosowanie azotu, P = stosowanie fosforu/fosforanów, A = stosowanie kwasów/zakwaszanie, T = toksyczne chemikalia nieorganiczne,

O = toksyczne chemikalia organiczne, X = zanieczyszczenia mieszane.

i = wewnętrzne, o = zewnętrzne, b = jednocześnie.

4.4. Własność (opcjonalnie)

Typ		[%]
Publiczna	Krajowa/federalna	0
	Kraj	0
	związkowy/województwo	

	Lokalna/gminna	0
	Inna publiczna	0
Własność łączna lub współwłasność		0
Prywatna		0
Nieznana		100
Suma		100

4.5. Dokumentacja (opcjonalnie)

2023. Smoczyk M. Raport dla gatunku na stanowisku 4094 Goryczuszka czeska - Zielone – 2023.2022. Pech P. Ekspertyza fitosocjologiczna dla obszaru Natura 2000: PLH020039 Grodczyn i Homole na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0191/16, pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”.2021. Smoczyk M. Raport dla siedliska na stanowisku 6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) - Zielone 1 – 2021.2021. Smoczyk M. Raport dla siedliska na stanowisku 6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) - Zielone 3 - Raczyn – 2021.2021. Smoczyk M. Raport dla siedliska na stanowisku 6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) - Wapienniki – 2021.2020. Myśków E. Ekspertyza entomologiczna dla obszaru Natura 2000: Grodczyn i Homole koło Dusznik PLH020039 na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0191/16, pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”.2017. Smoczyk M. Raport dla siedliska na stanowisku 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk - Żmijowa Łąka – 2017.2017. Smoczyk M. Raport dla siedliska na stanowisku 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk - Słoszów – 2017.2017. Smoczyk M. Raport dla siedliska na stanowisku 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk - Przełęcz Polskie Wrota – 2017.2014. Smoczyk M. Raport dla siedliska na stanowisku 6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) - Zielone 2 – 2014.2012. Plan zadań ochronnych obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Grodczyn i Homole koło Dusznik PLH020039 w województwie dolnośląskim na lata 2012-2021.2009. Smoczyk M. Raport dla siedliska na stanowisku 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk - Żmijowa Łąka – 2009.

6. ZARZĄDZANIE OBSZAREM

6.1. Organ lub organy odpowiedzialne za zarządzanie obszarem:

[Powrót](#)

Organizacja:	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Adres:	Polska ul. Jana Długosza 68 51-162 Wrocław
Adres e-mail:	sekretariat@wroclaw.rdos.gov.pl

6.2. Plan(-y) zarządzania:

Aktualny plan zarządzania istnieje:

☒ Tak	Nazwa: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 30 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Grodczyn i Homole koło Dusznik PLH020039 Link: https://edzienniki.duw.pl/legalact/2014/4503/ Nazwa: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Grodczyn i Homole koło Dusznik PLH020039 Link: https://edzienniki.duw.pl/legalact/2014/1688/ Nazwa: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań
---	---

ochronnych dla obszaru Natura 2000 Grodczyn i Homole koło Dusznik PLH020039

Link: <https://edzienniki.duw.pl/legalact/2018/1048/>

☐ Nie, ale jest w przygotowaniu

☐ Nie

7. MAPA OBSZARU

[Powrót](#)

Nr ID INSPIRE:

PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH020039

Mapa załączona jako plik PDF w formacie elektronicznym (opcjonalnie)

☒ Tak ☐ Nie

Odniesienie lub odniesienia do oryginalnej mapy wykorzystanej przy digitalizacji granic elektronicznych (opcjonalnie)