



NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

dla obszarów specjalnej ochrony (OSO),
proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (pOZW),
obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW) oraz
specjalnych obszarów ochrony (SOO)

OBSZAR PLH020069
NAZWA
OBSZARU Las Pilczycki

ZAWARTOŚĆ

- [1. IDENTYFIKACJA OBSZARU](#)
- [2. POŁOŻENIE OBSZARU](#)
- [3. INFORMACJE PRZYRODNICZE](#)
- [4. OPIS OBSZARU](#)
- [6. POWIĄZANIA OBSZARU](#)
- [7. MAPA OBSZARU](#)

1. IDENTYFIKACJA OBSZARU

1.1. Typ B	1.2. Kod obszaru PLH020069	Powrót
---------------	-------------------------------	------------------------

1.3. Nazwa obszaru

Las Pilczycki

1.4. Data opracowania 2006-01	1.5. Data aktualizacji 2024-05
----------------------------------	-----------------------------------

1.6. Instytucja lub osoba przygotowująca wniosek:

Nazwisko/Organizacja:	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Adres:	Polska Al. Jerozolimskie 136 Warszawa 02-305
Adres e-mail:	kancelaria@gdos.gov.pl

Data zaproponowania obszaru jako OZW:	2007-03
Data zatwierdzenia obszaru jako OZW(*):	2009-02
Data objęcia obszaru ochroną SOO:	2022-07
Krajowe odniesienie prawne dla formy ochrony SOO:	rozp. MKiŚ z dn. 13 czerwca 2022 r. w spr. soo Las Pilczycki (PLH020069)

Wyjaśnienia:	Powiększenie pow. - 11.2019 r.
--------------	--------------------------------

2. POŁOŻENIE OBSZARU

2.1. Położenie centralnego punktu [wartości dziesiętne stopni]:

[Powrót](#)

Długość geograficzna
16.9605

Szerokość geograficzna
51.1523

2.2. Powierzchnia [ha]:

120.73

2.3. Obszar morski [%]

0.0

2.5. Kod i nazwa regionu administracyjnego

Kod poziomu NUTS 2

Nazwa regionu

PL51	Dolnośląskie
------	--------------

2.6. Region biogeograficzny

Kontynentalny (100.0
%)

3. INFORMACJE PRZYRODNICZE

3.1. Typy siedlisk przyrodniczych występujących na terenie obszaru i ocena znaczenia obszaru dla tych siedlisk:

[Powrót](#)

Typy siedlisk wymienione w załączniku I						Ocena obszaru			
Kod	PF	NP	Pokrycie [ha]	Jaskinie [liczba]	Jakość danych	A B C D	A B C		
						Reprezentatywność	Powierzchnia względna	Stan zachowania	Ocena ogólna
6430			0.12		P	C	C	C	C
6440			0.75		G	C	C	C	C
9170			21.72		G	A	C	B	B
91E0			2.44		G	C	C	C	C
91F0			55.0		M	A	C	B	B

- PF: dla typów siedlisk, do których mogą odnosić się zarówno formy priorytetowe, jak i niepriorytetowe (6210, 7130, 9430) należy wpisać „x” w kolumnie PF celem wskazania formy priorytetowej.
- NP: jeśli dany typ siedliska nie istnieje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Pokrycie: można wpisywać z dokładnością do wartości dziesiętnych.
- Jaskinie: w przypadku siedlisk typu 8310 i 8330 (jaskinie) należy podać liczbę jaskiń, jeśli nie są dostępne szacunkowe dane na temat powierzchni.
- Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. zgrubne dane szacunkowe).

3.2. Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 2009/147/WE i gatunki wymienione w załączniku II do dyrektywy 92/43/EEG oraz ocena znaczenia obszaru dla tych gatunków

--	--	--

Gatunki					Populacja na obszarze					Ocena obszaru			
Grupa	Kod	Nazwa naukowa	S	NP	Typ	Wielkość		Jednostka	Kategoria	Jakość danych	A B C D	A B C	
						Min	Maks		C R V P		Populacja	Stan zachowania	Ogólnie
M	1308	Barbastella barbastellus			r				P	DD	C	B	C
I	1088	Cerambyx cerdo			p	200	300	i		G	C	A	C
I	1074	Eriogaster catax			p				V	DD	D		
I	6169	Euphydryas maturna			p				P	DD	C	B	C
I	1060	Lycaena dispar			p					DD	C	B	C
M	1318	Myotis dasycneme			r				P	DD	C	A	C
I	1084	Osmoderma eremita			p	150	200	i		G	C	A	C
I	6177	Phengaris teleius			p				P	DD	C	C	C

- Grupa: A = płazy, B = ptaki, F = ryby, I = bezkręgowce, M = ssaki, P = rośliny, R = gady.
- S: jeśli dane o gatunku są szczególnie chronione i nie mogą być udostępnione publicznie, należy wpisać „tak”.
- NP: jeśli dany gatunek nie występuje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Typ: p = osiadłe, r = wydające potomstwo, c = przelotne, w = zimujące (w przypadku roślin i gatunków niemigrujących należy użyć terminu „osiadłe”).
- Jednostka: i = osobniki pojedyncze, p = pary lub inne jednostki według standardowego wykazu jednostek i kodów zgodnego ze sprawozdawczością na podstawie art. 12 i 17 (zob. [portal referencyjny](#)).
- Kategorie liczebności (kategoria): C = powszechne, R = rzadkie, V = bardzo rzadkie, P = obecne - wypełnić, jeżeli brak jest danych (DD), lub jako uzupełnienie informacji o wielkości populacji.
- Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. zgrubne dane szacunkowe); DD = brak danych (kategorię tę należy stosować wyłącznie, jeśli nie da się dokonać nawet zgrubnej oceny wielkości populacji - w takiej sytuacji można pozostawić puste pole dotyczące wielkości populacji, jednak pole „Kategorie liczebności” musi być wypełnione).

4. OPIS OBSZARU

4.1. Ogólna charakterystyka obszaru

[Powrót](#)

Klasa siedliska przyrodniczego	Pokrycie [%]
N06	5.81
N23	12.98
N10	1.03
N16	80.19
Ogółem pokrycia siedliska przyrodniczego	100

Dodatkowa charakterystyka obszaru:

Obszar położony jest w granicach administracyjnych miasta Wrocławia, u zbiegu Odry i jej lewobrzeżnego

dopływu - Ślęży. Graniczy z terenami zabudowanymi, ogródkami działkowymi i rzeką Odrą. Obszar obejmuje w większości tereny leśne w administracji Lasów Państwowych, a także tereny gminne, prywatne oraz w zarządzie innych jednostek Skarbu Państwa.

Ze względu na położenie w dolinie Odry gleby Obszaru należą głównie do rzędu gleb aluwialnych – mad rzecznych oraz do rzędu gleb zabagnionych – gleb gruntowo-glejowych, wytworzonych na słabo przepuszczalnym podłożu i pozostające pod stałym wpływem wysokiego zwierciadła wód gruntowych. Przez zachodnią część Obszaru przepływa uregulowana, niemająca charakteru cieku naturalnego rzeka Śleza, która uchodzi w km 261,6 do Odry - stanowiącej północną granicę obszaru. W km 260,80 rzeki Odry zlokalizowany jest stopień wodny Rędzin, jeden z elementów drogi wodnej Odry, którego normalny poziom piętrzenia (NPP) wynosi 110,00 m n.p.m. W granicach Obszaru nie występują znaczące powierzchnie wód stojących - znajdują się tu tylko zakola (starorzecza) Odry oraz małe oczka wodne położone w lesie. Poziom wód gruntowych na badanym terenie występuje w piaszczystych osadach holocenu i jest ściśle związany z Odrą. Obszar tworzy mozaikę zbiorowisk leśnych Lasu Pilczyckiego, głównie łęgowych i grądowych oraz zespół nadbrzeżnych łąk, zarośli i zadrzewień wzdłuż dolin rzek. Obszar zachował ciągłość struktury i funkcji z lasami łęgowymi doliny Odry. Las Pilczycki stanowi ostoję rzadkich gatunków owadów uzależnionych od obecności skupisk starych, próchniejących i dziuplastych dębów: kozioroga dębosza *Cerambyx cerdo* i pachnicy dębowej *Osmoderma eremita*. W zbiorowiskach leśnych obecne są gatunki roślin, m.in: bluszcz pospolity *Hedera helix*, kalina koralowa *Viburnum opulus* oraz śnieżyczka przebiśnieg *Galanthus nivalis*, która występuje tu łąkowo. Obszar jest miejscem występowania wielu chronionych gatunków ptaków, w tym co najmniej dwóch gatunków dzięciołów: czarnego *Dryocopus martius* oraz zielonosiwego *Picus canus*. Na terenie lasu zbiegają się dwa korytarze ekologiczne: doliny Odry i doliny Ślęży. Główną działalnością ludzką w granicach Obszaru jest działalność z zakresu gospodarki leśnej, jednakże z uwagi na położenie Lasu Pilczyckiego w granicach miasta oraz rozwój na jego terenie funkcji ochronnych i rekreacyjno-wypoczynkowych, ograniczane jest gospodarcze pozyskiwanie drewna. W związku z ograniczaniem działalności rolniczej w mieście, obecnie również w granicach Obszaru obserwuje się zjawisko porzucania gruntów rolnych. Powierzchnia obszaru jest przecięta estakadą Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A-8.

4.2. Jakość i znaczenie

W obszarze PLH020069 przedmiotami ochrony są siedliska: 6430, 6440, 9170, 91E0 i 91F0, ujęte w Załączniku I Dyrektywy siedliskowej oraz kozioróg dębosz, przeplatka maturna, czerwonończyk nieparek, pachnica dębowa oraz modraszek telejus, ujęte w Załączniku II.

W obszarze występuje także barczatka kataks, bóbr oraz wydra – w populacji nieistotnej dla ochrony w obszarze.

6430 Ziołorośla górskie (*Adenostylion alliariae*) i ziołorośla nadrzeczne (*Convolvuletalia sepium*)

– ocena ogólna C, w tym:

Reprezentatywność: ocena C – siedlisko w Obszarze reprezentowane jest przez specyficzną postać z dominacją chmielu zwyczajnego, która - podobnie jak inne postacie „welonowe” - występuje wyłącznie nad dużymi rzekami nizinnymi. Jest więc to postać istotna dla ochrony całości zmienności siedliska w kraju.

Najbliższe dobrze wykształcone płaty o podobnym charakterze występują w obszarze Natura 2000 Łęgi Odrzańskie (PLC020002). Ta forma siedliska jest też interesująca z biogeograficznego i ekologicznego punktu widzenia, ponieważ jest budowana przez rzadkie w Europie Środkowej pnącza.

Powierzchnia względna - ocena C (poniżej 2% krajowych zasobów siedliska).

Stan zachowania: ocena C – płaty siedliska odznaczają się złym stanem zachowania, głównie z uwagi na występowanie gatunków inwazyjnych i eutroficznych; perspektywy zachowania oceniono źle na 3 stanowiskach i niezadowolająco na 1 stanowisku, przy czym jednocześnie brak jest możliwości do zaproponowania działań ochronnych mogących poprawić stan zachowania siedliska.

6440 Łąki selernicowe (*Cnidion dubii*) – ocena ogólna C, w tym:

Reprezentatywność: ocena C – w siedlisku występują gatunki typowe dla tego typu łąk aluwialnych, m.in: selernica żyłkowana *Cnidium dubium*, czosnek kątowny *Alium angulosum*, fiołek mokradłowy *Viola stagnina*, krwiściąg lekarski *Sanquisorba officinalis*, olszewnik kminkolistny *Selinum carvifolia*, bukwica zwyczajna *Betonica officinalis*. Wyżej wymienionym roślinom towarzyszą gatunki zielne typowe głównie dla łąk świeżych.

Powierzchnia względna – ocena C (poniżej 2% krajowych zasobów siedliska).

Stan zachowania: ocena C – płat siedliska jest silnie zdegradowany i opanowany przez gatunki ekspansywne, głównie trzcinika piaskowego *Calamagrostis epigeios* i nawłóć późną *Solidago gigantea*. W płacie znaczący udział ma także roślinność ruderalna rozwijająca się wzdłuż umocnionych płytami

betonowymi rowu, przechodzącego przez środek płatu siedliska.

9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (*Galio-Carpinetum*, *Tilio-Carpinetum*)

– ocena ogólna: B, w tym:

Reprezentatywność: ocena A – wielowarstwowy drzewostan składa się głównie z grabu zwyczajnego *Carpinus betulus*, dębu szypułkowego *Quercus robur* i lipy drobnolistnej *Tilia cordata*. Lokalnie dobrze wykształcona jest warstwa krzewów. Charakterystyczną cechą jest aspekt wczesnowiosenny związany z łanowym rozwojem barwnie kwitnących roślin zielnych.

Powierzchnia względna: ocena C – siedlisko ma stosunkowo małą powierzchnię w porównaniu do tego typu lasów w dolinie Odry.

Stan zachowania: ocena B – siedlisko zachowane jest w stanie niezadowalającym, miejscami runo jest zubożałe, w szczególności na obrzeżach lasu i w sąsiedztwie ogródków działkowych stwierdzono oddziaływania antropogeniczne (obecność odpadów).

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (*Salicetum albo-fragilis*, *Populetum albae*, *Alnenion glutinoso-incanae*) i olsy źródliskowe

– ocena ogólna C, w tym:

Reprezentatywność: ocena C – siedlisko jest mocno zdegenerowane, na drzewach pasożytuje jemioła, znaczenie dla zachowania siedliska w dolinie Odry jest małe.

Powierzchnia względna: ocena C – poniżej 2% krajowych zasobów siedliska; siedlisko występuje w granicach Obszaru jedynie na lewostronnej terasie Odry, powyżej jazu Rędzin, zajmując niewielką powierzchnię na fragmencie lewego brzegu Odry oraz w otoczeniu dwóch starorzeczy.

Stan zachowania: ocena C – stan zachowania struktury i funkcji siedliska oraz perspektywy jego zachowania oceniono jako niezadowalające; drzewa i krzewy są ścinane przez bobry, a runo miejscowo porasta inwazyjny rdestowiec *Reynouya* spp. Warstwa krzewów jest stosunkowo uboga.

91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (*Ficario-Ulmetum*)

– ocena ogólna B, w tym: Reprezentatywność: ocena A – w Lesie Pilczyckim występuje typowy podtyp łęgu dębowo-wiązowo-jesionowego, związany z występowaniem okazjonalnych wezbrań w dolinie środkowej Odry. Na zachód od autostrady stanowisko łęgu ma doskonale wykształcony II-piętrowy zwarty drzewostan z dominacją dojrzałych jesionów wyniosłych *Faraxinus excelsior*, w towarzystwie starych dębów szypułkowych *Quercus robur*. W niższej warstwie występują wiązy *Ulmus* sp., klon polny *Acer campestre* i zwyczajny *Acer platanoides*, czeremcha zwyczajna *Padus avium*, lipa drobnolistna *Tilia cordata*, grab zwyczajny *Carpinus betulus*. W warstwie bujnej, wielogatunkowej krzewów dobrze widoczne są naturalne odnowienia drzew oraz inne krzewy, m.in. porzeczka czerwona *Ribes spicatum*, kalina koralowa *Viburnum opulus*. Warstwa zielna pokrywa całą powierzchnię siedliska. Wśród bylin szczególnie cenne są rozwijające się wczesną wiosną geofity, w tym łany śnieżyczki przebiśnieg *Galanthus nivalis*. Podobną charakterystykę ma drugie stanowisko zlokalizowane na wschód od autostrady, jednakże występują w nim pojedyncze okazy lub szpalery kasztanowca zwyczajnego *Aesculus hippocastanum*. We wschodniej części Obszaru obecne są płaty dojrzałego łęgu dębowo-wiązowo-jesionowego współwystępujące z płatami grądu środkowoeuropejskiego, tworzące mozaikę. Obszar jest istotny dla zachowania łączności między płatami siedliska po wschodniej i zachodniej części Wrocławia.

Powierzchnia względna: ocena C (poniżej 2% krajowych zasobów siedliska).

Stan zachowania: ocena B – ocenę obniżono z uwagi na występowanie w drzewostanie pojedynczych świerków zwyczajnych *Pinus silvestris* (obcych ekologicznie dla siedliska); wskazać należy jednak, że obserwuje się naturalny proces ich wypierania.

1084 Pachnica dębowa *Osmoderma eremita*

– ocena ogólna B. Obszar jest bardzo istotny dla zachowania licznej (około 150-200 osobników) lokalnej populacji gatunku.

Ocena populacji: C (poniżej 2% populacji krajowej).

Stan zachowania: ocena A – siedliska gatunku tworzą ponad 100-letnie dęby, które rosną w obrębie siedlisk leśnych w granicach Obszaru. Znaczna część starych dębów, na siedlisku charakteryzującym się dużym nasłonecznieniem, umiejscowiona jest na północnym skraju lasu, niedaleko koryta Odry. Ponadto pojedyncze rozproszone drzewa rosną po obu stronach rzeki Ślęzy (na wale i w międzywale), na wysokości ulicy Rędzińskiej oraz w pobliżu estakady Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A-8. Drzewa stanowiące aktualne lub potencjalne stanowiska pachnicy nie są zagrożone wycinką, a na powierzchni występują liczne

drzewa dziuplaste; ryzyko zaniku wszystkich tych obecnych i potencjalnych stanowisk jest niewielkie.
Izolacja: ocena C – populacja nie jest izolowana.

1088 Kozioróg dębosz *Cerambyx cerdo*

– ocena ogólna B. Obszar jest bardzo istotny dla zachowania licznej (około 200-300 osobników) lokalnej populacji gatunku, którego główne centrum występowania w kraju przypada właśnie na dolinę Odry.

Ocena populacji: C (poniżej 2% populacji krajowej).

Stan zachowania: ocena A - siedliska gatunku tworzą stare ponad 100-letnie dęby, które rosną w obrębie siedlisk leśnych w granicach Obszaru. Znaczna część starych dębów, na siedlisku charakteryzującym się dużym nasłonecznieniem, umiejscowiona jest na północnym skraju lasu, niedaleko koryta Odry. Ponadto pojedyncze rozproszone drzewa rosną po obu stronach rzeki Ślęzy (na wale i w międzywale), na wysokości ulicy Rędzińskiej oraz w pobliżu estakady Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A-8. Drzewa stanowiące aktualne lub potencjalne stanowiska pachnicy nie są zagrożone wycinką, a na powierzchni występują liczne drzewa dziuplaste; ryzyko zaniku wszystkich tych obecnych i potencjalnych stanowisk jest niewielkie.

Izolacja: ocena C – populacja nie jest izolowana.

6177 Modraszek telejusa *Phengaris teleius*

– ocena ogólna C, w tym:

Ocena populacji: C – populacja nieliczna, poniżej 2% populacji krajowej. Badania terenowe wykazały występowanie rośliny żywicielskiej motyla - krwiściągę lekarskiego na jednym stanowisku w obrębie siedliska 6440 łąki selernicowe.

Stan zachowania: ocena C – stan siedliska gatunku w Obszarze oceniono jako częściowo zdegradowane, w złym stanie.

Izolacja: ocena C – populacja nie jest izolowana.

6169 Przeplatka maturna *Euphydryas maturna*

– ocena ogólna B, w tym:

Ocena populacji: C – populacja nieliczna, poniżej 2% populacji krajowej.

Stan zachowania: ocena B – siedliska gatunku w Obszarze pokrywają się z płatami siedliska 91F0 - z uwagi na charakter Lasu Pilczyckiego pomimo, iż gatunek ten preferuje obrzeża lub śródleśne łąki, może być spotykany na terenie całego Obszaru (z uwagi na bardzo liczne występowanie jesionu - rośliny żywicielskiej motyla).

Izolacja – ocena C – populacja nie jest izolowana, najbliższe stanowisko przeplatki maturny znajduje się w odległości około 1 km.

1060 Czerwończyk nieparek *Lycaena dispar*

– ocena ogólna C, w tym:

Ocena populacji: ocena C – populacja nieliczna, poniżej 2% populacji krajowej.

Stan zachowania: ocena B – stan siedliska gatunku w Obszarze oceniono jako zdegradowany, jednak łatwy do odtworzenia.

Izolacja: ocena C – populacja nie jest izolowana.

1074 Barczatka kataks *Eriogaster catax*

Gatunek nie stanowi przedmiotu ochrony w obszarze (ocena populacji - D). W trakcie badań terenowych stwierdzono występowanie potencjalnych siedlisk gatunku, w tym rośliny żywicielskiej gatunku (zarośla tarniny) wzdłuż Ślęzy oraz na obrzeżach łąki na terenie działki nr 2/4.

*Mopek zachodni oraz nocek łydkowłosy oczekują na akceptację Komisji Europejskiej co do ich wykreślenia z katalogu przedmiotów ochrony obszaru.

4.3. Zagrożenia, presje i działania mające wpływ na obszar

Najważniejsze oddziaływania i działalność mające duży wpływ na obszar

Oddziaływania negatywne			
	Zagrożenia i presje	Zanieczyszczenie (opcjonalnie)	Wewnętrzne

Poziom	[kod]	[kod]	zewnątrzne [i o b]
H	D01.02		i
H	I01		i
H	K04.03		b
M	M01.02		b
M	K02.01		i
M	A03.03		i
M	G01.02		i
M	G01.08		i
L	B02.02		i
L	B02.03		i
L	B02.04		i
L	K02.03		i
L	I02		i

Oddziaływania pozytywne

Poziom	Działania, zarządzanie [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnątrzne [i o b]
--------	------------------------------------	--	--

Poziom: H = wysoki, M = średni, L = niski.

Zanieczyszczenie: N = stosowanie azotu, P = stosowanie fosforu/fosforanów, A = stosowanie kwasów/zakwaszanie, T = toksyczne chemikalia nieorganiczne,

O = toksyczne chemikalia organiczne, X = zanieczyszczenia mieszane.

i = wewnętrzne, o = zewnętrzne, b = jednocześnie.

4.4. Własność (opcjonalnie)

Typ	[%]
Publiczna	Krajowa/federalna
	Kraj
	związkowy/województwo
	Lokalna/gminna
	Inna publiczna
Własność łączna lub współwłasność	
Prywatna	
Nieznana	
Suma	

4.5. Dokumentacja (opcjonalnie)

2020. Myśków E., Ekspertyza entomologiczna dla obszaru Natura 2000: Las Pilczycki PLH020069.2020. Pech P., Świerkosz K., Ekspertyza fitosocjologiczna dla obszaru Natura 2000: PLH020069 Las Pilczycki.2020. Gottfried T., Gottfried I., Ekspertyza chiropterologiczna w obszarze Natura 2000 Las Pilczycki PLH020069.2013. Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 PLH020069 Las Pilczycki w województwie dolnośląskim, RDOŚ Wrocław, K. Łapińska, R. Klodek, Wrocław.2012. Ogińska M., Maślak R., Sergiel A., Majtyka T. Ekspertyza dotycząca populacji traszki grzebieniastej *Triturus cristatus* i kumaka nizinnego *Bombina orientalis* w obszarze Las Pilczycki PLH020069.2012. Smolis A., Kadej M. Ekspertyza dotycząca stanu zachowania oraz liczebności populacji pachnicy dębowej *Osmoderma eremita* i kozioroga dobosza *Cerambyx cerdo*, granicach obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty – projektowanych Specjalnych Obszarów Ochrony siedlisk Natura 2000 „Las Pilczycki” PLH020069 oraz „Dolina Łachy” PLH020003

6. ZARZĄDZANIE OBSZAREM

[Powrót](#)

6.1. Organ lub organy odpowiedzialne za zarządzanie obszarem:

Organizacja:	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Adres:	Polska ulica Jana Długosza 68 51-162 Wrocław
Adres e-mail:	sekretariat@wroclaw.rdos.gov.pl

6.2. Plan(-y) zarządzania:

Aktualny plan zarządzania istnieje:

☒ Tak	Nazwa: Zarządzenie nr 18 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 11 października 2013 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Las Pilczycki PLH020069 Link: https://edzienniki.duw.pl/legalact/2013/5371/
☐ Nie, ale jest w przygotowaniu	
☐ Nie	

7. MAPA OBSZARU

[Powrót](#)

Nr ID INSPIRE:

PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH020069

Mapa załączona jako plik PDF w formacie elektronicznym (opcjonalnie)

☒ Tak ☐ Nie

Odniesienie lub odniesienia do oryginalnej mapy wykorzystanej przy digitalizacji granic elektronicznych (opcjonalnie)

--