



NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

dla obszarów specjalnej ochrony (OSO),
proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (pOZW),
obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW) oraz
specjalnych obszarów ochrony (SOO)

OBSZAR PLH060051
NAZWA
OBSZARU Dolny Wieprz

ZAWARTOŚĆ

- [1. IDENTYFIKACJA OBSZARU](#)
- [2. POŁOŻENIE OBSZARU](#)
- [3. INFORMACJE PRZYRODNICZE](#)
- [4. OPIS OBSZARU](#)
- [5. STATUS OCHRONY OBSZARU](#)
- [6. POWIĄZANIA OBSZARU](#)
- [7. MAPA OBSZARU](#)

1. IDENTYFIKACJA OBSZARU

1.1. Typ B	1.2. Kod obszaru PLH060051	Powrót
---------------	-------------------------------	------------------------

1.3. Nazwa obszaru

Dolny Wieprz

1.4. Data opracowania 2002-09	1.5. Data aktualizacji 2025-01
----------------------------------	-----------------------------------

1.6. Instytucja lub osoba przygotowująca wniosek:

Nazwisko/Organizacja:	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Adres:	Polska Al. Jerozolimskie 136 Warszawa 02-305
Adres e-mail:	kancelaria@gdos.gov.pl

Data zaproponowania obszaru jako OZW:	2007-08
Data zatwierdzenia obszaru jako OZW(*):	2009-02
Data objęcia obszaru ochroną SOO:	2019-11
Krajowe odniesienie prawne dla formy ochrony SOO:	rozp. MŚ z dn. 20 września 2019 r. w spr. soo Dolny Wieprz (PLH060051)

2. POŁOŻENIE OBSZARU

[Powrót](#)

2.1. Położenie centralnego punktu [wartości dziesiętne stopni]:

Długość geograficzna
22.0815

Szerokość geograficzna
51.5685

2.2. Powierzchnia [ha]:

8182.3

2.3. Obszar morski [%]

0.0

2.5. Kod i nazwa regionu administracyjnego

Kod poziomu NUTS 2

Nazwa regionu

PL31	Lubelskie
------	-----------

2.6. Region biogeograficzny

Kontynentalny (100.0
%)

3. INFORMACJE PRZYRODNICZE

[Powrót](#)

3.1. Typy siedlisk przyrodniczych występujących na terenie obszaru i ocena znaczenia obszaru dla tych siedlisk:

Typy siedlisk wymienione w załączniku I						Ocena obszaru			
Kod	PF	NP	Pokrycie [ha]	Jaskinie [liczba]	Jakość danych	A B C D	A B C		
						Reprezentatywność	Powierzchnia względna	Stan zachowania	Ocena ogólna
3150			202.56		G	A	C	B	B
3270			9.29		G	A	C	A	B
6120			26.59		M	B	C	B	B
6430			10.0		M	C	C	C	C
6510			1565.15		G	A	C	A	A
9170			1.64		M	D			
91E0			119.28		G	A	C	B	B

- PF: dla typów siedlisk, do których mogą odnosić się zarówno formy priorytetowe, jak i niepriorytetowe (6210, 7130, 9430) należy wpisać „x” w kolumnie PF celem wskazania formy priorytetowej.
- NP: jeśli dany typ siedliska nie istnieje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Pokrycie: można wpisywać z dokładnością do wartości dziesiętnych.
- Jaskinie: w przypadku siedlisk typu 8310 i 8330 (jaskinie) należy podać liczbę jaskiń, jeśli nie są dostępne szacunkowe dane na temat powierzchni.
- Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. zgrubne dane szacunkowe).

3.2. Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 2009/147/WE i gatunki wymienione w załączniku II do dyrektywy 92/43/EEG oraz ocena znaczenia obszaru dla tych gatunków

Gatunki					Populacja na obszarze						Ocena obszaru			
Grupa	Kod	Nazwa naukowa	S	NP	Typ	Wielkość		Jednostka	Kategoria	Jakość danych	A B C D	A B C		
						Min	Maks		C R V P		Populacja	Stan zachowania	Izolacja	Ogólnie
F	1130	Aspius aspius			p	500	1000	i	P	M	C	B	C	B
A	1188	Bombina bombina			p	200	300	i	P	M	C	B	C	B
M	1337	Castor fiber			p	215	350	i	P	M	D			
R	1220	Emys orbicularis			p				V	DD	D			
M	1355	Lutra lutra			p	10	20	i	P	M	C	B	C	B
P	1428	Marsilea quadrifolia			p					DD	C	C	A	C
F	1145	Misgurnus fossilis			p	50	100	i	P	M	C	B	C	B
A	1166	Triturus cristatus			p				P	DD	D			

- Grupa: A = płazy, B = ptaki, F = ryby, I = bezkręgowce, M = ssaki, P = rośliny, R = gady.
- S: jeśli dane o gatunku są szczególnie chronione i nie mogą być udostępnione publicznie, należy wpisać „tak”.
- NP: jeśli dany gatunek nie występuje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Typ: p = osiadłe, r = wydające potomstwo, c = przelotne, w = zimujące (w przypadku roślin i gatunków niemigrujących należy użyć terminu „osiadłe”).
- Jednostka: i = osobniki pojedyncze, p = pary lub inne jednostki według standardowego wykazu jednostek i kodów zgodnego ze sprawozdawczością na podstawie art. 12 i 17 (zob. [portal referencyjny](#)).
- Kategorie liczebności (kategoria): C = powszechne, R = rzadkie, V = bardzo rzadkie, P = obecne - wypełnić, jeżeli brak jest danych (DD), lub jako uzupełnienie informacji o wielkości populacji.
- Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. zgrubne dane szacunkowe); DD = brak danych (kategorię tę należy stosować wyłącznie, jeśli nie da się dokonać nawet zgrubnej oceny wielkości populacji - w takiej sytuacji można pozostawić puste pole dotyczące wielkości populacji, jednak pole „Kategorie liczebności” musi być wypełnione).

4. OPIS OBSZARU

4.1. Ogólna charakterystyka obszaru

[Powrót](#)

Klasa siedliska przyrodniczego	Pokrycie [%]
N23	0.29
N19	1.3
N07	2.26
N06	2.89
N17	3.33
N10	67.41
N16	5.72

N12	16.81
Ogółem pokrycia siedliska przyrodniczego	100

Dodatkowa charakterystyka obszaru:

Obszar Natura 2000 Dolny Wieprz PLH060051 położony jest w województwie lubelskim na terenie gmin: Firlej, Jeziorzany, Michów i Kock w powiecie lubartowskim, gmin: Ryki i Ułęż w powiecie ryckim, oraz gmin: Żyrzyn, Baranów i Puławy w powiecie puławskim.

Obszar położony jest w Pradolinie Wieprza i w Dolinie Środkowej Wisły, obejmując około 65-kilometrowy odcinek doliny rzeki Wieprz, w jej dolnym biegu, z licznymi starorzeczami, zastoiskami i kilkoma kompleksami stawów. Dominują tu rozległe łąki, często o dużym uwilgotnieniu, mimo przeprowadzonych dawniej melioracji. Miejscami występują płaty łągów, zarośli wierzbowych oraz bogate florystycznie ciepłolubne murawy napiaskowe. Roślinność w dolinie Wieprza cechuje się dużą różnorodnością i wyjątkowymi walorami krajobrazowymi. Rzeka płynie tu silnie meandrującym korytem o dużej naturalności. Cennym elementem są stare, dziuplaste wierzy porastające brzegi rzeki. W południowo-zachodniej części ostoi, wśród wydmy i lasów, znajduje się zarastający zbiornik wodny Piskory, objęty ochroną jako rezerwat przyrody „Piskory”. Rezerwat powołano dla ochrony siedlisk wodnych, bagiennych i leśnych o dużej różnorodności biologicznej.

Pod względem hydrograficznym obszar położony jest w zlewni Wieprza. Obszar ten przynależy do regionu wodnego Środkowej Wisły w obrębie jednolitej części wód podziemnych – JCWP: PLGW200075.

Rzeka Wieprz przepływa przez centralną część obszaru i ma przebieg zbliżony do równoleżnikowego. Jest ona tylko w niewielkim stopniu uregulowana i ma charakter silnie meandrujący. W dolinie rzeki (o szerokości do 4 km) znajdują się liczne, zawadnione starorzecza i podmokłości. Naturalne zbiorniki wód stojących to przede wszystkim starorzecza.

W podziale klimatycznym Polski obszar położony jest w regionie Mazowiecko-Podlaskim (Stachy red., 1987).

Teren ostoi leży w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Pradolina Wieprza i jest przykładem dobrze zachowanego krajobrazu dużej doliny rzeki nizinnej. Obszar jest także częścią korytarza ekologicznego Dolina Dolnego Wieprza GKPdC-3A między Polesiem i Doliną Wisły, który ma znaczenie dla migracji zwierząt i zachowania spójności siedlisk przyrodniczych w sieci Natura 2000. Dolina Dolnego Wieprza jest również ważnym miejscem gniazdowania ptaków zagrożonych wyginięciem, m.in.: derkacza, dzięcioła białoszyjowego i rycyka, a w skali regionu także: bielika, puchacza, bączka i kropiatki. Teren ten został wyznaczony jako ostoją ptaków IBA o kodzie PL144 wg kryteriów Birdlife International. Każdego roku woda zalewa większą część doliny tworząc warunki dla migrujących przez ten teren ptaków wodno-błotnych. Na terenie ostoi znajduje się również kilka użytków ekologicznych obejmujących mokradła i wydmy.

4.2. Jakość i znaczenie

W obszarze PLH060051 przedmiotem ochrony są siedliska: 3150, 3270, 6120, 6430, 6510 i 91E0, ujęte w Załączniku I Dyrektywy siedliskowej oraz boleń, piskorz, kumak nizinny, wydra, bóbr* i marsylia czterolistna, ujęte w Załączniku II.

W obszarze zinventaryzowano także siedlisko 9170 oraz wydrę, żółwia i traszkę grzebieniastą – wszystkie określono jako nieistotne dla ochrony w obszarze.

3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
W obszarze Natura 2000 „Dolny Wieprz” siedlisko stanowią przede wszystkim starorzecza oraz mniejsze zbiorniki wodne, przez co zaliczono je do podtypu 3150-2 – Eutroficzne starorzecza i naturalne, drobne zbiorniki wodne. Pierwsze z nich - starorzecza mają tu charakterystyczny kształt podkowy, powierzchnię do kilku hektarów i głębokość nieprzekraczającą 3 m. Położone są w pobliżu koryta Wieprza. Pozostałe mają kształt mniej regularny i nie są typowymi starorzeczami a zbiornikami powstałym w wyniku regulacji niegdyś występujących tu mniejszych cieków wodnych. Występują przede wszystkim w rozległym pasie turzycowisk i trzcinowisk rozciągającym się pomiędzy Składowem a Jeziorzanami na tzw. Łąkach Podlódowskich. Stan zachowania starorzeczy na terenie Dolnego Wieprza jest różny i jest uzależniony od stanów wody w Wieprzu. Te przemywane i zasilane corocznie w wodę rzeczna wykazują mniejszą tendencję do wysychania i zarastania. Starorzecza pozbawione kontaktu

z rzeką ulegają stopniowemu wypłycaaniu i zarastaniu przez trzcinę i turzycę.

Powierzchnię większości zbiorników pokrywają grążel żółty *Nuphar lutea*, grzybienie białe *Nymphaea alba* oraz spirodela wielokorzeniowa *Spirodela polyrhiza*. Część z nich porośnięta jest ściśle salwinią pływającą *Salvinia natans* oraz osoką aloesowatą *Stratiotes aloides*. W toni wodnej rozwijają się przede wszystkim rogatek sztywny *Ceratophyllum demersum*, wywłócznik kłosowy *Myriophyllum spicatum* oraz moczarka kanadyjska *Elodea canadensis*.

Ocena ogólna: B, w tym:

Reprezentatywność: A – doskonała; duże zróżnicowanie, typowe gatunki roślin.

Powierzchnia względna: C – powierzchnia zajęta przez siedlisko w obszarze zajmuje poniżej 2% powierzchni, na której występuje ten przedmiot ochrony w Polsce.

Ocena stanu zachowania: B

Stopień zachowania struktury II – dobrze zachowana; stan zachowania uzależniony od stanów wody w Wieprzu.

Stopień zachowania funkcji II – dobre perspektywy; brak znaczących zagrożeń dla siedliska

3270 Zalewane muliste brzegi rzek

Siedlisko przyrodnicze 3270 jest siedliskiem efemerycznym. Warunki do rozwoju znajdują tu w głównej mierze jednoroczne gatunki roślin wilgociolubnych a istnienie ich zależy przede wszystkim od sprzyjającego poziomu wody i naturalności koryta rzecznej. Przy niskich wiosennych stanach wód w najszerszych zacisznych miejscach rzek, gdzie odsłonięciu uległo koryto rzeki zbiorowisko ma szansę regularnego tworzenia się. W okresie powodzi

i wezbrań głównie jesienią dochodzi do ich niszczenia.

Na piaszczystych często wzbogaconych mułem odsypach meandrowych Wieprza spotykamy gatunki charakterystyczne dla *Bidention tripartiti*, *Chenopodion fluvatile*

i *Nanocyperion* takie jak: uczepek trójlistkowy *Bidens tripartita*, komosa czerwona *Chenopodium rubrum*, rdest ostrogorki *Polygonum hydropiper*, sit dwudzielny *Juncus bufonius* czy też cibora brunatna *Cyperus fuscus*.

Powierzchnia pojedynczych płatów siedliska mieści się

w granicach kilku m² do kilku arów.

Ocena ogólna: B, w tym:

Reprezentatywność: A – doskonała; duża ilość gatunków charakterystycznych oraz dominacja gatunków właściwych dla siedliska.

Powierzchnia względna: C – powierzchnia zajęta przez siedlisko w obszarze zajmuje poniżej 2% powierzchni, na której występuje ten przedmiot ochrony w Polsce.

Ocena stanu zachowania: A

Stopień zachowania struktury I – doskonale zachowana; brak fragmentacji siedliska na stanowisku lub mała fragmentacja siedliska wynikająca głównie z działania czynników naturalnych.

6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe *Koelerion glaucae*

W obszarze Natura 2000 „Dolny Wieprz” siedliska te występują w rozproszeniu. Największe skupiska odnotowano w okolicy miejscowości Obląpy. Izolowane płaty spotykane są w pobliżu Baranowa i Jeziorzan. Granice ich często są trudne do uchwycenia gdyż płynnie przechodzą w ekstensywnie użytkowane łąki świeże.

W składzie florystycznym runi łąkowej przeważa kostrzewa piaszkowa *Festuca psammophila*, a towarzyszą jej nader często spotykane w tego typu zbiorowiskach zawciąg pospolity *Armeria maritima*, jasioniec piaszkowy *Jasione montana*, koniczyna polna *Trifolium arvense*, kocanki piaskowe *Helichrysum arenarium* oraz rozchodnik sześciorzędowy *Sedum sexangulare*.

Ocena ogólna: B, w tym:

Reprezentatywność: B – dobra; (ocena wskaźnika gatunki charakterystyczne oraz obce gatunki inwazyjne – niezadowolająca U1);

Powierzchnia względna: C – powierzchnia zajęta przez siedlisko w obszarze zajmuje poniżej 2% powierzchni, na której występuje ten przedmiot ochrony w Polsce.

Ocena stanu zachowania: B:

Stopień zachowania struktury: II – dobrze zachowana; płaty muraw ze związku

Koelerion glaucae tworzą większościową mozaikę ze zbiorowiskami łąkowymi ze związku *Arrhenatherion elatioris*.

Stopień zachowania funkcji: III – średnie perspektywy; fragmenty siedliska przekształcają się w ubogie łąki

świeże.

Możliwość odtworzenia: II – możliwe przy średnim nakładzie środków; użytkowanie pastwiskowe.

6430 Ziołorośla górskie (*Adenostylion alliariae*) i ziołorośla nadrzeczne (*Convolvuletalia sepium*)
Siedlisko zajmuje powierzchnię 10 ha, ale jego występowanie, wielkość i stopień wykształcenia są bardzo zmienne nawet w skali roku. Jest to szczególnie widoczne wzdłuż rowów melioracyjnych, gdzie zbiorowiska te są często wykaszane. Siedlisko w Obszarze jest skrajnie ubogie gatunkowo i przyjmuje postać kadłubową. Spośród gatunków charakterystycznych dla ziołorośli niżowych wymienionych w przewodniku metodycznym odnotowano tu pokrzywę zwyczajną *Urtica dioica* oraz kielisznika zaroślowego *Calystegia sepium*. Ponadto swój udział w składzie gatunkowym zaznaczają pojedynczo gatunki takie jak: sadziec konopiasty *Eupatorium cannabinum*, chmiel zwyczajny *Humulus lupulus*, wiązówka błotna *Filipendula ulmaria*.

Tak znaczne zubożenie ziołorośli nadrzecznych w obszarze wynikać może także z faktu wnikania do zbiorowisk wysoce inwazyjnej kolczurki klapowanej *Echinocystis lobata*.

Ocena ogólna: C, w tym:

Reprezentatywność: C – skrajnie ubogie gatunkowo, przyjmuje postać kadłubową.

Powierzchnia względna: C – powierzchnia zajęta przez siedlisko w obszarze zajmuje poniżej 2% powierzchni, na której występuje ten przedmiot ochrony w Polsce.

Ocena stanu zachowania: C

Stopień zachowania struktury III – średnio zachowane lub częściowo zdegradowane; wnikanie do zbiorowiska wysoce inwazyjnej kolczurki klapowanej.

Stopień zachowania funkcji III – średnie perspektywy; nieciągłe, wąskiej szerokości pasy (1-2 m) wzdłuż Wieprza, Tyśmienicy oraz rowów melioracyjnych, głównie wśród szuwaru trzcinowego.

Możliwość odtworzenia: III – trudne lub niemożliwe; wielkość i stopień wykształcenia są bardzo zmienne.

6510 Niżowe i górskie świeże łąki ekstensywnie użytkowane Arrhenatherion

W obszarze Natura 2000 Dolny Wieprz największe i najlepiej zachowane płyty siedliska 6510 występują w części wschodniej w szerokim pasie od Woli Skromowskiej aż do Zakalewa oraz części zachodniej: od Drażgowa do okolic Obłap. W pozostałej części obszaru płyty siedliska występują w rozproszeniu wśród zbiorowisk ze związku *Filipendulion* oraz *Magnocaricion*. Powierzchnia łąk w obszarze wynosi 1565,15 ha co stanowi 19,13% powierzchni obszaru. Udział i znaczenie łąk w obszarze jest istotny.

Ocena ogólna: A, w tym:

Reprezentatywność: A – doskonała, duża ilość gatunków charakterystycznych oraz dominacja gatunków właściwych dla siedliska.

Powierzchnia względna: C – powierzchnia zajęta przez siedlisko w obszarze zajmuje poniżej 2% powierzchni, na której występuje ten przedmiot ochrony w Polsce.

Ocena stanu zachowania: A:

Stopień zachowania struktury: I - doskonale zachowana; nieznaczna fragmentacja.

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe, olsy źródliskowe *Salicetum albae*, *Populetum albae*, *Alnenion glutinoso-incanae*

W obszarze Dolny Wieprz PLH060051 zinwentaryzowano jeden z podtypów siedliska:

*91E0-1 Łęg wierzbowy *Salicetum albae* wraz z wiklinami nadrzeczными *Salicetum triandro-viminalis*.

Zbiorowiska łęgu wierzbowego wykształcają się na terasach zalewowych. Przylegają zwykle do koryta rzeczno. Rosną na glebach typu mady, o wysokim poziomie wody gruntowej. Cechą charakterystyczną tego zbiorowiska jest znaczny udział wierzby białej *Salix alba* i kruchej *Salix fragilis*. W niektórych płatach notowano występowanie wiązu pospolitego *Ulmus minor*. Runo osiąga wysokie zwarcie. Dominują w nim gatunki azotolubne i wilgociolubne, jak pokrzywa zwyczajna *Urtica dioica*, jaskier rozłogowy *Ranunculus repens*, kielisznik zaroślowy *Calystegia sepium*. Stwierdzono obecność klonu jesionolistnego *Acer negundo*.

Ocena ogólna: B, w tym:

Reprezentatywność: A – doskonała; duża ilość gatunków charakterystycznych oraz dominacja gatunków właściwych dla siedliska.

Powierzchnia względna: C – powierzchnia zajęta przez siedlisko w obszarze zajmuje poniżej 2% powierzchni, na której występuje ten przedmiot ochrony w Polsce.

Ocena stanu zachowania: B

Stopień zachowania struktury: II – dobrze zachowana; wiek drzewostanu - brak możliwości osiągnięcia oceny FV z uwagi na charakter drzewostanów z dominującą wierzbą. W warunkach łęgów wierzbowych wierzby

osiągają maksymalny wiek 70-90 lat.

Stopień zachowania funkcji: II – dobre perspektywy; naturalne odnowienie drzewostanu, ale pojedyncze.

9170 Grąd Środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

Siedlisko zajmuje powierzchnię 1,64 ha. Niewielki płat położony w południowej części rezerwatu przyrody „Piskory” na świeżych i wilgotnych siedliskach, przekształcony i mocno narażony na antropopresję

Reprezentatywność: D – płat przekształcony, niewielka powierzchnia.

1130 Boleń *Aspius as pius*

W trakcie odłowów gatunek występował nielicznie. Notowany był na całej długości rzeki, zwykle pojedynczo.

Występował w strefie lotycznej w nurcie we wszystkich badanych odcinkach rzeki. W wywiadzie środowiskowym wśród wędkarzy uzyskano potwierdzenie występowania bolenia.

W rzece Wieprz, w tym również na jego odcinku w obszarze Natura 2000 Dolny Wieprz, gatunek podtrzymywany w sposób czynny poprzez coroczne zarybienia Polskiego Związku Wędkarskiego. W odniesieniu do parametrów morfometrycznych i warunków siedliskowych rzeki ilościowe zarybienia są właściwe.

Ocena ogólna: B, w tym:

Ocena populacji: C – populacja na monitorowanych stanowiskach oceniona na poziomie 0,0005 os./m2, co stanowi poniżej 2% populacji krajowej.

Ocena stanu zachowania: B

Stopień zachowania siedliska: II – elementy zachowane w dobrym stanie; wszystkie elementy siedliska istotne z punktu widzenia biologii gatunku dobrze zachowane.

Ocena izolacji: C – populacja nieizolowana w obrębie rozległego obszaru występowania.

1188 Kumak nizinny *Bombina bombina*

Obszar Dolny Wieprz PLH060051 zapewnia kumakom właściwe warunki bytowania: duży, zwarty kompleks o mozaikowym charakterze, z licznymi starorzeczami oraz rozlewiskami w okresie wiosenno-letnim.

Ocena ogólna: B, w tym:

Ocena populacji: C – populację w obszarze oszacowano na 200-300 osobników., co stanowi poniżej 2% populacji krajowej.

Ocena stanu zachowania: B

Stopień zachowania siedliska: II – elementy zachowane w dobrym stanie; wszystkie elementy siedliska istotne z punktu widzenia biologii gatunku dobrze zachowane.

Ocena izolacji: C – populacja nieizolowana w obrębie rozległego obszaru występowania.

*1337 Bóbr europejski *Castor fiber*

Dokładna liczebność bobra europejskiego w obszarze nie jest znana, natomiast szacuje się, iż wynosi od 214 do 353 osobników. Siedlisko gatunku charakteryzuje się małym stopieniem przekształcenia, stosunkowo niską antropopresją oraz dobrą bazą żerową i dobrą perspektywą ochrony. Funkcjonowanie populacji gatunku na badanym obszarze nie wydaje się zagrożone.

Ocena ogólna: B, w tym:

Ocena populacji: C – populacja najprawdopodobniej stanowi poniżej 2% populacji krajowej – ze względu na brak danych populację oszacowano na podstawie długości cieków w obszarze stanowiący potencjalne siedlisko gatunku oraz wartości zagęszczenia wynoszącej min. 0,3 osobnika/km i max. 0,5 osobnika/km.

Ocena stanu zachowania: B

Stopień zachowania siedliska: II – elementy zachowane w dobrym stanie; wszystkie elementy siedliska istotne z punktu widzenia biologii gatunku dobrze zachowane.

Ocena izolacji: C – populacja nieizolowana w obrębie rozległego obszaru występowania.

1220 Żółw błotny *Emys orbicularis*

W obszarze znajdują się liczne stawy będące potencjalnym miejscem występowania żółwia błotnego - gatunek został kilkakrotnie zaobserwowany w obrębie stawów.

Reprezentatywność: D - populacja nieistotna.

1355 Wydra *Lutra lutra*

Znakowania wydry obserwowano na obu brzegach Wieprza począwszy od Woli Skromowskiej na wschodzie aż do okolic Strzyżowic na wschodzie. Stan wszystkich stanowisk wydry w obszarze oceniono jako właściwy.

Ocena ogólna: B, w tym:

Ocena populacji: C – liczebność gatunku w Obszarze oszacowano na 10-20 osobników, co stanowi 0,2% populacji krajowej.

Ocena stanu zachowania: B

Stopień zachowania siedliska: II – elementy zachowane w dobrym stanie; wszystkie elementy siedliska istotne z punktu widzenia biologii gatunku dobrze zachowane.

Ocena izolacji: C – populacja nieizolowana w obrębie rozległego obszaru występowania.

1428 Marsylia czterolistna *Marsilea quadrifolia*

Gatunek aktualnie nie występuje w obszarze. Gatunek wykazywany był historycznie. Po 2010 roku nie stwierdzono tu marsylii czterolistnej.

Ocena ogólna: C, w tym:

Ocena populacji: C – aktualnie nie występuje w obszarze.

Ocena stanu zachowania: C

Stopień zachowania siedliska: III – elementy średnio zachowane; znaczne pokrycie siedliska przez roślinność szuwarową i wodną wypierającą gatunek.

Możliwość odtworzenia: trudne lub niemożliwe (możliwe trudności z pozyskaniem sadzonek).

Ocena izolacji: A – populacja izolowana.

1145 Piskorz *Misgurnus fossilis*

Odłowów piskorza dokonano w rzece Minina oraz w cieku o charakterze melioracyjnym w rejonie miejscowości Drążgów.

Ocena ogólna: B, w tym:

Ocena populacji: C – populacja na monitorowanych stanowiskach oceniona na poziomie 0,011 os./m², co stanowi poniżej 2% populacji krajowej.

Ocena stanu zachowania: B

Stopień zachowania siedliska: II – elementy zachowane w dobrym stanie; wszystkie elementy siedliska istotne z punktu widzenia biologii gatunku dobrze zachowane.

Ocena izolacji: C – populacja nieizolowana w obrębie rozległego obszaru występowania.

1166 Traszka grzebieniasta *Triturus cristatus*

Stwierdzono obecność jednej samicy na terenie rezerwatu przyrody „Piskory”.

Reprezentatywność: D - populacja nieistotna.

*1337 bóbr oczekuje na wpis do katalogu przedmiotów ochrony obszaru.

*siedlisko 7230 oczekuje na akceptację Komisji Europejskiej co do jego wykreślenia z katalogu przedmiotów ochrony obszaru.

4.3. Zagrożenia, presje i działania mające wpływ na obszar

Najważniejsze oddziaływania i działalność mające duży wpływ na obszar

Oddziaływania negatywne			
Poziom	Zagrożenia i presje [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnętrzne [i o b]
L	J01.01		i
M	A03.03		i
M	I01		i
L	K02.01		i
L	B02.02		i

M	D03.02.01		b
L	E03		o
L	D01.02		b
M	A04.03		i
L	A01		i
L	F02.03		i
L	E01		b
L	D01.05		i
M	J02.01		b
L	F03.02.03		b
M	H01		b
L	J02.03.02		b
L	A02		i
L	A08		b
H	X		b

Oddziaływania pozytywne

Poziom	Działania, zarządzanie [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnętrzne [i o b]
M	A03		i
L	L08		i
L	A04		i
L	X		o
H	X		b
M	X		o

Poziom: H = wysoki, M = średni, L = niski.

Zanieczyszczenie: N = stosowanie azotu, P = stosowanie fosforu/fosforanów, A = stosowanie kwasów/zakwaszanie, T = toksyczne chemikalia nieorganiczne,

O = toksyczne chemikalia organiczne, X = zanieczyszczenia mieszane.

i = wewnętrzne, o = zewnętrzne, b = jednocześnie.

4.4. Własność (opcjonalnie)

Typ	[%]
Publiczna	Krajowa/federalna
	Kraj
	związkowy/województwo
	Lokalna/gminna
	Inna publiczna
Własność łączna lub współwłasność	
Prywatna	
Nieznana	
Suma	

4.5. Dokumentacja (opcjonalnie)

1. Chmielewski T. J., Sielewicz B. 1996. Renaturalizacja stosunków ekologicznych w rejonie jeziora Piskory w Nadleśnictwie Puławy. Przegl. Przyr. 37684: 143-148. 2. Kucharczyk M. (red.). 1996. Dokumentacja przyrodnicza projektowanego rezerwatu Piskory. TWWP, Lublin. Msc. 3. Chmielewski T.J. 2000. Odtworzenie jeziora Piskory oraz przyrodnicze wzbogacenie jego otoczenia. Biul. Ogr. Bot. 9: 85-88. 4. Nieoczym M. 2005.

Nowe stanowisko żółwia błotnego *Emys orbicularis* (L.) na Lubelszczyźnie. Chrońmy Przyrodę Ojczystą. Kraków.5. Wołk A. 2010. Raport dla gatunku na stanowisku - 1428 Marsylia czterolistna - Piaskownia k. Gołąba. Państwowy Monitoring Środowiska. [On-line]. SI MGSP.6. Kamiński R. 2013. Raport dla gatunku na stanowisku - 1428 Marsylia czterolistna - Piaskownia k. Gołąba. Państwowy Monitoring Środowiska. [On-line]. SI MGSP.7. Kamiński R. 2018. Raport dla gatunku na stanowisku - 1428 Marsylia czterolistna - Piaskownia k. Gołąba. Państwowy Monitoring Środowiska. [On-line]. SI MGSP.8. Miśta T. (red) 2021. Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 PLH060051 Dolny Wieprz w województwie lubelskim, Lublin.9. Wróbel D. (red) 2022. Dokumentacja planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Piskory”, Jasło.

5. STATUS OCHRONY OBSZARU (OPCJONALNIE)

5.1. Istniejące formy ochrony na poziomie krajowym i regionalnym:

[Powrót](#)

Kod	Pokrycie [%]	Kod	Pokrycie [%]	Kod	Pokrycie [%]
PL04	100.0	PL02	2.46		

5.2. Powiązanie opisanego obszaru z innymi formami ochrony:

na poziomie krajowym lub regionalnym:

Kod rodzaju	Nazwa terenu	Rodzaj	Pokrycie [%]
PL02	Piskory	*	2.46
PL04	Obszar Chronionego Krajobrazu Pradolina Wieprza	*	100.0

6. ZARZĄDZANIE OBSZAREM

6.1. Organ lub organy odpowiedzialne za zarządzanie obszarem:

[Powrót](#)

Organizacja:	Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie
Adres:	Polska Bazylianówka 46 20-144 Lublin
Adres e-mail:	sekretariat@lublin.rdos.gov.pl

6.2. Plan(-y) zarządzania:

Aktualny plan zarządzania istnieje:

☐	Tak
☒	Nie, ale jest w przygotowaniu
☐	Nie

7. MAPA OBSZARU

[Powrót](#)

Nr ID INSPIRE:

PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH060051

Mapa załączona jako plik PDF w formacie elektronicznym (opcjonalnie)

☒ Tak ☐ Nie

Odniesienie lub odniesienia do oryginalnej mapy wykorzystanej przy digitalizacji granic elektronicznych (opcjonalnie)

--