



NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

dla obszarów specjalnej ochrony (OSO),
proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (pOZW),
obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW) oraz
specjalnych obszarów ochrony (SOO)

OBSZAR PLH060102

NAZWA
OBSZARU Las Żaliński

ZAWARTOŚĆ

- [1. IDENTYFIKACJA OBSZARU](#)
- [2. POŁOŻENIE OBSZARU](#)
- [3. INFORMACJE PRZYRODNICZE](#)
- [4. OPIS OBSZARU](#)
- [5. STATUS OCHRONY OBSZARU](#)
- [6. POWIĄZANIA OBSZARU](#)
- [7. MAPA OBSZARU](#)

1. IDENTYFIKACJA OBSZARU

1.1. Typ B	1.2. Kod obszaru PLH060102	Powrót
---------------	-------------------------------	------------------------

1.3. Nazwa obszaru

Las Żaliński

1.4. Data opracowania 2009-03	1.5. Data aktualizacji 2024-11
----------------------------------	-----------------------------------

1.6. Instytucja lub osoba przygotowująca wniosek:

Nazwisko/Organizacja:	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Adres:	Polska Al. Jerozolimskie 136 Warszawa 02-305
Adres e-mail:	kancelaria@gdos.gov.pl

Data zaproponowania obszaru jako OZW:	2009-10
Data zatwierdzenia obszaru jako OZW(*):	2012-01
Data objęcia obszaru ochroną SOO:	2022-10
Krajowe odniesienie prawne dla formy ochrony SOO:	rozp. MKiŚ z dn. 2 września 2022 r. w spr. soo Las Żaliński (PLH060102)

2. POŁOŻENIE OBSZARU

[Powrót](#)

2.1. Położenie centralnego punktu [wartości dziesiętne stopni]:

Długość geograficzna
23.6674

Szerokość geograficzna
51.1832

2.2. Powierzchnia [ha]:

784.08

2.3. Obszar morski [%]

0.0

2.5. Kod i nazwa regionu administracyjnego

Kod poziomu NUTS 2

Nazwa regionu

PL31	Lubelskie
------	-----------

2.6. Region biogeograficzny

Kontynentalny (100.0
%)

3. INFORMACJE PRZYRODNICZE

[Powrót](#)

3.1. Typy siedlisk przyrodniczych występujących na terenie obszaru i ocena znaczenia obszaru dla tych siedlisk:

Typy siedlisk wymienione w załączniku I						Ocena obszaru			
Kod	PF	NP	Pokrycie [ha]	Jaskinie [liczba]	Jakość danych	A B C D	A B C		
						Reprezentatywność	Powierzchnia względna	Stan zachowania	Ocena ogólna
6510			47.15		G	B	C	B	C
9170			280.85		G	A	C	B	B

- PF: dla typów siedlisk, do których mogą odnosić się zarówno formy priorytetowe, jak i niepriorytetowe (6210, 7130, 9430) należy wpisać „x” w kolumnie PF celem wskazania formy priorytetowej.
- NP: jeśli dany typ siedliska nie istnieje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Pokrycie: można wpisywać z dokładnością do wartości dziesiętnych.
- Jaskinie: w przypadku siedlisk typu 8310 i 8330 (jaskinie) należy podać liczbę jaskiń, jeśli nie są dostępne szacunkowe dane na temat powierzchni.
- Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. zgrubne dane szacunkowe).

3.2. Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 2009/147/WE i gatunki wymienione w załączniku II do dyrektywy 92/43/EEG oraz ocena znaczenia obszaru dla tych gatunków

Gatunki				Populacja na obszarze							Ocena obszaru			
Grupa	Kod	Nazwa naukowa	S	NP	Typ	Wielkość	Jednostka	Kategoria	Jakość danych	A B C D	A B C			
											Stan			

					Min	Maks		C R V P		Populacja	zachowania	Izolacja	Ogólnie
A	1188	Bombina bombina		p	100	200	i		M	C	B	C	B
R	1220	Emys orbicularis		p				P	DD	D			
I	6169	Euphydryas maturna		p	60	100	i	C	G	C	A	C	B
I	1060	Lycaena dispar		p	40	50	i	C	G	C	B	C	B

- Grupa: A = płazy, B = ptaki, F = ryby, I = bezkręgowce, M = ssaki, P = rośliny, R = gady.
- S: jeśli dane o gatunku są szczególnie chronione i nie mogą być udostępnione publicznie, należy wpisać „tak”.
- NP: jeśli dany gatunek nie występuje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Typ: p = osiadłe, r = wydające potomstwo, c = przelotne, w = zimujące (w przypadku roślin i gatunków niemigrujących należy użyć terminu „osiadłe”).
- Jednostka: i = osobniki pojedyncze, p = pary lub inne jednostki według standardowego wykazu jednostek i kodów zgodnego ze sprawozdawczością na podstawie art. 12 i 17 (zob. [portal referencyjny](#)).
- Kategorie liczebności (kategoria): C = powszechne, R = rzadkie, V = bardzo rzadkie, P = obecne - wypełnić, jeżeli brak jest danych (DD), lub jako uzupełnienie informacji o wielkości populacji.
- Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. zgrubne dane szacunkowe); DD = brak danych (kategorię tę należy stosować wyłącznie, jeśli nie da się dokonać nawet zgrubnej oceny wielkości populacji - w takiej sytuacji można pozostawić puste pole dotyczące wielkości populacji, jednak pole „Kategorie liczebności” musi być wypełnione).

4. OPIS OBSZARU

4.1. Ogólna charakterystyka obszaru

[Powrót](#)

Klasa siedliska przyrodniczego	Pokrycie [%]
N10	0.04
N19	15.88
N07	28.0
N16	47.54
N12	8.55
Ogółem pokrycia siedliska przyrodniczego	100

Dodatkowa charakterystyka obszaru:

Obszar Las Żaliński położony jest w województwie lubelskim, powiecie chełmskim, gminach Dorohusk i Ruda Huta. Powierzchnia obszaru wynosi 784,08 ha. Las Żaliński znajduje się w obrębie Chełmskiego Parku Krajobrazowego, jest również częścią korytarza ekologicznego istotnego dla migracji zwierząt między obszarami w sieci Natura 2000 (Korytarz Wschodni (GKW-4A).

Na obszar składają się dwa kompleksy: Północny (Polskie Budy) i Południowy. Kompleks Północny zajmuje tereny między miejscowością Zabłocie (na południe od Żalina) a Dobryłów i Popówka (przysiółek Świerży). Kompleks Południowy stanowią lasy Nadleśnictwa Chełm, Leśnictwo Świerże i położony jest ok. 1,5 km na północ od Brzeźna.

Obszar obejmuje część kompleksu Lasów Żalińskich wraz z przylegającymi do nich terenami łąkowymi oraz niewielkimi zbiornikami wodnymi pochodzenia krasowego. Ostoja położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie Chełmskich Torfowisk Węglanowych.

Obszar jest ważnym stanowiskiem przeplatki maturny, drugim pod względem liczebności populacji miejscem

występowania tego motyla w województwie lubelskim. Wyróżnia się również obecnością licznej populacji kumaka nizinnego oraz dobrze zachowanych siedlisk tego gatunku. W lasach dominują typy siedliskowe: lasu świeżego i lasu wilgotnego oraz lasu mieszanego bagiennego. Drzewostany buduje głównie dąb z domieszką gatunków liściastych: grabu, brzozy, lipy, jesionu. Miejscami drzewostan buduje sosna z drugim piętnem z gatunków liściastych.

4.2. Jakość i znaczenie

Ostoja jest drugim pod względem liczebności, miejscem występowania przeplatki maturny w woj. lubelskim. Gatunek ten zasiedla znaczną powierzchnię centralnej i północnej części obszaru. Występuje tu również inny naturalny gatunek motyla: czerwończyk nieparek. Obszar wyróżnia się nie tylko istotną liczebnością kumaka, ale i doskonałymi warunkami dla tego gatunku: znaczną liczbą niewielkich, blisko siebie leżących płytkich zbiorników wodnych oraz siedlisk leśnych i zaroślowych, zapewniających optymalne warunki do przetrwania.

W obszarze PLH060102 przedmiotem ochrony jest siedlisko 6510 i 9170 oraz czerwończyk nieparek, kumak nizinny i przeplatka maturna.

6510 Nizowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (*Arrhenatherion elatioris*)

W toku prac, prowadzonych w latach 2019-2021, zidentyfikowano siedlisko przyrodnicze 6510 Nizowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (*Arrhenatherion elatioris*) na powierzchni 47,15 ha. Nizowe łąki świeże, powstały na skutek ekstensywnie prowadzonej gospodarki, które koszone są zazwyczaj dwa razy do roku, czasami są też umiarkowanie nawożone. Nizowe świeże łąki użytkowane ekstensywnie, występujące w obszarze, charakteryzują się dużą różnorodnością gatunkową. Wykształcają się na żyznych, umiarkowanie wilgotnych glebach mineralnych, bez śladów zabagnienia. Wody gruntowe nie występują tu nigdy na powierzchni ziemi. Wyróżnia je udział traw: rajgrasu wyniosłego (*Arrhenatherum elatius*), kupkówki pospolitej (*Dactylis glomerata*), stokłosa miękkiej (*Bromus hordeaceus*). Dodatkowo występuje tu wiele gatunków z rodziny selerowatych, jak: marchew zwyczajna (*Daucus carota*), pasternak zwyczajny (*Pastinaca sativa*) i biedrzyca wielka (*Pimpinella major*). Tworzą one najwyższy poziom roślinny. Na niższą warstwę składają się dzwonek rozpierzchły (*Campanula patula*), koniczyna łąkowa (*Trifolium pratense*), skalnica ziarenkowata (*Saxifraga granulata*).

W obszarze zidentyfikowano dwa typy łąk świeżych:

a) 6510-1: łąka rajgrasowa (owsicowa) (*Arrhenatherum elatioris*) - gatunkami dominującymi w tym zbiorowisku są trawy darniowe. Dominuje tu rajgras wyniosły *Arrhenatherum elatius*. Spotykane są ponadto barszcz pospolity (*Heracleum sphondylium*), barszcz syberyjski (*Heracleum sibiricum*) oraz kozibród łąkowy (*Tragopogon pratensis*), bodziszek łąkowy (*Geranium pratense*), jastrun właściwy (*Leucanthemum vulgare*), przytulia właściwa (*Galiom mollugo*), świerzbica polna (*Knautia arvensis*), dzwonek rozpierzchły (*Campanula patula*), komonia pospolita (*Lotus corniculatus*), groszek łąkowy (*Lathyrus pratensis*), koniczyna łąkowa (*Trifolium pratense*) i biała (*Trifolium repens*) oraz krwawnik pospolity (*Achillea millefolium*);

b) 6510-2: łąka z wiechlina łąkową i kostrzewą czerwoną (*Poa pratensis*-*Festuca rubra* = *Poo-Festucetum rubrae*) – gatunkami dominującymi są: kostrzewa czerwona (*Festuca rubra*) i wiechlina łąkowa (*Poa pratensis*). Osiągają one zwarcie nawet do 80%. Udział ilościowy innych roślin jest w tym zespole stosunkowo mały. Z drugiej strony ilość gatunków towarzyszących jest znaczna. Należą tu między innymi tomka wonna (*Anthoxanthum odoratum*), śmiełek darniowy (*Deschampsia caespitosa*), kłosówka wełnista (*Holcus lanatus*) i mietlica olbrzymia (*Agrostis gigantea*).

Stan większości płatów siedliska w obszarze oceniono jako właściwy FV (36,64 ha). Jeden płat ma stan niezadowolający U1 (6,21 ha) i jeden zły U2 (4,30 ha). Stan niezadowolający U1 wynika z ekspansji drzew i krzewów, stan zły U2 wynika z uproszczonej struktury, ekspansji drzew i krzewów, rodzimych gatunków ekspansywnych.

Reprezentatywność: B – stan ochrony został oceniony jako dobry;

Powierzchnia względna: C - powierzchnia zajęta przez siedlisko w obszarze zajmuje poniżej 2% powierzchni, na której występuje ten przedmiot ochrony w Polsce;

Ocena stanu zachowania: B – strukturę siedliska oceniono jako dobrze zachowaną, dobre perspektywy zachowania funkcji.

Ocena ogólna: C

9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (*Galio-Carpinetum*, *Tilio-Carpinetum*)

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (*Galio-Carpinetum*, *Tilio-Carpinetum*) na powierzchni 280,85

ha. Gatunkiem dominującym w pierwszym piętrze drzewostanu jest dąb szypułkowy *Quercus robur* oraz grab pospolity *Carpinus betulus*, brzoza brodawkowata *Betula pendula* i sosna pospolita *Pinus sylvestris* z domieszką jaworu *Acer pseudoplatanus*, topoli osiki *Populus tremula*, czereśni ptasiej *Cerasus avium*, lipy drobnolistnej *Tilia cordata*, buka zwyczajnego *Fagus sylvatica*, oraz w miejscach wilgotniejszych wiązu polnego *Ulmus minor*. Drugie, a w niektórych przypadkach trzecie, piętro drzewostanu tworzą te same gatunki jakie występują w warstwie panującej, jednak dominującą rolę w tej warstwie drzewostanu odgrywa grab zwyczajny *Carpinus betulus* a w przypadku piętra trzeciego (A3) w niektórych płatach leszczyna pospolita *Corylus avellana*. Pokrycie powierzchni przez niższe piętra jest bardzo zmienne w zależności od płatu siedliska i wynosi od 0 (brak wykształconego piętra) do 70. Warstwa krzewów wyraźnie zdominowana jest przez leszczynę pospolitą *Corylus avellana* i graba zwyczajnego *Carpinus betulus*. Oprócz tych gatunków w warstwie krzewów występują wszystkie gatunki tworzące drzewostan oraz: jarząb pospolity *Sorbus aucuparia*, trzmielina brodawkowata *Euonymus verrucosus*, czerwona amerykańska *Padus serotina*, dereń świdwa *Cornus sanguinea*, bez czarny *Sambucus nigra*, wawrzynek wilczyko *Daphne mezereum*, głóg jednoszyjkowy *Crataegus monogyna*, jabłoń dzika *Malus sylvestris*, grusza pospolita *Pyrus communis* i kruszyna pospolita *Frangula alnus*.

Wśród gatunków runa występujących w płatach zespołu grądu subkontynentalnego *Tilio cordatae-Carpinetum betuli* na terenie obszaru najczęściej występują gatunki charakterystyczne rzędu *Fagetalia sylvaticae* takie jak: przytulia wonna *Galium odoratum*, miotuńka ciemna *Pulmonaria obscura*, fiołek leśny *Viola reichenbachiana*, prosownica rozpierzchła *Milium effusum*, nerecznica samcza *Dryopteris filix-mas*, turzyca leśna *Carex sylvatica*, groszek wiosenny *Lathyrus vernus*, żankiel zwyczajny *Sanicula europaea*, czworolist pospolity *Paris quadrifolia*, kopytnik pospolity *Asarum europaeum*, niecierpek pospolity *Impatiens noli-tangere*, gajowiec żółty *Galeobdolon luteum* a także gatunki charakterystyczne klasy *Querco-Fagetea*: zawilec gajowy *Anemone nemorosa* (bardzo licznie), kłosownica leśna *Brachypodium sylvaticum*, turzyca palczasta *Carex digitata*, perlówka zwisła *Melica nutans* oraz przylaszczka pospolita *Hepatica nobilis*. W miejscach wilgotniejszych występują gatunki charakterystyczne dla związku *Alno-Ulmion* takie jak: czartawa pospolita *Circaea lutetiana* i kostrzewa olbrzymia *Festuca gigantea*.

W siedlisku grądu subkontynentalnego *Tilio cordatae-Carpinetum betuli* na terenie obszaru dość często występują gatunki runa charakterystyczne z klasy *Artemisietea vulgaris*: kuklik pospolity *Geum urbanum*, jeżyna popielica *Rubus caesius*, bodziszek cuchnący *Geranium robertianum*, pokrzywa zwyczajna *Urtica dioica*, poziwnik pstry *Galeopsis pubescens*, przytulia czepna *Galium aparine* i niecierpek drobnokwiatowy *Impatiens parviflora*. Wśród gatunków towarzyszących najliczniej występowały: miodownik melisowaty *Melittis melissophyllum*, dąbrówka rozłogowa *Ajuga reptans*, konwalijka dwulistna *Maianthemum bifolium*, nerecznica krótkoostna *Dryopteris carthusiana*, żyłka trójnerwowa *Moehringia trinervia*, sałatk leśny *Mylis muralis*, malina kamionka *Rubus saxatilis*, szczawik zajęczy *Oxalis acetosella*, przetacznik ożankowy *Veronica chamaedrys*, tojeść rozesłana *Lysimachia nummularia*, czerniec gronkowy *Actaea spicata*, jastrzębiec leśny *Hieracium murorum*, konwalia majowa *Convallaria majalis* i kosmatka orzęsiona *Luzula pilosa*.

W grądach subkontynentalnych *Tilio cordatae-Carpinetum betuli* warstwa mszaków ma na ogół niewielkie pokrycie (0-30%). Najczęściej występują: płożymczyk falisty *Mnium undulatum* (gat. charakterystyczny związku *Alno-Ulmion*), dzióbekowiec Zetterstedta *Eurhynchium angustriete* i zórawiec falisty *Catharina undulata* (gatunki charakterystyczne związku *Fagetalia*), płożymczyk pokrewny *Mnium affine* i płożnik strojny *Polytrichum attenuatum*.

Reprezentatywność: A - stan ochrony został oceniony jako doskonały

Powierzchnia względna: C - powierzchnia zajęta przez siedlisko w obszarze zajmuje poniżej 2% powierzchni, na której występuje ten przedmiot ochrony w Polsce;

Ocena stanu zachowania: B – Strukturę siedliska oceniono jako dobrze zachowaną, dobre perspektywy zachowania funkcji.

Ocena ogólna: B

1188 Kumak nizinny *Bombina bombina*

Kumak jest zwierzęciem wodno-błotnym, niechętnie poruszającym się na lądzie. Siedliska kumaka w obszarze obejmują wody stojące, najlepiej płytkie, ciepłe, dobrze nasłonecznione, w tym okresowe lejki krasowe, zastoiska wody, torfianki oraz rowy. Siedliska takie w obszarze są bardzo liczne, które znajdują się głównie w północnej enklawie obszaru.

Populacja: ocena C - populacja licząca 100 - 200 osobników, co stanowi prawdopodobnie mniej niż 0,1% populacji krajowej

Stan zachowania: ocena B, w tym: stopień zachowania siedliska: II – elementy zachowane w dobrym stanie,

Las Żaliński stanowi zwarty kompleks o mozaikowym charakterze, zapewniający kumakom właściwe warunki
Izolacja: ocena C - populacja nieizolowana w obrębie zasięgu występowania w Polsce.

Ocena ogólna: B

Aktualizacja informacji o parametrach PO - wielkość populacji - min. 100, maks. 200

6169 Przeplatka maturna *Hypodryas maturna*

Przeplatka maturna *Euphydryas* (*Hypodryas*) *maturna* jest średniej wielkości motylem dziennym, jednopokoleniowym. Osobniki dorosłe pojawiają się niekiedy już z początkiem trzeciej dekady maja, a ich lot trwa zwykle do połowy, a na wschodzie kraju do końca czerwca. Gatunek w obrębie badanego obszaru jest związany troficznie wyłącznie z jesionem wyniosłym. Siedlisko gatunku obejmuje śródleśną drogę z szerokimi pasami roślinności zielnej z odrostami młodych jesionów. Wystawa południowo-wschodnia, południowa i południowo-zachodnia. Drzewostany i uprawy leśne z udziałem jesionu wyniosłego *Fraxinus excelsior*. Typ siedliska: Grąd subkontynentalny *Tilio-Carpinetum*.

Populacja: ocena C - populacja licząca 60-100 osobników, co stanowi prawdopodobnie mniej niż 1% populacji krajowej

Stan zachowania: ocena A, w tym: stopień zachowania siedliska: I – elementy doskonale zachowane,

Izolacja: ocena C - populacja izolowana w obrębie zasięgu występowania w Polsce.

Ocena ogólna: B

1060 Czerwończyk nieparek *Lycaena dispar*

Gatunek występuje w obszarze na wilgotnych siedliskach. Są to głównie obrzeża mokradeł z występującym szczawiem lancetowatym (*Rumex hydrolapathum*), który jest podstawową rośliną pokarmową tego gatunku oraz na łąkach z innymi gatunkami szczawiu (szczaw tępolistny *R. obtusifolius*, szczaw kędzierzawy *R. crispus*). Liczebność szacuje się na 40-50 os.

Populacja: ocena C - liczebność populacji stanowi prawdopodobnie mniej niż 1% populacji krajowej, I

Stan zachowania: ocena B, w tym: stopień zachowania siedliska: I – elementy doskonale zachowane,

Izolacja: ocena C - populacja izolowana w obrębie zasięgu występowania w Polsce.

Ocena ogólna: B

1220 Żółw błotny *Emys orbicularis*

Jedyny rodzimy gatunek żółwia w Polsce. Żółwie w warunkach polskich mogą być aktywne przez cieplejszą część roku (po osiągnięciu temperatury wody 8-10o C), a w okresie zimowym hibernują (od września do kwietnia). Obszar nie pełni istotnej roli dla gatunku. Brak informacji o znanych lęgowiskach gatunku. Brak danych o liczebności gatunku w obszarze

Ocena ogólna: D

*Siedlisko 6410 i 7210 oraz przeplatka *aurina*, modraszek *telejus* i *nausitous* oczekują na akceptację Komisji Europejskiej co do ich wykreślenia z katalogu przedmiotów ochrony obszaru.

4.3. Zagrożenia, presje i działania mające wpływ na obszar

Najważniejsze oddziaływania i działalność mające duży wpływ na obszar

Oddziaływania negatywne			
Poziom	Zagrożenia i presje [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnętrzne [i o b]
H	A02		i
H	A03.01		i
H	A03.03		i
M	I01		o
M	I02		o
H	J02.01		
M	K01.03		b
H	K02.01		i

Oddziaływania pozytywne			
Poziom	Działania, zarządzanie [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnętrzne [i o b]

Poziom: H = wysoki, M = średni, L = niski.

Zanieczyszczenie: N = stosowanie azotu, P = stosowanie fosforu/fosforanów, A = stosowanie kwasów/zakwaszanie, T = toksyczne chemikalia nieorganiczne,

O = toksyczne chemikalia organiczne, X = zanieczyszczenia mieszane.

i = wewnętrzne, o = zewnętrzne, b = jednoczesne.

4.4. Własność (opcjonalnie)

Typ		[%]
Publiczna	Krajowa/federalna	0
	Kraj związkowy/województwo	0
	Lokalna/gminna	0
	Inna publiczna	0
Własność łączna lub współwłasność		0
Prywatna		0
Nieznana		100
Suma		100

4.5. Dokumentacja (opcjonalnie)

1. BULiG o/ Lublin (Miśta T., Zwolski W., Biedroń M., Kasperuk K., Pałka K., Kuśmierz S. Lublin 2021; Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 PLH060010 Las Żaliński w województwie lubelskim 2. Plan Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Chełm od 1.01.2018 r. do 31.12.2027 r. 3. Hołowiński M. Raport dla gatunku na obszarze Natura 2000 – 6169 przepłotka maturna 2011 [On-line]. SI MGSP. 24. Hołowiński M. Raport dla gatunku na obszarze Natura 2000 – 6169 przepłotka maturna 2014 [On-line]. SI MGSP. 5. Pałka K. Raport dla gatunku na obszarze Natura 2000 – 6169 przepłotka maturna 2014 [On-line]. SI MGSP.

5. STATUS OCHRONY OBSZARU (OPCJONALNIE)

5.1. Istniejące formy ochrony na poziomie krajowym i regionalnym:

[Powrót](#)

Kod	Pokrycie [%]	Kod	Pokrycie [%]	Kod	Pokrycie [%]
PL03	99.84				

5.2. Powiązanie opisanego obszaru z innymi formami ochrony:

na poziomie krajowym lub regionalnym:

Kod rodzaju	Nazwa terenu	Rodzaj	Pokrycie [%]
PL03	Chełmski Park Krajobrazowy	*	99.84

6. ZARZĄDZANIE OBSZAREM

[Powrót](#)

6.1. Organ lub organy odpowiedzialne za zarządzanie obszarem:

Organizacja:	Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie
Adres:	Polska Bazylianówka 46 20-144 Lublin
Adres e-mail:	sekretariat@lublin.rdos.gov.pl

6.2. Plan(-y) zarządzania:

Aktualny plan zarządzania istnieje:

☒ Tak	Nazwa: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Las Żaliński PLH060102 Link: https://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2023/7868/akt.pdf
☐ Nie, ale jest w przygotowaniu	
☐ Nie	

7. MAPA OBSZARU

[Powrót](#)

Nr ID INSPIRE:

PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH060102

Mapa załączona jako plik PDF w formacie elektronicznym (opcjonalnie)

☒ Tak ☐ Nie

Odniesienie lub odniesienia do oryginalnej mapy wykorzystanej przy digitalizacji granic elektronicznych (opcjonalnie)

--