



NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

dla obszarów specjalnej ochrony (OSO),
proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (pOZW),
obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW) oraz
specjalnych obszarów ochrony (SOO)

OBSZAR PLH080042
NAZWA
OBSZARU Stara Dąbrowa w Korytach

ZAWARTOŚĆ

- [1. IDENTYFIKACJA OBSZARU](#)
- [2. POŁOŻENIE OBSZARU](#)
- [3. INFORMACJE PRZYRODNICZE](#)
- [4. OPIS OBSZARU](#)
- [5. STATUS OCHRONY OBSZARU](#)
- [6. POWIĄZANIA OBSZARU](#)
- [7. MAPA OBSZARU](#)

1. IDENTYFIKACJA OBSZARU

1.1. Typ B	1.2. Kod obszaru PLH080042	Powrót
---------------	-------------------------------	------------------------

1.3. Nazwa obszaru

Stara Dąbrowa w Korytach

1.4. Data opracowania 2009-01	1.5. Data aktualizacji 2024-03
----------------------------------	-----------------------------------

1.6. Instytucja lub osoba przygotowująca wniosek:

Nazwisko/Organizacja: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Adres: Polska Al. Jerozolimskie 136 Warszawa 02-305
Adres e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl

Data zaproponowania obszaru jako OZW:	2009-10
Data zatwierdzenia obszaru jako OZW(*):	2012-01
Data objęcia obszaru ochroną SOO:	2021-09
Krajowe odniesienie prawne dla formy ochrony SOO:	rozp. MKiŚ z dn. 17 sierpnia 2021 r. w spr. soo Stara Dąbrowa w Korytach (PLH080042)

2. POŁOŻENIE OBSZARU

[Powrót](#)

2.1. Położenie centralnego punktu [wartości dziesiętne stopni]:

Długość geograficzna
15.1743

Szerokość geograficzna
52.277

2.2. Powierzchnia [ha]:

1630.39

2.3. Obszar morski [%]

0.0

2.5. Kod i nazwa regionu administracyjnego

Kod poziomu NUTS 2

Nazwa regionu

PL43	Lubuskie
------	----------

2.6. Region biogeograficzny

Kontynentalny (100.0
%)

3. INFORMACJE PRZYRODNICZE

[Powrót](#)

3.1. Typy siedlisk przyrodniczych występujących na terenie obszaru i ocena znaczenia obszaru dla tych siedlisk:

Typy siedlisk wymienione w załączniku I						Ocena obszaru			
Kod	PF	NP	Pokrycie [ha]	Jaskinie [liczba]	Jakość danych	A B C D	A B C		
						Reprezentatywność	Powierzchnia względna	Stan zachowania	Ocena ogólna
2330			0.16		M	D			
3150			0.41		G	D			
9110			137.6		G	B	C	B	B
9130			9.82		G	B	C	B	B
9170			29.77		G	C	C	B	C
9190			423.11		G	A	C	B	B
91E0			1.3		G	D			

- PF: dla typów siedlisk, do których mogą odnosić się zarówno formy priorytetowe, jak i niepriorytetowe (6210, 7130, 9430) należy wpisać „x” w kolumnie PF celem wskazania formy priorytetowej.
- NP: jeśli dany typ siedliska nie istnieje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Pokrycie: można wpisywać z dokładnością do wartości dziesiętnych.
- Jaskinie: w przypadku siedlisk typu 8310 i 8330 (jaskinie) należy podać liczbę jaskiń, jeśli nie są dostępne szacunkowe dane na temat powierzchni.
- Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. zgrubne dane szacunkowe).

3.2. Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 2009/147/WE i gatunki wymienione w załączniku II do dyrektywy 92/43/EEG oraz ocena znaczenia obszaru dla tych gatunków

Gatunki					Populacja na obszarze						Ocena obszaru			
Grupa	Kod	Nazwa naukowa	S	NP	Typ	Wielkość		Jednostka	Kategoria	Jakość danych	A B C D	A B C		
						Min	Maks		C R V P		Populacja	Stan zachowania	Izolacja	Ogólnie
M	1352	Canis lupus			p	4	8	i		G	C	B	C	B
I	1083	Lucanus cervus			p	800	1500	trees	C	M	B	B	B	B
A	1166	Triturus cristatus			p				R	DD	D			

- Grupa: A = płazy, B = ptaki, F = ryby, I = bezkręgowce, M = ssaki, P = rośliny, R = gady.
- S: jeśli dane o gatunku są szczególnie chronione i nie mogą być udostępnione publicznie, należy wpisać „tak”.
- NP: jeśli dany gatunek nie występuje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Typ: p = osiadłe, r = wydające potomstwo, c = przelotne, w = zimujące (w przypadku roślin i gatunków niemigrujących należy użyć terminu „osiadłe”).
- Jednostka: i = osobniki pojedyncze, p = pary lub inne jednostki według standardowego wykazu jednostek i kodów zgodnego ze sprawozdawczością na podstawie art. 12 i 17 (zob. [portal referencyjny](#)).
- Kategorie liczebności (kategoria): C = powszechne, R = rzadkie, V = bardzo rzadkie, P = obecne - wypełnić, jeżeli brak jest danych (DD), lub jako uzupełnienie informacji o wielkości populacji.
- Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. zgrubne dane szacunkowe); DD = brak danych (kategorię tę należy stosować wyłącznie, jeśli nie da się dokonać nawet zgrubnej oceny wielkości populacji - w takiej sytuacji można pozostawić puste pole dotyczące wielkości populacji, jednak pole „Kategorie liczebności” musi być wypełnione).

4. OPIS OBSZARU

4.1. Ogólna charakterystyka obszaru

[Powrót](#)

Klasa siedliska przyrodniczego	Pokrycie [%]
N17	31.6
N19	36.11
N16	32.27
N12	0.02
Ogółem pokrycia siedliska przyrodniczego	100

Dodatkowa charakterystyka obszaru:

Obszar Natura 2000 Stara Dąbrowa w Korytach PLH080042 położony jest w całości w mezoregionie Równina Torzymska (makroregion: Pojezierze Lubuskie (Brandebursko – Lubuskie) (Solon et al. 2018). Obszar położony jest na terenie dwóch gmin: Torzym (powiat sulęciński) oraz Łagów (powiat świebodziński), na terenie administrowanym przez trzy nadleśnictwa: Torzym, Świebodzin oraz Bytnica. Obszar obejmuje niezwykle cenne, stare drzewostany dębowe z rzadkimi gatunkami chrząszczy ksylofagicznych, w tym dużą i stabilną populacją jelonka rogacza *Lucanus cervus*, dla ochrony którego obszar ma istotne znaczenie. Występują tutaj również znaczne powierzchnie innych typów siedlisk leśnych: kwaśnych i żyznych buczyn oraz grądu środkowoeuropejskiego. W pobliżu rzeki Pliszki odnotowano także niewielkie fragmenty lasów łągowych. W obszarze stwierdzono również występowanie wilka *Canis lupus*, dla którego jest on, wraz z sąsiednimi obszarami Natura 2000 jednym z kluczowych w zachodniej Polsce.

4.2. Jakość i znaczenie

9110 - Kwaśne buczyny (*Luzulo-Fagetum*) W obszarze siedlisko występuje w postaci kilku płatów o łącznej powierzchni 137,6 ha. W obszarze kwaśne buczyny zajmują krawędzie doliny rzeki Pliszki oraz zbocza licznych pagórków i wyniesień częściowo morenowych lub kemów otaczanych przez utwory sandrowe. Pod względem trofii należą one do najbardziej ubogich siedlisk zajmowanych przez lasy liściaste obszaru. Drzewostan kwaśnych buczyn budowany jest przez buka, rzadko z domieszką dębu bezszypułkowego. Runo ubogie, budowane z reguły przez 3-4 gatunki roślin naczyniowych o znikomym pokrywaniu, zdominowane przez gatunki typowe dla siedliska. Najlepiej wykształcone i zachowane kwaśne buczyny znajdują się w południowo-zachodniej części obszaru (blisko linii kolejowej k. Drzewiec) oraz w południowej części. Ogólny stan zachowania kwaśnych buczyn w obszarze można ocenić jako dobry. Elementem istotnie obniżającym stan ochrony siedliska są zbyt niskie zasoby martwego drewna. W oparciu o przeprowadzone rozpoznanie siedlisko w obszarze otrzymało następujące oceny: Reprezentatywność: ocena B (dobra) Powierzchnia względna: ocena C, zawierająca się w przedziale $2\% \geq p > 0$ Siedlisko stanowi mniej niż 1% całkowitej powierzchni pokrytej przez ten typ siedliska w obrębie terytorium państwa Stan zachowania: ocena B (dobry), w tym: Stopień zachowania struktury II (dobrze zachowana) Stopień zachowania funkcji: II (dobre perspektywy), niezależnie od możliwości odtworzenia Ocena ogólna znaczenia obszaru w ochronie siedliska na poziomie: B (dobra) 9130 - Żyzne buczyny (*Dentario glandulosae-Fagenion*, *Galio odorati-Fagenion*) Żyzne buczyny niżowe *Galio odorati-Fagetum* w typowej postaci budowane są przez buka *Fagus sylvatica*, z niewielkim udziałem innych gatunków tj: dąb bezszypułkowy *Quercus petraea*, jawor *Acer pseudoplatanus*. W obszarze siedlisko występuje w postaci dwóch płatów o łącznej powierzchni 9,82 ha. Stan zachowania siedliska można określić jako dobry. Czynnikiem obniżającym stan ochrony siedliska jest niedobór martwego drewna. Spośród wszystkich buczyn obszaru jednym z najcenniejszych o najwyższych walorach (w tym krajobrazowych) jest fragment w wydz. 284 c (n-ctwo Torzym, leśn. Korytno). W oparciu o przeprowadzone rozpoznanie siedlisko w obszarze otrzymało następujące oceny: Reprezentatywność: ocena B (dobra) Powierzchnia względna: ocena C, zawierająca się w przedziale $2\% \geq p > 0$ Siedlisko stanowi mniej niż 1% całkowitej powierzchni pokrytej przez ten typ siedliska w obrębie terytorium państwa Stan zachowania: ocena B (dobry), w tym: Stopień zachowania struktury II (dobrze zachowana) Stopień zachowania funkcji: II (dobre perspektywy), niezależnie od możliwości odtworzenia Ocena ogólna znaczenia obszaru w ochronie siedliska na poziomie: B (dobra) 9170 - Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (*Galio-Carpinetum*, *Tilio-Carpinetum*) W obszarze siedlisko występuje w postaci kilku płatów o łącznej powierzchni 29,77 ha. Wszystkie płaty grądów to zbiorowiska pośrednie pomiędzy mezotroficznym grądem wysokim a kwaśną dąbrową. W obszarze, grądy wyróżniają się ubogim składem florystycznym runa i warstwy krzewów a od kwaśnych dąbrów odróżnia je tylko podwyższony udział graba – szczególnie w drugim piętrze drzewostanu i warstwie krzewiastej. Wszystkie płaty grądów występują w sąsiedztwie dąbrów i buczyn zajmując z reguły niewielkie obniżenia terenowe o wyraźnie wyższej niż otoczenie wilgotności i nieco podwyższonej żyzności. Stan zachowania siedliska można ocenić jako dobry. W oparciu o przeprowadzone rozpoznanie siedlisko w obszarze otrzymało następujące oceny: Reprezentatywność: ocena C – znacząca. Powierzchnia względna: ocena C, zawierająca się w przedziale $2\% \geq p > 0$ Siedlisko stanowi mniej niż 1% całkowitej powierzchni pokrytej przez ten typ siedliska w obrębie terytorium państwa Stan zachowania: ocena B (dobry), w tym: Stopień zachowania struktury II (dobrze zachowana) Stopień zachowania funkcji: II (dobre perspektywy), niezależnie od możliwości odtworzenia Ocena ogólna znaczenia obszaru w ochronie siedliska na poziomie: C (znacząca) 9190 - Kwaśne dąbrowy (*Quercetea robori-petraeae*) W obszarze siedlisko występuje w postaci kilkunastu płatów o łącznej powierzchni 423,11 ha. Siedlisko rozwinęło się na polach sandrowych Równiny Torzymskiej oraz w części Pojezierza Łagowskiego. Dominują tu drzewostany dojrzałe z licznymi starymi drzewami w wieku często powyżej 200 lat. W kompleksie kwaśnych dąbrów występują również płaty grądów oraz buczyn. Pod względem fitosocjologicznym w kompleksie dąbrów w obszarze dominuje zespół dąbrowy trzcinikowej *Calamagrostio arundinaceae-Quercetum petraeae* (=Fago-Quercetum), na znacznej powierzchni dominuje wariant z licznym udziałem borówki czarnej. Drzewostany kwaśnych dąbrów buduje głównie dąb bezszypułkowy, niekiedy z licznym udziałem buka. Runo kwaśnych dąbrów w obszarze charakteryzuje się stosunkowo ubogim składem florystycznym co należy wiązać z uwarunkowaniami lokalnymi oraz dominacją drzewostanów dojrzałych o określonych warunkach świetlnych, a nie przejawem degradacji siedliska. W oparciu o przeprowadzone rozpoznanie siedlisko w obszarze otrzymało następujące oceny: Reprezentatywność: ocena A (doskonała) Powierzchnia względna: ocena C, zawierająca się w przedziale $2\% \geq p > 0$ Siedlisko stanowi mniej niż 1% całkowitej powierzchni pokrytej przez ten typ siedliska w obrębie terytorium państwa Stan zachowania: ocena B (dobry), w tym: Stopień zachowania struktury II (dobrze zachowana) Stopień zachowania funkcji: II (dobre perspektywy), niezależnie od możliwości odtworzenia Ocena ogólna znaczenia obszaru w ochronie siedliska na poziomie: B (dobra) 91E0 - Łęgi

wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (*Salicetum albo-fragilis*, *Populetum albae*, *Alnenion glutinoso-incanae*, olsy źródliskowe) W obszarze łęgi występują wyłącznie wzdłuż rzeki Pliszki w postaci 1 płata o powierzchni 1,3 ha. Zajmują one wąski pas dna doliny i charakteryzują się obecnością typowego runa. Część łęgów ma charakter łęgów źródliskowych rozwijających się pomiędzy korytem rzeki a podstawą zboczy doliny bądź na niewielkich źródliskach. Większość z nich pozostaje pod wpływem wód podziemnych, a ich rozwój nie jest uzależniony od bezpośredniego oddziaływania rzeki. Reprezentatywność: D-niestotna.

2330 - Wydmyny śródlądowe z murawami napiaskowymi (*Spergulo vernalis-Corynephoretum*) W obszarze odnotowano jeden płat siedliska o powierzchni ok. 10 arów położony w miejscowości Zamęt. Reprezentatywność siedliska w obszarze została określana jako D-nieistotna. Ocena przeniesiona z poprzedniej wersji SDF (2020-10)

3150 - Starorzeczka i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne (*Nymphaeion, Potamion*) W obszarze siedlisko występuje obecnie w postaci jednego zbiornika wodnego. Inne, do niedawna występujące śródleśne małe zbiorniki wodne uległy wyschnięciu. Siedlisko obejmuje niewielki śródleśny zbiornik wodny, naturalne jezioro eutroficzne. W północnej części jeziora rozwinęło się torfowisko porośnięte właściwymi szuwarami. Południowa część z pozostałością otwartego lustra wody. Lustro wody porośnięte roślinnością pływającą zdominowaną przez rdestnicę pływającą. W roku 2020 zaobserwowano drastyczny spadek poziomu lustra wody niemal do jej całkowitego wyschnięcia. Reprezentatywność: D-niestotna.

1352 - Wilk *Canis lupus* Wilki występujące na obszarze SOO Stara Dąbrowa w Korytach są częścią subpopulacji zasiedlającej Puszcze Rzepińską (Okarma i in. 2011, Gula i inni 2020). Ze względu na niewielką powierzchnię omawianego obszaru (mogącego stanowić 5-10% powierzchni arealu grupy rodzinnej wilków) należy przyjąć, że SOO Stara Dąbrowa w Korytach zamieszkiwany jest przez tylko jedną wilczą watahę. Ocena populacji: ocena C, zawierająca się w przedziale $2\% \geq p > 0$, na podstawie szacunku wielkości krajowych zasobów danego gatunku na terenie Polski. Stan zachowania: ocena B (dobry), w tym: stopień zachowania cech siedliska: II (elementy dobrze zachowane) Izolacja: C (populacja nieizolowana w obrębie rozległego obszaru występowania) Ocena ogólna wartości obszaru dla ochrony danego gatunku na poziomie: B (dobra)

1083 - Jelonek rogacz *Lucanus cervus* W obszarze gatunek rozmieszczony jest w odpowiadających mu siedliskach na terenie całego obszaru, zarówno w zwartych fragmentach dąbrów jak również na obrzeżach innych typów drzewostanów i wzdłuż dróg lub innych dobrze doświetlonych miejscach. Populacja gatunku w obszarze wydaje się być stosunkowo duża i silna. W PUL Nadl. Torzym wskazano lokalizacje: Leśnictwo Korytno: 258f; 285b; 292b; 294i i w PUL Nadl. Świebodzin w oddz. 209d. Na terenie obszaru w 2016 r. gatunek był również monitorowany przez GIOŚ (jedno stanowisko, wszystkie parametry - FV). Ocena populacji: ocena B, zawierająca się w przedziale $15\% \geq p > 2\%$, na podstawie szacunku wielkości krajowych zasobów danego gatunku na terenie Polski. Stan zachowania: ocena B (dobry), w tym: stopień zachowania cech siedliska: II (elementy dobrze zachowane) Izolacja: B (populacja nieizolowana, ale występująca na peryferiach zasięgu gatunku) Ocena ogólna wartości obszaru dla ochrony danego gatunku na poziomie: B (dobra)

1166 - Traszka grzebieniasta *Triturus cristatus* W obszarze gatunek nie został potwierdzony w trakcie prac terenowych w roku 2020. Ocena populacji w obszarze została określana jako D-nieistotna. Ocena przeniesiona z poprzedniej wersji SDF (2020-10).

4.3. Zagrożenia, presje i działania mające wpływ na obszar

Najważniejsze oddziaływania i działalność mające duży wpływ na obszar

Oddziaływania negatywne			
Poziom	Zagrożenia i presje [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnętrzne [i o b]
H	J03.01		i
M	M01.02		o
H	B02.04		i
Oddziaływania pozytywne			
Poziom	Działania, zarządzanie [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnętrzne [i o b]
M	X		b

Poziom: H = wysoki, M = sredni, L = niski.

Zanieczyszczenie: N = stosowanie azotu, P = stosowanie fosforu/fosforanów, A = stosowanie

kwasów/zakwaszanie, T = toksyczne chemikalia nieorganiczne,

O = toksyczne chemikalia organiczne, X = zanieczyszczenia mieszane.

i = wewnętrzne, o = zewnętrzne, b = jednocześnie.

4.4. Własność (opcjonalnie)

Typ		[%]
Publiczna	Krajowa/federalna	0
	Kraj	0
	związkowy/województwo	0
	Lokalna/gminna	0
	Inna publiczna	0
Własność łączna lub współwłasność		0
Prywatna		0
Nieznana		100
Suma		100

4.5. Dokumentacja (opcjonalnie)

Adamski P., Bartel R., Bereszyński A., Kepel A., Witkowski Z. (red.). 2004 Gatunki Zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska 6 s. 500Bena W. 2007 Występowanie chrząszczy z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej w południowej części Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, na podstawie inwentaryzacji terenowej Zielona Góra 2007 Herbich J. (red). 2004 Wody słodkie i torfowiska. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. 2 Herbich J. (red.) 2004 Lasy i bory. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 5., 344 pp Herbich J. (red.). 2004 Siedliska morskie i przybrzeżne, nadmorskie i śródlądowe solniska i wydmy. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 1., 220 pp Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyński M., Mysłajek R., Niedziałkowski K. i inni 2005 Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce Zakład Badania Ssaków PAN 1-78Mleczak M. 2007a Występowanie chrząszczy z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej w północnej części Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, na podstawie inwentaryzacji terenowej Zielona Góra 2007 Nowak S., Mysłajek R. W., Kłosińska A., Gabryś G. 2011 Diet and prey selection of wolves (Canis lupus) recolonising Western and Central Polska. Mammal Biol., doi: 10.1016/j.mambio.2011.06.007 Nowak S., Mysłajek R.W. 2011 Wilki na zachód od Wisły. Stowarzyszenie dla Natury "Wilk", Twardorzeczka Sewerniak P. 2010 Wolves in the Toruń Basin Ecological Questions 13 47-53Plan Urzędu Lasu Nadleśnictwa Torzym na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2025 r., Taxus UL. Plan Urzędu Lasu dla Nadleśnictwa Świebodzin na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2027 r., BUiGL Oddział w Gorzowie Wlkp.Plan Urzędu Lasu Nadleśnictwa Bytnica Na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2026 r., Taxus UL.Stańko R., Banaszak K., Bojarska K., Kwaśny Ł. 2020. Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 Stara Dąbrowa w Korytach PLH080042 w województwie lubuskim. Opracowanie wykonane na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim.

5. STATUS OCHRONY OBSZARU (OPCJONALNIE)

5.1. Istniejące formy ochrony na poziomie krajowym i regionalnym:

[Powrót](#)

Kod	Pokrycie [%]	Kod	Pokrycie [%]	Kod	Pokrycie [%]
PL04	47.24				

5.2. Powiązanie opisanego obszaru z innymi formami ochrony:

na poziomie krajowym lub regionalnym:

Kod rodzaju	Nazwa terenu	Rodzaj	Pokrycie [%]
PL04	Puszcza nad Pliszką	*	47.24

6. ZARZĄDZANIE OBSZAREM

6.1. Organ lub organy odpowiedzialne za zarządzanie obszarem:

[Powrót](#)

Organizacja:	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
Adres:	Polska Jagiellończyka 13 66-400 Gorzów Wielkopolski
Adres e-mail:	sekretariat@gorzowwlkp.rdos.gov.pl

6.2. Plan(-y) zarządzania:

Aktualny plan zarządzania istnieje:

☒	Tak	Nazwa: ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Stara Dąbrowa w Korytach PLH080042 Link: http://dzienniki.luw.pl/legalact/2021/462/
☐	Nie, ale jest w przygotowaniu	
☐	Nie	

7. MAPA OBSZARU

[Powrót](#)

Nr ID INSPIRE:

PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH080042

Mapa załączona jako plik PDF w formacie elektronicznym (opcjonalnie)

☒ Tak ☐ Nie

Odniesienie lub odniesienia do oryginalnej mapy wykorzystanej przy digitalizacji granic elektronicznych (opcjonalnie)

--