



NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

dla obszarów specjalnej ochrony (OSO),
proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (pOZW),
obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW) oraz
specjalnych obszarów ochrony (SOO)

OBSZAR PLH080057
NAZWA
OBSZARU Dolina Lubszy

ZAWARTOŚĆ

- [1. IDENTYFIKACJA OBSZARU](#)
- [2. POŁOŻENIE OBSZARU](#)
- [3. INFORMACJE PRZYRODNICZE](#)
- [4. OPIS OBSZARU](#)
- [5. STATUS OCHRONY OBSZARU](#)
- [6. POWIĄZANIA OBSZARU](#)
- [7. MAPA OBSZARU](#)

1. IDENTYFIKACJA OBSZARU

1.1. Typ B	1.2. Kod obszaru PLH080057	Powrót
---------------	-------------------------------	------------------------

1.3. Nazwa obszaru

Dolina Lubszy

1.4. Data opracowania 2009-02	1.5. Data aktualizacji 2024-11
----------------------------------	-----------------------------------

1.6. Instytucja lub osoba przygotowująca wniosek:

Nazwisko/Organizacja:	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Adres:	Polska Al. Jerozolimskie 136 Warszawa 02-305
Adres e-mail:	kancelaria@gdos.gov.pl

Data zaproponowania obszaru jako OZW:	2007-03
Data zatwierdzenia obszaru jako OZW(*):	2012-01
Data objęcia obszaru ochroną SOO:	2022-05
Krajowe odniesienie prawne dla formy ochrony SOO:	rozp. MKiŚ z dn. 13 kwietnia 2022 r. w spr. soo Dolina Lubszy (PLH080057)

Wyjaśnienia:	Zmiana nazwy - 10.2009 r.
--------------	---------------------------

2. POŁOŻENIE OBSZARU

2.1. Położenie centralnego punktu [wartości dziesiętne stopni]:

[Powrót](#)

Długość geograficzna
15.0362

Szerokość geograficzna
51.707

2.2. Powierzchnia [ha]:
724.52

2.3. Obszar morski [%]
0.0

2.5. Kod i nazwa regionu administracyjnego

Kod poziomu NUTS 2

Nazwa regionu

PL43

Lubuskie

2.6. Region biogeograficzny

Kontynentalny (100.0
%)

3. INFORMACJE PRZYRODNICZE

3.1. Typy siedlisk przyrodniczych występujących na terenie obszaru i ocena znaczenia obszaru dla tych siedlisk:

[Powrót](#)

Typy siedlisk wymienione w załączniku I						Ocena obszaru			
Kod	PF	NP	Pokrycie [ha]	Jaskinie [liczba]	Jakość danych	A B C D	A B C		
						Reprezentatywność	Powierzchnia względna	Stan zachowania	Ocena ogólna
4030			3.09		G	A	C	B	B
6510			1.35		G	C	C	C	C
9170			26.08		G	A	C	B	C
9190			0.08		G	D			
91D0			1.78		G	C	C	C	C
91E0			7.39		G	B	C	C	C
91F0			1.32		G	C	C	B	C
91T0			0.14		G	D			

- PF: dla typów siedlisk, do których mogą odnosić się zarówno formy priorytetowe, jak i niepriorytetowe (6210, 7130, 9430) należy wpisać „x” w kolumnie PF celem wskazania formy priorytetowej.
- NP: jeśli dany typ siedliska nie istnieje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Pokrycie: można wpisywać z dokładnością do wartości dziesiętnych.
- Jaskinie: w przypadku siedlisk typu 8310 i 8330 (jaskinie) należy podać liczbę jaskiń, jeśli nie są dostępne szacunkowe dane na temat powierzchni.
- Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. zgrubne dane szacunkowe).

3.2. Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 2009/147/WE i gatunki wymienione w załączniku II do dyrektywy 92/43/EEG oraz ocena znaczenia obszaru dla tych gatunków

Gatunki					Populacja na obszarze					Ocena obszaru			
Grupa	Kod	Nazwa naukowa	S	NP	Typ	Wielkość		Jednostka	Kategoria	Jakość danych	A B C D		
						Min	Maks		C R V P		Populacja	Stan zachowania	Izolacja
												Ogólnie	
M	1337	Castor fiber			p	1	5	i		M	D		
M	1355	Lutra lutra			p	1	5	i		M	D		
I	1016	Vertigo moulinsiana			p	1900	2000	area	R	M	C	B	C

- Grupa: A = płazy, B = ptaki, F = ryby, I = bezkręgowce, M = ssaki, P = rośliny, R = gady.
- S: jeśli dane o gatunku są szczególnie chronione i nie mogą być udostępnione publicznie, należy wpisać „tak”.
- NP: jeśli dany gatunek nie występuje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Typ: p = osiadłe, r = wydające potomstwo, c = przelotne, w = zimujące (w przypadku roślin i gatunków niemigrujących należy użyć terminu „osiadłe”).
- Jednostka: i = osobniki pojedyncze, p = pary lub inne jednostki według standardowego wykazu jednostek i kodów zgodnego ze sprawozdawczością na podstawie art. 12 i 17 (zob. [portal referencyjny](#)).
- Kategorie liczebności (kategoria): C = powszechne, R = rzadkie, V = bardzo rzadkie, P = obecne - wypełnić, jeżeli brak jest danych (DD), lub jako uzupełnienie informacji o wielkości populacji.
- Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. zgrubne dane szacunkowe); DD = brak danych (kategorię tę należy stosować wyłącznie, jeśli nie da się dokonać nawet zgrubnej oceny wielkości populacji - w takiej sytuacji można pozostawić puste pole dotyczące wielkości populacji, jednak pole „Kategorie liczebności” musi być wypełnione).

4. OPIS OBSZARU

4.1. Ogólna charakterystyka obszaru

[Powrót](#)

Klasa siedliska przyrodniczego	Pokrycie [%]
N19	37.38
N17	42.64
N16	19.17
N12	0.82
Ogółem pokrycia siedliska przyrodniczego	100

Dodatkowa charakterystyka obszaru:

Obszar Natura 2000 Dolina Lubszy PLH080057 położony jest w południowo-zachodniej części województwa lubuskiego. Pod względem fizyczno-geograficznym (Solon i in. 2008) obszar Natura 2000 położony jest w mezoregionie Wzniesień Żarskich. Opisywany obszar zajmuje fragment północnej części Wzniesień Żarskich wyznaczonej bardzo wyraźną krawędzią stoku, rozciętą głęboko przez doliny rzeczne Makówki i Lubszy. Utwory morenowe widoczne są jako ciągi pagórków, zbudowanych z piasków i żwirów z otoczakami. W ich obrębie występują również płytko zalegające porwaki starszych trzeciorzędowych skał podłoża. Miąższość utworów morenowych dochodzi do 10–12 m. Wzniesienia morenowe otoczone są przez równiny sandrowe zbudowane z piasków i żwirów sandrowych, w obrębie których w rozproszeniu występują pola i wały piasków

przemodelowanych eolicznie.

W granicach obszaru dominują monokultury sosnowe w typie boru świeżego *Leucobryo-Pinetum* oraz grądu *Galio sylvatici-Carpinetum*.

4.2. Jakość i znaczenie

Przedmiotem ochrony w obszarze jest siedlisko przyrodnicze 4030, 6510, 9170, 9190, 91D0, 91E0, 91F0 oraz poczwarówka jajowata.

2330 Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (*Corynephorus*, *Agrostis*)

Siedlisko w obszarze występuje w trzech płatach o łącznej powierzchni 0,72 ha. Reprezentowane jest przez pionierskie bądź bardziej trwale (w przypadku muraw porostowych), skrajnie kserofilne, na ogół ubogie lub niezbyt bogate florystycznie murawy występujące w rozproszeniu na niewielkich fragmentach odsłoniętych, erodujących piasków eolicznych. Przewodnią rolę w warstwie zielonej odgrywa w nich kępkowa trawa szczytlicza siwa *Corynephorus canescens*, ponadto sporek wiosenny *Spergula morisonii*, rzadko szczaw polny *Rumex acetosella* i przetacznik *Dillena Veronica dillenii*.

W oparciu o przeprowadzone rozpoznanie siedlisko w obszarze otrzymało następujące oceny:

Reprezentatywność: ocena B (dobra), wskaźnik kardynalny taki jak gatunki charakterystyczne określony jako właściwy. Powierzchnia względna: ocena C, zawierająca się w przedziale $2\% \geq p > 0$

Stan zachowania: ocena B (średni lub zdegradowany), w tym: stopień zachowania struktury: II (dobrze zachowana). Wskaźniki takie jak gatunki charakterystyczne murawy kserotermiczne/wrzosowiska, Ekspansja krzewów i podrostu drzew, a także gatunki ekspansywne w obu płatach ocenione jako właściwe. stopień zachowania funkcji: II (dobre perspektywy). W perspektywie 20 lat zachowanie siedliska przyrodniczego w stanie niepogorszonym nie jest pewne z powodu występowania lokalnie, inwazyjnego gatunku mchu – krzywoszczeci przywłoki.

Ocena ogólna znaczenia obszaru w ochronie siedliska na poziomie: C (znacząca).

4030 Suche wrzosowiska (*Calluno-Genistion*, *Pohlio-Callunion*, *Calluno-Arctostaphylon*)

Siedlisko w obszarze o powierzchni 3,09 ha jest reprezentowane przez antropogeniczne (półnaturalne) wrzosowiska knotnikowe, wykształcone pod linią wysokiego napięcia, w szerokim pasie przecinającym rozległy kompleks świeżych i wilgotnych borów sosnowych. Siedlisko przebiega przez trzy struktury geomorfologiczne, porastając tym samym zróżnicowane utwory geologiczne: piaski zwałowe w obrębie moreny falistej, piaski wydymowe na nieleśnych fragmentach ramion wydym parabolicznych i piaski sandrowe w obrębie peryglacialnej równiny akumulacyjnej. W warunkach lokalnych siedlisko wyróżnia się bezwzględnym panowaniem wrzosu zwyczajnego *Calluna vulgaris*, niską stałością wątrobowca rzęsiaka pospolitego *Ptilidium ciliare* oraz obfitym udziałem gatunków mchów borowych i/lub porostów. W zależności od warunków wilgotnościowych, zespół jest zróżnicowany na trzy podzespoły: P.-C. *cladonietosum*, P.-C. *typicum* i P.-C. *molinetosum*. W płatach ostatniego podzespołu odnotowano obecność rzadkiej w Polsce odmiany płonnika pospolitego *Polytrichum commune* var. *perigonale*.

W oparciu o przeprowadzone rozpoznanie siedlisko w obszarze otrzymało następujące oceny:

Reprezentatywność: ocena A (doskonała), wskaźnik kardynalny taki jak pokrycie wrzosu zwyczajnego oceniony jako właściwy.

Powierzchnia względna: ocena C, zawierająca się w przedziale $2\% \geq p > 0$ Stan zachowania: ocena B (średni lub zdegradowany), w tym: stopień zachowania struktury: II (dobrze zachowana). Wskaźniki kardynalne takie jak zarośnięcie przez drzewa oraz gatunki obce geograficzne ocenione jako niezadowalające, natomiast wskaźniki można stosunkowo łatwo poprawić poprzez działania ochrony czynnej. stopień zachowania funkcji: II (dobre perspektywy).

Ogólnie struktura i funkcje ocenione jako właściwe.

Ocena ogólna znaczenia obszaru w ochronie siedliska na poziomie: B (dobra), jest efektem podsumowania powyższych ocen.

9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (*Galio-Carpinetum*, *Tilio-Carpinetum*)

Siedlisko zlokalizowane wzdłuż koryta rzek w formie kilku płatów o łącznej powierzchni 26,08 ha. W dolinie Makówki, grądy *Galio sylvatici-Carpinetum* zasiedlają głównie gleby brunatne wylugowane wykształcone z piasków zwałowych; w niższych położeniach doliny - również gleby gruntowoglejowe właściwe wykształcone z piasków starych terasów rzecznych. W skali lokalnej, stosunkowo typowo wykształcone grądy *Galio sylvatici-Carpinetum* występują w dolinie Lubszy, często z wyraźną dynamiką lipy drobnolistnej *Tilia cordata*, co podnosi walor fitocenozy w skali regionu Dolnych Łużyc. Na siedliskach średniozasobnych mamy do

czynienia z grądem wysokim typowym G.s.-C. typicum w wariancie typowym. Fragmenty grądu niskiego G.s.-C. typicum w wariancie ze *Stachys sylvatica* (wyróżniany też w randze podzespołu G.s.-C. *stachyetosum sylvaticae*) występują na siedliskach połęgowych. W dolinie Lubszy grądy zajmują szerokie spektrum podtypów gleb: rdzawe brunatne wykształcone z piasków zwałowych, szarobrunatne i gruntowoglejowe właściwe, wykształcone z piasków rzecznych i sporadycznie mady rzeczne brunatne. W oparciu o przeprowadzone rozpoznanie, siedlisko w obszarze otrzymało następujące oceny:
Reprezentatywność: ocena A (doskonała), płaty w obszarze o zróżnicowanym stanie, ocena kardynalnego wskaźnika takiego jak charakterystyczna kombinacja florystyczna właściwa lub niezadowolająca.
Powierzchnia względna: ocena C, zawierająca się w przedziale $2\% \geq p > 0$
Stan zachowania: ocena B (dobry)
Ocena ogólna znaczenia obszaru w ochronie siedliska na poziomie: C (znacząca) jest efektem podsumowania powyższych ocen.

91D0 Bory i lasy bagienne (*Vaccinio uliginosi*-*Betuletum pubescentis*, *Vaccinio uliginosi*-*Pinetum*, *Pino mugho*-*Sphagnetum*, *Sphagno girgensohnii*-*Piceetum*) i brzoźowo-sosnowe bagienne lasy borealne
Siedlisko w obszarze występuje w 3 płatach o łącznej powierzchni 2,83 ha. Mezotroficzne postaci brzeziny bagiennej *Vaccinio uliginosi*-*Betuletum pubescentis* *moehringietosum* & *polytrichetosum* stwierdzono na dwóch stanowiskach. Położone są w bocznych, zatorfionych kieszeniach pradoliny, porastając gleby torfowo-murszowe oraz mineralno-murszowe. Dekompozycja runa brzeziny bagiennej manifestuje się ekspansją trzęślicy modrej *Molinia caerulea* (cespityzacja) i dynamiką kruszyny (fruticetyzacja). W oparciu o przeprowadzone rozpoznanie siedlisko w obszarze otrzymało następujące oceny:
Reprezentatywność: ocena B
Powierzchnia względna: ocena C, zawierająca się w przedziale $2\% \geq p > 0$
Stan zachowania: ocena B (dobry)
Ocena ogólna znaczenia obszaru w ochronie siedliska na poziomie: C (znacząca) jest efektem podsumowania powyższych ocen.

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (*Salicetum albo-fragilis*, *Populetum albae*, *Alnenion glutinoso-incanae*) i olsy źródliskowe
Siedlisko w obszarze występuje w formie 6 płatów o powierzchni łącznej 18,84 ha. Łęgi olszowe w granicach obszaru ograniczone są do przykorytowych półek tarasowych w dolinie Lubszy zajmując wilgotne gleby szarobrunatne oraz mady inicjalne i próchniczne. Rzadziej spotykane są w zatorfionych obniżeniach w strefach krawędziowych oraz w niszach źródliskowych. Drzewostan łęgu jesionowo-olszowego buduje w obszarze głównie olsza czarna *Alnus glutinosa* czasem z domieszką brzozy (*Betula pendula* i *B. pubescens*) oraz lokalnie świerka pospolitego *Picea abies*. W jego niższej warstwie obecna jest poza tym czeremcha zwyczajna *Prunus padus*. Warstwa krzewów wykształcona jest rozmaicie; w jej tworzeniu biorą udział m.in.: czeremcha zwyczajna *Prunus padus*, porzeczka czerwona *Ribes spicatum*, leszczyna pospolita *Corylus avellana* i dziki bez czarny *Sambucus nigra* oraz podrost drzew. Lokalnie proces neofityzacji wywołuje czeremcha amerykańska *Padus serotina*. Bujne i bogate florystycznie runo odznacza się obecnością gatunków olsowych wśród licznych higrofilnych ziół leśnych, łąkowych i okrajkowych. W granicach obszaru w obrębie zespołu *Fraxino-Alnetum* zanotowano obecność 3 podzespołów: F.-A. *ranunculetosum* na siedliskach najwilgotniejszych i zabagnionych, F.-A. *urticetosum* z większym udziałem gatunków klasy *Querco-Fagetea* na miejscach wyżej położonych oraz F.-A. *cardaminetosum amarae* na źródliskowych krawędziach tarasowych. W oparciu o przeprowadzone rozpoznanie siedlisko w obszarze otrzymało następujące oceny:
Reprezentatywność: ocena A (doskonała)
Powierzchnia względna: ocena C, zawierająca się w przedziale $2\% \geq p > 0$
Stan zachowania: ocena B (dobry), w tym: Aktualnie w części zasobu obserwowany proces grądowienia spowodowany obniżeniem poziomu wód korycie Lubszy
Ocena ogólna znaczenia obszaru w ochronie siedliska na poziomie: C (znacząca) jest efektem podsumowania powyższych ocen.

91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (*Ficario-Ulmetum*)
Łączna powierzchnia siedliska w obszarze wynosi 2,25 ha. Łęg wiązowo-jesionowy na terenie objętym projektem PZO występuje m. in. w dolinie Makówki. Dwuwarstwowy drzewostan budują zamierający jesion wyniosły *Fraxinus excelsior*, olsza czarna *Alnus glutinosa*, dąb szypułkowy *Quercus robur*, wiąz szypułkowy *Ulmus laevis* oraz — będące przejawem postępującego grądowienia - lipa drobnolistna *Tilia cordata* i klon

pospolity *Acer platanoides*. W podszycie rośnie lokalnie bardzo inwazyjna świdośliwa kłosowa *Amelanchier spicata* (neofityzacja); w runie znaczne pokrycie osiągają jeżyny *Rubus sp. div.* (rubietyzacja), co jest reakcją na gładowienie i prześwietlenie drzewostanu w wyniku zamierania jesionu wyniosłego.

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (*Arrhenatherion elatioris*)

Siedlisko w obszarze występuje w dwóch płatach o łącznej powierzchni 4,71 ha, co stanowi 0,00001% zasobu siedliska w kontynentalnym regionie biogeograficznym w Polsce. Łąki rajgrasowe na badanym obszarze porastają średnio żyzne, świeże do umiarkowanie wilgotnych mady na tarasach zalewowych w dolinie Lubszy. Pod względem zmienności lokalno-siedliskowej, w obszarze dominuje wilgotny, wyczyńcowy podzespół łąki rajgrasowej *Arrhenatheretum elatioris alopecuretosum*. Struktura warstwowa runi jest zróżnicowana. Najwyższą warstwę (nawet do 150 cm) tworzą szlachetne, miękkolistne trawy, takie jak rajgras wyniosły *Arrhenatherum elatius*, owsica omszona *Avenula pubescens*, kupkówka pospolita *Dactylis glomerata* ssp. *glomerata*, stokłosa miękka *Bromus hordaceus* i inne. Niższe warstwy budowane są przez barwnie kwitnące zioła, które w wyniku zarzucenia użytkowania, ustępują ekspansywnym graminoidom (np. *Carex hirta*, *Agrostis capillaris*, *Calamagrostis epigejos*).

1016 Poczwarówka jajowata *Vertigo moulinsiana*

Aktualne dane uzyskane na podstawie wykonanej przez ekspertów inwentaryzacji przyrodniczej w 2019 r., w ramach prac planistycznych związanych ze sporządzeniem projektu planu zadań ochronnych wykazały, iż powierzchnia siedliska zajmowanego przez gatunek wynosi 2000 m², a liczebność osobników na stanowisku powyżej 10 na m². Stanowisko zlokalizowane w dole powyrobowiskowym, porośnięte jest głównie przez okresowo zalewany szuwar turzycy błotnej *Caricetum acutiformis*.

Ocenia się, że obecnie poczwarówka jajowata występuje na ok. 60–70% powierzchni szuwarów.

Ocena populacji C: 2% $\geq p > 0$

Stan zachowania B: dobry

Stopień zachowania cech siedliska II - elementy dobrze zachowane. Wszystkie parametry siedliska oprócz roślinności oceniono jako właściwe. Poziom wód gruntowych i ich fluktuacje stanowią jednak czynniki istotnie wpływające na kondycję populacji tego ślimaka

Izolacja C: populacja nieizolowana w obrębie rozległego obszaru występowania

Ocena ogólna B: dobra. jest efektem podsumowania powyższych ocen

1337 Bóbr (*Castor fiber*)

W oparciu o przeprowadzone rozpoznanie w obszarze, podtrzymano ocenę populacji określoną w poprzedniej wersji Standardowego Formularza Danych obszaru (wersja z datą aktualizacji 2022-07).

Wielkość populacji szacuje się na 1-5 osobników.

Ocena populacji: D-populacja nieistotna.

1355 Wydra (*Lutra lutra*)

W oparciu o przeprowadzone rozpoznanie w obszarze, podtrzymano ocenę populacji określoną w poprzedniej wersji Standardowego Formularza Danych obszaru (wersja z datą aktualizacji 2022-07).

Wielkość populacji szacuje się na 1-5 osobników.

Ocena populacji: D-populacja nieistotna.

*7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z *Scheuchzeria-Caricetea*) Siedlisko zajmuje 0,36 ha, aktualnie trwają prace nad określeniem jego aktualnej powierzchni, rozmieszczenia na terenie obszaru i stanu zachowania. Wniosek o usunięcie siedliska z listy przedmiotów ochrony obszaru Dolina Lubszy oczekuje na akceptację Komisji Europejskiej.

*7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk

Siedlisko zajmuje 1,30 ha, aktualnie trwają prace nad określeniem jego aktualnej powierzchni, rozmieszczenia na terenie obszaru i stanu zachowania. Wniosek o usunięcie siedliska z listy przedmiotów ochrony obszaru Dolina Lubszy oczekuje na akceptację Komisji Europejskiej.

*9190 Kwaśne dąbrowy (*Quercion robori-petraeae*)

Siedlisko w obszarze zajmuje powierzchnię 0,08 ha. W oparciu o przeprowadzone rozpoznanie siedlisko w obszarze otrzymało następujące oceny: Reprezentatywność: D (nieistotna) Wniosek o usunięcie siedliska z listy przedmiotów ochrony obszaru Dolina Lubszy oczekuje na akceptację Komisji Europejskiej.

*91T0 Bory chrobotkowe (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum)

Aktualne dane uzyskane w 2019 r. na podstawie wykonanej przez ekspertów inwentaryzacji przyrodniczej, w ramach prac planistycznych związanych ze sporządzeniem projektu planu zadań ochronnych wykazały, iż siedlisko występuje w obszarze na pow. 0,14 ha i ma znaczenie marginalne. Obszar Dolina Lubszy PLH080057 nie pełni znaczącej roli w jego ochronie w kontynentalnym regionie biogeograficznym w Polsce. Płaty zaklasyfikowane do omawianego typu odbiegają od typowych postaci fitocenoz Cladonio-Pinetum. Większość wykazywanych wcześniej w obszarze płatów borów chrobotkowych 91T0 została zdiagnozowana błędnie - do siedliska zaklasyfikowano chrobotkowe postaci borów świeżych Leucobryo-Pinetum.

W związku z powyższym, dane zawarte w poprzedniej wersji Standardowego Formularza Danych (2022-07) w zakresie wskazującym na wpisanie przedmiotowego siedliska na listę przedmiotów ochrony w obszarze, należy uznać jako pierwotny błąd naukowy. W oparciu o przeprowadzone rozpoznanie siedlisko w obszarze otrzymało następujące oceny: Reprezentatywność: D (nieistotna)

W związku z powyższym, wniosek o usunięcie siedliska z listy przedmiotów ochrony obszaru Dolina Lubszy oczekuje na akceptację Komisji Europejskiej.

*UWAGA: siedlisko oczekuje na decyzję Komisji Europejskiej w sprawie usunięcia ze Standardowego Formularza Danych lub listy przedmiotów ochrony.

4.3. Zagrożenia, presje i działania mające wpływ na obszar

Najważniejsze oddziaływania i działalność mające duży wpływ na obszar

Oddziaływania negatywne			
Poziom	Zagrożenia i presje [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnętrzne [i o b]
M	B		i
L	E03		i
M	I01		i
M	X		b
Oddziaływania pozytywne			
Poziom	Działania, zarządzanie [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnętrzne [i o b]
M	X		b

Poziom: H = wysoki, M = średni, L = niski.

Zanieczyszczenie: N = stosowanie azotu, P = stosowanie fosforu/fosforanów, A = stosowanie kwasów/zakwaszanie, T = toksyczne chemikalia nieorganiczne,

O = toksyczne chemikalia organiczne, X = zanieczyszczenia mieszane.

i = wewnętrzne, o = zewnętrzne, b = jednocześnie.

4.4. Własność (opcjonalnie)

Typ		[%]
Publiczna	Krajowa/federalna	0
	Kraj	0
	związkowy/województwo	0
	Lokalna/gminna	0

Inna publiczna	0
Własność łączna lub współwłasność	0
Prywatna	0
Nieznana	100
Suma	100

4.5. Dokumentacja (opcjonalnie)

[1] WZS.2009. Raport nt. siedlisk nieleśnych [2] inwentaryzacje 2007 Inwentaryzacja w Lasach Państwowych[3]Paludella.2019. Dokumentacja planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 Dolina Lubszy PLH080057. Opracowanie wykonane na zlecenie RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim[4] BULiGL.Oddział Poznań.2019. Plan Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Lipinki na okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2029 r. Program Ochrony Przyrody (aktualizacja).

5. STATUS OCHRONY OBSZARU (OPCJONALNIE)

5.1. Istniejące formy ochrony na poziomie krajowym i regionalnym:

[Powrót](#)

Kod	Pokrycie [%]	Kod	Pokrycie [%]	Kod	Pokrycie [%]
PL04	80.57				

5.2. Powiązanie opisanego obszaru z innymi formami ochrony:

na poziomie krajowym lub regionalnym:

Kod rodzaju	Nazwa terenu	Rodzaj	Pokrycie [%]
PL04	Wschodnie okolice Lubska	*	80.57

6. ZARZĄDZANIE OBSZAREM

6.1. Organ lub organy odpowiedzialne za zarządzanie obszarem:

[Powrót](#)

Organizacja:	Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
Adres:	Polska Jagiellończyka 13 66-400 Gorzów Wielkopolski
Adres e-mail:	sekretariat@gorzowwlkp.rdos.gov.pl

6.2. Plan(-y) zarządzania:

Aktualny plan zarządzania istnieje:

☒ Tak	Nazwa: Plan Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Lipinki na okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2029 r. Link: https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-lipinki/decyzja-ministra-klimatu-i-srodowiska
☐ Nie, ale jest w przygotowaniu	
☐ Nie	

7. MAPA OBSZARU

[Powrót](#)

Nr ID INSPIRE:

PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH080057

Mapa załączona jako plik PDF w formacie elektronicznym (opcjonalnie)

☒ Tak ☐ Nie

Odniesienie lub odniesienia do oryginalnej mapy wykorzystanej przy digitalizacji granic elektronicznych (opcjonalnie)