



NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

dla obszarów specjalnej ochrony (OSO),
proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (pOZW),
obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW) oraz
specjalnych obszarów ochrony (SOO)

OBSZAR PLH080073
NAZWA
OBSZARU Rynna Jezior Torzyskich

ZAWARTOŚĆ

- [1. IDENTYFIKACJA OBSZARU](#)
- [2. POŁOŻENIE OBSZARU](#)
- [3. INFORMACJE PRZYRODNICZE](#)
- [4. OPIS OBSZARU](#)
- [5. STATUS OCHRONY OBSZARU](#)
- [6. POWIĄZANIA OBSZARU](#)
- [7. MAPA OBSZARU](#)

1. IDENTYFIKACJA OBSZARU

1.1. Typ B	1.2. Kod obszaru PLH080073	Powrót
---------------	-------------------------------	------------------------

1.3. Nazwa obszaru

Rynna Jezior Torzyskich

1.4. Data opracowania 2009-02	1.5. Data aktualizacji 2024-03
----------------------------------	-----------------------------------

1.6. Instytucja lub osoba przygotowująca wniosek:

Nazwisko/Organizacja:	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Adres:	Polska Al. Jerozolimskie 136 Warszawa 02-305
Adres e-mail:	kancelaria@gdos.gov.pl

Data zaproponowania obszaru jako OZW:	2012-12
Data zatwierdzenia obszaru jako OZW(*):	2013-12
Data objęcia obszaru ochroną SOO:	2022-06
Krajowe odniesienie prawne dla formy ochrony SOO:	rozp. MKiŚ z dn. 13 kwietnia 2022 r. w spr. soo Rynna Jezior Torzyskich (PLH080073)

2. POŁOŻENIE OBSZARU

2.1. Położenie centralnego punktu [wartości dziesiętne stopni]:

[Powrót](#)

Długość geograficzna
14.9992

Szerokość geograficzna
52.3032

2.2. Powierzchnia [ha]:
306.13

2.3. Obszar morski [%]
0.0

2.5. Kod i nazwa regionu administracyjnego

Kod poziomu NUTS 2 Nazwa regionu

PL43	Lubuskie
------	----------

2.6. Region biogeograficzny

Kontynentalny (100.0
%)

3. INFORMACJE PRZYRODNICZE

3.1. Typy siedlisk przyrodniczych występujących na terenie obszaru i ocena znaczenia obszaru dla tych siedlisk:

[Powrót](#)

Typy siedlisk wymienione w załączniku I						Ocena obszaru			
Kod	PF	NP	Pokrycie [ha]	Jaskinie [liczba]	Jakość danych	A B C D	A B C		
						Reprezentatywność	Powierzchnia względna	Stan zachowania	Ocena ogólna
3140			60.58		G	A	C	A	A
3150			74.7		G	B	C	C	C
7140			0.83		G	B	C	C	C
7210			0.28		G	D			
9110			21.4		G	B	C	A	C
9170			9.42		G	D			
9190			2.51		G	D			
91D0			19.64		G	D			
91E0			9.74		G	B	C	B	C

- PF: dla typów siedlisk, do których mogą odnosić się zarówno formy priorytetowe, jak i niepriorytetowe (6210, 7130, 9430) należy wpisać „x” w kolumnie PF celem wskazania formy priorytetowej.
- NP: jeśli dany typ siedliska nie istnieje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Pokrycie: można wpisywać z dokładnością do wartości dziesiętnych.
- Jaskinie: w przypadku siedlisk typu 8310 i 8330 (jaskinie) należy podać liczbę jaskiń, jeśli nie są dostępne szacunkowe dane na temat powierzchni.
- Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. zgrubne dane szacunkowe).

3.2. Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 2009/147/WE i gatunki wymienione w załączniku II do dyrektywy 92/43/EEG oraz ocena znaczenia obszaru dla tych gatunków

Gatunki					Populacja na obszarze						Ocena obszaru			
Grupa	Kod	Nazwa naukowa	S	NP	Typ	Wielkość		Jednostka	Kategoria	Jakość danych	A B C D	A B C		
						Min	Maks		C R V P		Populacja	Stan zachowania	Izolacja	Ogólnie
F	1149	Cobitis taenia			p	100	150	i	C	M	C	B	C	C
I	1042	Leucorhinia pectoralis			p				R	DD	D			
I	1083	Lucanus cervus			p	1	5	trees		M	C	B	C	C
M	1355	Lutra lutra			p	1	5	i		M	D			
I	1084	Osmoderma eremita			p	10	10	trees		G	C	B	C	C
A	1166	Triturus cristatus			p				V	DD	D			

- Grupa: A = płazy, B = ptaki, F = ryby, I = bezkręgowce, M = ssaki, P = rośliny, R = gady.
- S: jeśli dane o gatunku są szczególnie chronione i nie mogą być udostępnione publicznie, należy wpisać „tak”.
- NP: jeśli dany gatunek nie występuje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Typ: p = osiadłe, r = wydające potomstwo, c = przelotne, w = zimujące (w przypadku roślin i gatunków niemigrujących należy użyć terminu „osiadłe”).
- Jednostka: i = osobniki pojedyncze, p = pary lub inne jednostki według standardowego wykazu jednostek i kodów zgodnego ze sprawozdawczością na podstawie art. 12 i 17 (zob. [portal referencyjny](#)).
- Kategorie liczebności (kategoria): C = powszechne, R = rzadkie, V = bardzo rzadkie, P = obecne - wypełnić, jeżeli brak jest danych (DD), lub jako uzupełnienie informacji o wielkości populacji.
- Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. zgrubne dane szacunkowe); DD = brak danych (kategorię tę należy stosować wyłącznie, jeśli nie da się dokonać nawet zgrubnej oceny wielkości populacji - w takiej sytuacji można pozostawić puste pole dotyczące wielkości populacji, jednak pole „Kategorie liczebności” musi być wypełnione).

4. OPIS OBSZARU

4.1. Ogólna charakterystyka obszaru

[Powrót](#)

Klasa siedliska przyrodniczego	Pokrycie [%]
N23	0.33
N17	17.5
N06	46.89
N16	24.42
N10	8.96
N12	1.91
Ogółem pokrycia siedliska przyrodniczego	100

Dodatkowa charakterystyka obszaru:

Obszar położony jest w mezoregionie fizycznogeograficznym Równina Torzymska (J.Kondracki 1998) i obejmuje rynną polodowcową, o około 10 km długości, wypełnioną ciągiem jezior, torfowisk i lasów.

Obszar obejmuje 6 zbiorników wodnych, są to jeziora: Dzikie o pow. 4,77 ha, Jasne (Wilcze) o pow. 25,84 ha, Ciemne (Karasięko) o pow. 19,8 ha, Pniewy (Małe) o pow. 4,81 ha, Wielicko (Garbickie) o pow. 32,75 ha oraz Kręcisko o pow. 45,20 ha. Dwa spośród nich - jezioro Jasne oraz Wielicko - to jeziora ramienicowe, przy czym jezioro Jasne ze względu na bogactwo składu gatunkowego ramienic należy do najcenniejszych w Zachodniej Polsce. Pozostałe zbiorniki należą do jezior eutroficznych. Oprócz jezior w granicach Obszaru wyróżniono także łąki i grądy, kwaśne buczyny, kwaśne dąbrowy bory bagienne oraz torfowiska przejściowe.

Część wschodnia rynny położona jest w zwartym kompleksie borów sosnowych stanowiących północną część Puszczy Rzepińskiej ok. 2 km na południowy- zachód od Torzymia. Część zachodnia obszaru znajduje się w krajobrazie lasów i gruntów użytkowanych rolniczo wokół miejscowości Garbicz, która przylega do obszaru od strony zachodniej.

Na terenie przedmiotowego obszaru znajduje się również użytek ekologiczny „Dzikowiska” oraz obszar chronionego krajobrazu „Puszcza nad Pliszką”.

4.2. Jakość i znaczenie

Przedmiotami ochrony w obszarze są siedliska przyrodnicze: 3140, 3150, 7140 i 9110, a także jelonek rogowy, pachnica debowa i koza.

3140 - Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic (*Charetea fragilis*)
W obszarze siedlisko obejmuje dwa jeziora: Jasne i Garbicz (Wielicko) o łącznej powierzchni 60,58 ha. Jez. Jasne usytuowane w południowej części rynny, ok. 2 km na południe od miasta Torzym... Jest to bezodpływowy zbiornik polimiktyczny, z nie w pełni wykształconą pionową stratyfikacją termiczną. Misa jeziorna jest wydłużona, ułożona w kierunku SE-NW i zbudowana z dwóch plos.

Jezioro Wielicko jest usytuowane w południowej części polodowcowej rynny. Jest to głęboki zbiornik dimiktyczny, z w pełni wykształconą pionową stratyfikacją termiczną. Misa jeziorna jest wydłużona, wygięta w kierunku SE-N i przybiera charakter niewielkiej rynny. W oparciu o przeprowadzone rozpoznanie siedlisko w obszarze otrzymało następujące oceny:

Reprezentatywność: ocena A (doskonała)

Zidentyfikowano tu kilkanaście gatunków oraz kilka zespołów ramienic. Zbiorowiska ramienicowe zajmują ok. 60% jeziora i sięgają do głębokości ok. 8 metrów. Dominują takie zespoły jak: *Charetea fragilis*, *Charetea delicatulae*, *Charetea tomentosae*, *Charetea rudis*, *Charetea polyacanthae*, *Nitellopsidetum obtusae*, *Charetea asperae*.

Powierzchnia względna: ocena C, zawierająca się w przedziale $2\% \geq p > 0$ Siedlisko stanowi mniej niż 1% całkowitej powierzchni pokrytej przez ten typ siedliska w obrębie terytorium państwa

Stan zachowania: ocena A (doskonały), w tym:

Stopień zachowania struktury I (doskonale zachowana)

Ocena ogólna znaczenia obszaru w ochronie siedliska na poziomie: A (doskonała) z uwagi na dobry stan zachowania i dobre warunki hydrologiczne w obrębie największego płatu siedliska.

3150 - Starorzeczka i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne (*Nymphaeion*, *Potamion*)

W obszarze siedlisko stanowią cztery jeziora: Dzikie, Ciemne, Pniewy i Kręcisko o łącznej powierzchni 74,70 ha. Wszystkie jeziora charakteryzują się występowaniem dobrze rozwiniętego pasa szuwarów jednak pod względem fitosocjologicznym są one słabo zróżnicowane. Dominują tu typowe i pospolite zespoły takie jak: *Phragmites communis*, *Typhetum angustifoliae*, *Caricetum acutiformis*, rzadziej *Claditum marisci* (Jezioro Dzikie). Spośród eloidów dominują gatunki pospolite, charakterystyczne dla siedliska takie jak: *Potamogeton perfoliatus*, *Potamogeton natans*, *Myriophyllum spicatum*. *Najas marina*, *Fontinalis antipyreticae*, *Nuphar lutea*, *Nymphaea alba* rzadko tworzące własne zbiorowiska o niewielkiej powierzchni płatów (*Nuphar-Nymphaeetum albae* (f. z *Nuphar lutea*).

W oparciu zebrane dane w ramach prac nad PZO oraz przeprowadzone rozpoznanie, siedlisko w obszarze otrzymało następujące oceny:

Reprezentatywność: ocena B (dobra)

Powierzchnia względna: ocena C, zawierająca się w przedziale $2\% \geq p > 0$ Siedlisko stanowi mniej niż 1% całkowitej powierzchni pokrytej przez ten typ siedliska w obrębie terytorium państwa

Ocena stanu zachowania: ocena C (średni lub zdegradowany), w tym:

Stopień zachowania struktury: III (średnio zachowana lub częściowo zdegradowana)

Stopień zachowania funkcji: III (średnie lub niekorzystne perspektywy)

Możliwości odtworzenia: III (trudne). Wskaźnikami obniżającymi ocenę stanu zachowania były głównie: silny spadek poziomu lustra wody, barwa wody, niekiedy obecność gatunków inwazyjnych, słabo wykształcone zbiorowiska roślinne (występujące głównie w postaci kadtubowej), zbyt niska przezroczystość wody.

Ocena ogólna znaczenia obszaru w ochronie siedliska na poziomie: C (znacząca), jest konsekwencją podsumowania powyższych ocen parametrów.

7140 - Torfowiska przejściowe i trzęsawiska przeważnie z roślinnością z klasy Scheuchzeria-Caricetea

W obszarze siedlisko występuje w południowo-wschodniej części obszaru w postaci jednego płatu o powierzchni 0,83 ha. Torfowisko powstało na skutek terestrializacji zbiornika wodnego. W obrębie torfowiska stwierdzono obecność 14 gatunków torfowców w tym m.in. *Sphagnum inundatum*, *Sphagnum papillosum*, *Sphagnum magellanicum*, *Sphagnum majus* oraz *Sphagnum contortum* (K. Chłopek dane niepubl.). Wśród zbiorowisk szuwarowych znaczną powierzchnię zajmuje szuwar kłoci wiechowatej *Cladietum marisci*. Na obrzeżu torfowiska, na podłożu mineralnym znajdują się liczne stanowiska *Lycopodium annotinum*, a także stanowisko *Lycopodium clavatum*.

W oparciu o przeprowadzone rozpoznanie siedlisko w obszarze otrzymało następujące oceny:

Reprezentatywność: ocena B (dobra),

Powierzchnia względna: ocena C, zawierająca się w przedziale $2\% \geq p > 0$ Siedlisko stanowi mniej niż 1% całkowitej powierzchni pokrytej przez ten typ siedliska w obrębie terytorium państwa

Ocena stanu zachowania: ocena C (średni lub zdegradowany), w tym:

Stopień zachowania struktury: III (średnio zachowana lub częściowo zdegradowana)

Stopień zachowania funkcji: III (średnie lub niekorzystne perspektywy)

Możliwości odtworzenia: III (trudne). W obszarze obserwowane jest silne obniżanie się poziomu wód gruntowych co ma negatywny wpływ również na torfowisko i powoduje silną ekspansję brzozy brodawkowatej i w mniejszym stopniu sosny zwyczajnej. Powierzchnia siedliska ulega zmniejszeniu na rzecz borów bagiennych.

Ocena ogólna znaczenia obszaru w ochronie siedliska na poziomie: C (znacząca), jest konsekwencją podsumowania powyższych ocen parametrów.

9110 - Kwaśne buczyny (*Luzulo-Fagetum*)

W obszarze siedlisko występuje w kilku płatach, w północnej oraz centralnej części obszaru o łącznej powierzchni 21,44 ha. Płaty zajmują krawędzie i strome zbocza rynny jezior obszaru. Jedne z najlepiej zachowanych płatów znajdują się nad jeziorem Wielicko i Kręcko.

W oparciu o przeprowadzone rozpoznanie siedlisko w obszarze otrzymało następujące oceny:

Reprezentatywność: ocena B (dobra)

Powierzchnia względna: ocena C, zawierająca się w przedziale $2\% \geq p > 0$ Siedlisko stanowi mniej niż 1% całkowitej powierzchni pokrytej przez ten typ siedliska w obrębie terytorium państwa

Stan zachowania: ocena A (doskonała), w tym:

Stopień zachowania struktury I (doskonale zachowana), powierzchnia siedliska w obszarze jest stabilna, drzewostany te nie są użytkowane rębnie. Wszystkie płaty siedliska oceniono na FV.

Ocena ogólna znaczenia obszaru w ochronie siedliska na poziomie: C (znacząca)- ze względu na stosunkowo niewielką powierzchnię siedliska, mimo bardzo dobrego stanu zachowania.

91E0 - Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (*Salicetum albo-fragilis*, *Populetum albae*, *Alnion glutinoso-incanae*, olsy źródłiskowe)

W obszarze siedlisko zidentyfikowano w obrębie dwóch płatów o łącznej powierzchni 9,74 ha, zlokalizowanych w centralnej części obszaru.

W oparciu o przeprowadzone rozpoznanie siedlisko w obszarze otrzymało następujące oceny:

Reprezentatywność: ocena B (dobra)

Powierzchnia względna: ocena C, zawierająca się w przedziale $2\% \geq p > 0$ Siedlisko stanowi mniej niż 1% całkowitej powierzchni pokrytej przez ten typ siedliska w obrębie terytorium państwa

Stan zachowania: ocena B (dobra), w tym:

Stopień zachowania struktury III (średnio zachowana lub częściowo zdegradowana)

Stopień zachowania funkcji: II (dobre perspektywy), niezależnie od możliwości odtworzenia

Siedlisko w obszarze silnie zniekształcone, w obu płatach z udziałem gatunków obcych, zaburzony skład gatunkowy i niewłaściwy reżim wodny.

Ocena ogólna: C – znacząca, jest konsekwencją podsumowania powyższych ocen parametrów.

1083 - jelonek rogacz *Lucanus cervus*

W obszarze: występuje wyłącznie w okolicach miejscowości Garbicz i jeziora Kręcko w drzewostanie z udziałem starodrzewu dębowego oraz na obrzeżach okolicznych drzewostanów i wzdłuż dróg, gdzie w składzie gatunkowym drzew występują dęby. W dokumentacji przyrodniczej z 2020 r. wytypowano występowanie gatunku w 1-5 lokalizacji, jednak po analizie danych z 2008 r. populację określono w przedziale 1-5 drzew.

Ocena populacji: ocena C, zawierająca się w przedziale $2\% \geq p > 0$, na podstawie szacunku wielkości krajowych zasobów danego gatunku na terenie Polski.

Stan zachowania: ocena B (dobry), w tym:

stopień zachowania cech siedliska: II (elementy dobrze zachowane), siedlisko gatunku zachowane w dobrym stanie. Na stanowisku dęb nie stanowi gatunku dominującego. Jednak ma znaczny udział na dobrze doświetlonych obrzeżach wydzieli i wzdłuż dróg.

Izolacja: C – populacja nieizolowana, w obrębie rozległego zasięgu występowania gatunku.

Ocena ogólna wartości obszaru dla ochrony danego gatunku na poziomie: C (znacząca), gatunek zasiedla tylko niewielki fragment obszaru. Ocena jest konsekwencją podsumowania powyższych ocen parametrów.

1084 - pachnica dębowa *Osmoderma eremita*

W obszarze gatunek występuje w okolicy miejscowości Garbicz. Siedliskiem gatunku jest tutaj wielogatunkowy las liściasty z udziałem dębów w wieku ok. 350 lat. W odróżnieniu od licznych stanowisk o charakterze stref ekotonowych i towarzyszących alejom drzew przydrożnych tutaj populacja pachnicy ma charakter populacji leśnej. W dokumentacji przyrodniczej z 2020 r. wytypowano występowanie gatunku na 10 drzewach co pokrywa się z danymi z 2008 r.

Ocena populacji: ocena C, zawierająca się w przedziale $2\% \geq p > 0$, na podstawie szacunku wielkości krajowych zasobów danego gatunku na terenie Polski.

Stan zachowania: ocena B (dobry), w tym:

stopień zachowania cech siedliska: II (elementy dobrze zachowane), siedlisko gatunku zachowane w dobrym stanie. Na stanowisku duży udział w drzewostanie mają drzewa o pierśnicy powyżej 100 cm co potencjalnie zapewnia dostępność obszernej próchnowisk, w których mogą żerować larwy pachnicy.

Izolacja: C – populacja nieizolowana, w obrębie rozległego zasięgu występowania gatunku.

Ocena ogólna wartości obszaru dla ochrony danego gatunku na poziomie: C (znacząca), gatunek zasiedla tylko niewielki fragment obszaru.

1149 - koza *Cobitis taenia*

W trakcie szczegółowej inwentaryzacji przyrodniczej w 2020 r. [1] wskazano, iż w obszarze odnotowano 116 osobników gatunku. Populację określono w przedziale 100-150 osobników. W obszarze występowanie kozy stwierdzono na wszystkich wytypowanych do badań, 6 stanowiskach, określono, iż występuje we wszystkich jeziorach przy czym optymalne warunki i właściwy stan ochrony uzyskał w jeziorach Jasnym, Wielicko i Kręcko. W jeziorach Kręcko, Ciemne i Dzikie stan populacji określono jako niezadowalający.

W oparciu o przeprowadzone rozpoznanie gatunek w obszarze otrzymał następujące oceny:

Ocena populacji: ocena C, zawierająca się w przedziale $2\% \geq p > 0$, na podstawie szacunku wielkości krajowych zasobów danego gatunku na terenie Polski.

Stan zachowania: ocena B (dobry), w tym:

stopień zachowania cech siedliska: II (elementy dobrze zachowane).

Izolacja: C – populacja nieizolowana, w obrębie rozległego zasięgu występowania gatunku.

Ocena ogólna wartości obszaru dla ochrony danego gatunku na poziomie: C (znacząca), jest efektem podsumowania powyższych ocen częściowych parametrów.

Ponadto w granicach obszaru stwierdzano występowanie siedlisk: 7210, 9170, 9190 i 91D0 oraz zalotki większej, traszki grzebieniastej i wydry, które nie są przedmiotami ochrony obszaru.

7210 - Torfowiska nakredowe (*Cladietum marisci*, *Caricetum buxbaumii*, *Schoenetum nigricantis*)

W obszarze siedlisko w postaci szuwarów występuje wzdłuż północnego brzegu jeziora Dzikiego o powierzchni 0,28 ha. Szuwar charakteryzuje się ubogim składem gatunkowym. Dominuje tu kłoc wiechowata

z domieszką innych gatunków szuwarowych – głównie trzciny oraz wysokich turzyc.
W oparciu o przeprowadzone rozpoznanie siedlisko w obszarze otrzymało następujące oceny:
Reprezentatywność: D – nieistotna. Siedlisko zajmuje w obszarze bardzo niewielką powierzchnię, a perspektywa jego zachowania ze względu na dynamiczne zmiany warunków hydrologicznych jest trudna do oceny.

9170 - Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

W obszarze grądy zajmują najniższe partie krawędzi i zboczy rynny jezior obszaru (powierzchnia 9,42 ha). Rozciągają się tuż za pasem olszyn porastających brzegi jezior w kierunku wysoczyzn.

W oparciu o przeprowadzone rozpoznanie siedlisko w obszarze otrzymało następujące oceny:

Reprezentatywność: D- nieistotna. Ze względu na ubogi skład gatunkowy runa i występowanie gatunków obcych.

9190 - Kwaśne dąbrowy (Quercetea robori-petraeae)

W obszarze występują dwa płaty siedliska o łącznej powierzchni 2,51 ha. Pierwszy położony wzdłuż północno-zachodniego brzegu jeziora Jasnego, drugi płat na półwyspie przy północnym brzegu jeziora Ciemnego. Obydwa płaty stanowią wąski pas drzew ok. 5-15 m wzdłuż brzegu jezior. Zbiorowisko kwaśnej dąbrowy ma tu charakter kadłubowy.

W oparciu o przeprowadzone rozpoznanie siedlisko w obszarze otrzymało następujące oceny:

Reprezentatywność: D- nieistotna. Z uwagi na niski stopień reprezentatywności i niewielką zajmowaną powierzchnię siedlisko nie spełnia kryteriów uznania za przedmiot ochrony w obszarze

91D0 - Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)

W obszarze odnotowano 6 płatów siedliska o łącznej powierzchni 19, 64 ha. W oparciu

o przeprowadzone rozpoznanie siedlisko w obszarze otrzymało następujące oceny:

Reprezentatywność: D-nieistotna. W obrębie siedliska w obszarze warunki hydrologiczne mocno zaburzone, bardzo niski poziom wód gruntowych. Siedlisko silnie przesuszone. Część płatów reprezentuje wczesne stadia sukcesyjne a przy tym silnie zniekształcone lub zdegradowane.

1042 - zalotka większa *Leucorrhinia pectoralis*

Na podstawie wykonanej inwentaryzacji przyrodniczej w 2020 r. w obszarze nie odnotowano obecności gatunku, mimo dwukrotnych poszukiwań nad jeziorem Dzikim, które stanowi najodpowiedniejsze siedlisko dla gatunku w obszarze oraz innych potencjalnych stanowiskach. W granicach Obszaru obserwuje się silne niekorzystne zmiany warunków hydrologicznych. Fakt, iż lustro wody na dużej części zbiornika, w miejscach gdzie roślinność jest najdogodniejsza dla zalotki, nie sięga brzegu bardzo mocno ogranicza wytworzenie warunków abiotycznych korzystnych z punktu widzenia biologii gatunku. Prawdopodobieństwo poprawy warunków hydrologicznych i tym samym zachowania gatunku w Obszarze jest niewielkie.

Ocena populacji na podstawie analizy wyników inwentaryzacji: D-nieistotna

1166 - traszka grzebieniasta *Triturus cristatus*

W trakcie szczegółowej inwentaryzacji przyrodniczej w 2020 r. w obszarze nie odnotowano obecności gatunku. Brak też dogodnych dla niego siedlisk.

Ocena populacji: D-nieistotna

1355 – wydra *Lutra lutra*

W trakcie szczegółowej inwentaryzacji przyrodniczej w 2020 r., nie odnotowano w obszarze śladów obecności gatunku.

Ocena populacji: D-nieistotna

4.3. Zagrożenia, presje i działania mające wpływ na obszar

Najważniejsze oddziaływania i działalność mające duży wpływ na obszar

Oddziaływania negatywne		
	Zagrożenia	Zanieczyszczenie
		Wewnętrzne

Poziom	i presje [kod]	(opcjonalnie) [kod]	/ zewnątrzne [i o b]
M	H01		i
M	E03		i
M	E01		o
H	M01.02		b
H	K02		i
H	G05.01		b
H	M01		o
Oddziaływania pozytywne			
Poziom	Działania, zarządzanie [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnątrzne [i o b]
H	B02		b

Poziom: H = wysoki, M = średni, L = niski.

Zanieczyszczenie: N = stosowanie azotu, P = stosowanie fosforu/fosforanów, A = stosowanie kwasów/zakwaszanie, T = toksyczne chemikalia nieorganiczne,

O = toksyczne chemikalia organiczne, X = zanieczyszczenia mieszane.

i = wewnętrzne, o = zewnętrzne, b = jednocześnie.

4.4. Własność (opcjonalnie)

Typ		[%]
Publiczna	Krajowa/federalna	0
	Kraj związkowy/województwo	0
	Lokalna/gminna	0
	Inna publiczna	0
Własność łączna lub współwłasność		0
Prywatna		0
Nieznana		100
Suma		100

4.5. Dokumentacja (opcjonalnie)

[1] M. Mleczak.2008.Występowanie motyli i chrząszczy z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej na terenie projektowanych obszarów Natura 2000(...), Rynna Jezior Torzyskich w województwie lubuskim na podstawie inwentaryzacji terenowej. Zielona Góra[2] A.Łabędzki.2009. Raport nt. występowania w województwie lubuskim gatunków ważek (Odonata) z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Poznań.[3] Stańko R., Banaszak K., Kwaśny Ł. 2020. Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 Rynna Jezior Torzyskich PLH080073 w województwie lubuskim. Opracowanie wykonane na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim. Świebodzin.

5. STATUS OCHRONY OBSZARU (OPCJONALNIE)

5.1. Istniejące formy ochrony na poziomie krajowym i regionalnym:

[Powrót](#)

Kod	Pokrycie [%]	Kod	Pokrycie [%]	Kod	Pokrycie [%]

PL04	100.0
------	-------

5.2. Powiązanie opisanego obszaru z innymi formami ochrony:

na poziomie krajowym lub regionalnym:

Kod rodzaju	Nazwa terenu	Rodzaj	Pokrycie [%]
PL04	Puszcza nad Pliszką	*	100.0

6. ZARZĄDZANIE OBSZAREM

6.1. Organ lub organy odpowiedzialne za zarządzanie obszarem:

[Powrót](#)

Organizacja:	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
Adres:	Polska Jagiellończyka 13 66-400 Gorzów Wielkopolski
Adres e-mail:	sekretariat@gorzowwlkp.rdos.gov.pl

6.2. Plan(-y) zarządzania:

Aktualny plan zarządzania istnieje:

☐	Tak
☒	Nie, ale jest w przygotowaniu
☐	Nie

7. MAPA OBSZARU

[Powrót](#)

Nr ID INSPIRE:

PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH080073

Mapa załączona jako plik PDF w formacie elektronicznym (opcjonalnie)

☒ Tak ☐ Nie

Odniesienie lub odniesienia do oryginalnej mapy wykorzystanej przy digitalizacji granic elektronicznych (opcjonalnie)

--