



NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

dla obszarów specjalnej ochrony (OSO),
proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (pOZW),
obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW) oraz
specjalnych obszarów ochrony (SOO)

OBSZAR PLH100017
NAZWA
OBSZARU Buczyna Janinowska

ZAWARTOŚĆ

- [1. IDENTYFIKACJA OBSZARU](#)
- [2. POŁOŻENIE OBSZARU](#)
- [3. INFORMACJE PRZYRODNICZE](#)
- [4. OPIS OBSZARU](#)
- [5. STATUS OCHRONY OBSZARU](#)
- [6. POWIĄZANIA OBSZARU](#)
- [7. MAPA OBSZARU](#)

1. IDENTYFIKACJA OBSZARU

1.1. Typ B	1.2. Kod obszaru PLH100017	Powrót
---------------	-------------------------------	------------------------

1.3. Nazwa obszaru

Buczyna Janinowska

1.4. Data opracowania 2008-10	1.5. Data aktualizacji 2025-01
----------------------------------	-----------------------------------

1.6. Instytucja lub osoba przygotowująca wniosek:

Nazwisko/Organizacja:	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Adres:	Polska Al. Jerozolimskie 136 Warszawa 02-305
Adres e-mail:	kancelaria@gdos.gov.pl

Data zaproponowania obszaru jako OZW:	2009-10
Data zatwierdzenia obszaru jako OZW(*):	2012-01
Data objęcia obszaru ochroną SOO:	2022-02
Krajowe odniesienie prawne dla formy ochrony SOO:	rozp. MKiŚ z dn. 16 grudnia 2021 r. w spr. soo Buczyna Janinowska (PLH100017)

2. POŁOŻENIE OBSZARU

[Powrót](#)

2.1. Położenie centralnego punktu [wartości dziesiętne stopni]:

Długość geograficzna
19.6856

Szerokość geograficzna
51.8503

2.2. Powierzchnia [ha]:
528.96

2.3. Obszar morski [%]

0.0

2.5. Kod i nazwa regionu administracyjnego

Nazwa regionu

PL11	Łódzkie
------	---------

2.6. Region biogeograficzny

Kontynentalny (100.0 %)

3. INFORMACJE PRZYRODNICZE

[Powrót](#)

3.1. Typy siedlisk przyrodniczych występujących na terenie obszaru i ocena znaczenia obszaru dla tych siedlisk:

Typy siedlisk wymienione w załączniku I						Ocena obszaru			
Kod	PF	NP	Pokrycie [ha]	Jaskinie [liczba]	Jakość danych	A B C D	A B C		
						Reprezentatywność	Powierzchnia względna	Stan zachowania	Ocena ogólna
9110			220.11		G	B	C	B	C
9170			27.69		M	C	C	C	C
91E0			4.76		M	D			

- PF: dla typów siedlisk, do których mogą odnosić się zarówno formy priorytetowe, jak i niepriorytetowe (6210, 7130, 9430) należy wpisać „x” w kolumnie PF celem wskazania formy priorytetowej.
- NP: jeśli dany typ siedliska nie istnieje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Pokrycie: można wpisywać z dokładnością do wartości dziesiętnych.
- Jaskinie: w przypadku siedlisk typu 8310 i 8330 (jaskinie) należy podać liczbę jaskiń, jeśli nie są dostępne szacunkowe dane na temat powierzchni.
- Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. zgrubne dane szacunkowe).

3.2. Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 2009/147/WE i gatunki wymienione w załączniku II do dyrektywy 92/43/EEG oraz ocena znaczenia obszaru dla tych gatunków

Gatunki					Populacja na obszarze					Ocena obszaru	
Grupa	Kod	Nazwa naukowa	S	NP	Typ	Wielkość	Jednostka	Kategoria	Jakość danych	A B C D	A B C

					Min	Maks		C R V P		Populacja	Stan zachowania	Izolacja	Ogólnie
M	1308	Barbastella barbastellus		p				R	DD	D			
M	1324	Myotis myotis		p				R	DD	D			
A	1166	Triturus cristatus		p				V	DD	D			

- Grupa: A = płazy, B = ptaki, F = ryby, I = bezkręgowce, M = ssaki, P = rośliny, R = gady.
- S: jeśli dane o gatunku są szczególnie chronione i nie mogą być udostępnione publicznie, należy wpisać „tak”.
- NP: jeśli dany gatunek nie występuje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Typ: p = osiadłe, r = wydające potomstwo, c = przelotne, w = zimujące (w przypadku roślin i gatunków niemigrujących należy użyć terminu „osiadłe”).
- Jednostka: i = osobniki pojedyncze, p = pary lub inne jednostki według standardowego wykazu jednostek i kodów zgodnego ze sprawozdawczością na podstawie art. 12 i 17 (zob. [portal referencyjny](#)).
- Kategorie liczebności (kategoria): C = powszechne, R = rzadkie, V = bardzo rzadkie, P = obecne - wypełnić, jeżeli brak jest danych (DD), lub jako uzupełnienie informacji o wielkości populacji.
- Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. zgrubne dane szacunkowe); DD = brak danych (kategorię tę należy stosować wyłącznie, jeśli nie da się dokonać nawet zgrubnej oceny wielkości populacji - w takiej sytuacji można pozostawić puste pole dotyczące wielkości populacji, jednak pole „Kategorie liczebności” musi być wypełnione).

3.3. Inne ważne gatunki fauny i flory (opcjonalnie)

Gatunek					Populacja na obszarze			Motywacja						
Grupa	KOD	Nazwa naukowa	S	NP	Wielkość		Jednostka	Kategoria	Gatunki wymienione w załączniku		Inne kategorie			
					Min	Maks		C R V P	IV	V	A	B	C	D
M	1313	Eptesicus nilssonii			1	1	localities	P	X					X
M	1327	Eptesicus serotinus			1	1	localities	P	X					X
M	1331	Nyctalus leisleri			1	1	localities		X					X
M	1312	Nyctalus noctula			1	1	localities	P	X					X
M	1309	Pipistrellus pipistrellus			1	1	localities	P	X					X
M	5009	Pipistrellus pygmaeus			1	1	localities		X					X

- Grupa: A = płazy, B = ptaki, F = ryby, Fu = grzyby, I = bezkręgowce, L = porosty, M = ssaki, P = rośliny, R = gady.
- KOD: w odniesieniu do ptaków z gatunków wymienionych w załączniku IV i V należy zastosować nazwę naukową oraz kod podany na portalu referencyjnym.
- S: jeśli dane o gatunku mają charakter poufny i nie mogą być udostępnione publicznie, należy wpisać „tak”.
- NP: jeśli dany gatunek nie występuje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Jednostka: i = osobniki pojedyncze, p = pary lub inne jednostki Według standardowego Wykazu jednostek i kodów zgodnego ze sprawozdawczością na podstawie art. 12 i 17 (zob. [portal referencyjny](#)).
- Kategoria: kategorie liczebności (kategoria): C = powszechne, R = rzadkie, V = bardzo rzadkie, P = występuje.
- Kategorie motywacji: IV, V: gatunki z załączników do dyrektywy siedliskowej, A: dane z Krajowej Czerwonej Listy; B: gatunki endemiczne; C: konwencje międzynarodowe; D: inne powody

4. OPIS OBSZARU

[Powrót](#)

4.1. Ogólna charakterystyka obszaru

Klasa siedliska przyrodniczego	Pokrycie [%]
N19	43.36
N16	56.61
N12	0.03
Ogółem pokrycia siedliska przyrodniczego	100

Dodatkowa charakterystyka obszaru:

Obszar obejmuje kompleks leśny Janinów, jeden z najcenniejszych naturalnych stanowisk buka przy lokalnie północnej granicy geograficznego zasięgu w centralnej Polsce. Kwaśne buczyny w uroczysku Janinów są dobrze wykształcone, na znacznej powierzchni wykazujące cechy naturalności. Częściowo są to jednogatunkowe, dojrzałe drzewostany z bukiem w wieku do 160 lat (dawny bukowy drzewostan nasienny). Przy północno-wschodniej granicy kompleksu oraz południowo-wschodnim skraju uroczyska zlokalizowane są, cenne pod względem przyrodniczym, źródła - stanowiące miejsce występowania wielu interesujących gatunków roślin i zwierząt. W północnej części uroczyska znajduje się, utworzony w 2000 roku, rezerwat przyrody Parowy Janinowskie. Na powierzchni 41,66 ha ochronie podlegają oryginalne parowy poerozyjne o sumarycznej długości ponad 2,5 km i głębokości do ok. 8 m. Jest to cenny obiekt zarówno pod względem geomorfologicznym, geobotanicznym jak i krajoznawczym. Buczyna Janinowska ze względu na szczególne walory przyrodnicze i krajobrazowe jest ważnym obiektem dydaktycznym dla studentów biologii, ochrony Środowiska oraz leśnictwa, a także często odwiedzanym kompleksem przez krajoznawców i turystów. Jest także jednym z ważnych elementów systemu przyrodniczego wokół dużej aglomeracji miejskiej.

4.2. Jakość i znaczenie

Przedmiotem ochrony w obszarze są 2 siedliska przyrodnicze – 9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum) i 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum).

9110 - Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum)

Siedlisko jest reprezentowane przez kwaśne buczyny niżowe a stanowią je ubogie florystycznie i siedliskowo lasy bukowe na północno-wschodniej granicy geograficznego zasięgu buka zwyczajnego (*Fagus sylvatica*) na niżu. Gatunek ten wyraźnie dominuje w drzewostanie siedliska, również podszyt stanowiony jest przez jednolity podrost bukowy. W runie występują mezotroficzne gatunki roślin, jak np.: konwalijka dwulistna *Majanthemum bifolium*, szczawik zajęczy *Oxalis acetosella* oraz sporadycznie gatunki żyznych lasów liściastych, jak fiołek leśny *Viola reichenbachiana*, gajowiec żółty *Galeobdolon luteum*, turzyca palczasta *Carex digitata*. Siedlisko 9110 w obszarze Natura 2000 Buczyna Janinowska PLH100017 reprezentują płaty typowo rozwinięte, jednakże stanowią one drzewostany gospodarcze, stąd, w wyniku zabiegów uproszczona została struktura przestrzenna i pionowa. Drzewostany są najczęściej jednowiekowe, o średnim wieku około 90 lat, z fragmentami w wieku około 160 lat, głównie w oddziałach, gdzie funkcjonował starodrzew nasienny.

Reprezentatywność B – dobra. Ocenę nadano uwzględniając fakt, że jest to największy powierzchniowo płat siedliska 9110 w Polsce centralnej w granicach naturalnego zasięgu buka.

Pow. względna C. Powierzchnia siedliska w obszarze znajduje się w przedziale poniżej 2% powierzchni siedliska w kraju.

Ocena stanu zachowania B – dobry. Większość siedliska w obszarze to płaty użytkowane w ramach gospodarki leśnej, najlepiej wykształcone płaty siedliska występują w dawnym drzewostanie nasiennym.

Ocena ogólna C – znacząca. Stan siedliska w obszarze należy uznać za dobry, jednak zachowanie płatów ma największe znaczenie w skali lokalnej, gdzie obecność fragmentów starodrzewu ma duże znaczenie dla

różnorodności biologicznej. Należy przyjąć, że jest to największy powierzchniowo płat tego typu siedliska w Polsce centralnej w granicach naturalnego zasięgu buka.

Jakość danych G – dane o wysokiej jakości. Obszar położony w całości na gruntach Lasów Państwowych, siedliska oraz zbiorowiska sklasyfikowane. Z obszaru pochodzą publikacje naukowe, całość siedliska w obszarze została objęta inwentaryzacją.

9170 - Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (*Galio-Carpinetum* i *Tilio-Carpinetum*)

Płaty grądu subkontynentalnego w obszarze Natura 2000 Buczyna Janinowska PLH100017 występują w północno-wschodniej jego części, gdzie zajmują obniżenia terenu. Ich niewielkie powierzchnie rozmieszczone są mozaikowo pośród fitocenoz zdominowanych przez sosnę zwyczajną o charakterze borów świeżych i mieszanych. W drzewostanie występuje dąb szypułkowy, buk zwyczajny i grab pospolity – choć jego udział jest niewielki – a także wprowadzona przez nasadzenia sosna zwyczajna. W warstwie runa występują tylko niektóre gatunki charakterystyczne dla grądów a jedynym powszechnie występującym jest zawilec gajowy *Anemone nemorosa*, rzadziej występują gwiazdnica wielkokwiatowa *Stellaria holostea* i prosownica rozpierzchna *Milium effusum*. Płaty grądu w granicach obszaru wykształcone są w sposób odbiegający od typowych płatów tego siedliska z uwagi na duży udział buka, niewielką liczbę gatunków charakterystycznych, przekształcenia struktury przestrzennej oraz stosunkowo niewielką powierzchnię.

Reprezentatywność C – znacząca. Płaty grądu w granicach obszaru wykształcone są w sposób odbiegający od wzorca syntaksonomicznego z uwagi na duży udział buka i niewielką liczbę gatunków charakterystycznych.

Pow. względna C. Powierzchnia siedliska w obszarze znajduje się w przedziale poniżej 2% powierzchni siedliska w kraju.

Ocena stanu zachowania C – średni. Struktura siedliska w obszarze jest częściowo zdegradowana, użytkowanie w ramach gospodarki leśnej ukierunkowanej na ochronę siedliska daje dobre perspektywy poprawy jego struktury, jednak w odległej perspektywie czasowej.

Ocena ogólna C – znacząca. Stan siedliska w obszarze należy uznać za średni a zachowanie płatów ma największe znaczenie w skali lokalnej.

Jakość danych M – dane o przeciętnej jakości. Obszar położony w całości na gruntach Lasów Państwowych, siedliska oraz zbiorowiska sklasyfikowane.

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (*Salicetum albo-fragilis*, *Populetum albae*, *Alnion glutinoso-incanae*) i olsy źródliskowe

Płaty łęgu olszowego *Fraxino-Alnetum* stwierdzono na małych powierzchniach w południowo-wschodniej części obszaru, w sąsiedztwie znajdujących się na granicy lasu źródlisk oraz niewielkich cieków. Występują jako rozczłonkowane fragmenty wśród innych fitocenoz. Dominują tu stosunkowo młode drzewostany z panującą olchą czarną. Biorąc powyższe pod uwagę nadano im ocenę reprezentatywności D – nieznacząca.

1308 Mopek *Barbastella barbastellus*

W lasach na terenie dzisiejszego obszaru Natura 2000 Buczyna Janinowska PLH100017, przed jego utworzeniem, prowadzono odłowy i badania gatunku przy wykorzystaniu telemetrii VHF, dzięki czemu stwierdzono wówczas obecność kolonii rozrodczej mopka (Pawenta 2002). Gatunek stwierdzany był także w trakcie nasłuchów detektorowych podczas przygotowywania dokumentacji dla planu zadań ochronnych w 2020 r., jednak nie ustalono czy mopki przystępują do rozrodu w obszarze.

Reprezentatywności D – nieznacząca.

1324 Nocek duży *Myotis myotis*

Gatunek stwierdzany w trakcie nasłuchów detektorowych. Obszar Natura 2000 Buczyna Janinowska PLH100017 wykorzystywany jest przez nocki duże jako żerowisko.

Reprezentatywności D – nieznacząca.

1166 Triturus *cristatus* (*Triturus cristatus cristatus*)

Stwierdzono małą populację gatunku w niewielkim zbiorniku wodnym w sąsiedztwie obszaru, który traszki wykorzystują jako siedlisko.

Reprezentatywności D – nieznająca.

4.3. Zagrożenia, presje i działania mające wpływ na obszar

Najważniejsze oddziaływania i działalność mające duży wpływ na obszar

Oddziaływania negatywne			
Poziom	Zagrożenia i presje [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnętrzne [i o b]
L	B02.04		i
L	B02.06		i
M	D01.01		i
L	I01		i
Oddziaływania pozytywne			
Poziom	Działania, zarządzanie [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnętrzne [i o b]
M	B02		i

Poziom: H = wysoki, M = średni, L = niski.

Zanieczyszczenie: N = stosowanie azotu, P = stosowanie fosforu/fosforanów, A = stosowanie kwasów/zakwaszanie, T = toksyczne chemikalia nieorganiczne,

O = toksyczne chemikalia organiczne, X = zanieczyszczenia mieszane.

i = wewnętrzne, o = zewnętrzne, b = jednocześnie.

4.4. Własność (opcjonalnie)

Typ		[%]
Publiczna	Krajowa/federalna	0
	Kraj	0
	związkowy/województwo	0
	Lokalna/gminna	0
	Inna publiczna	0
Własność łączna lub współwłasność		0
Prywatna		0
Nieznana		100
Suma		100

4.5. Dokumentacja (opcjonalnie)

1. Klub Przyrodników 2017 „Monitoring stanu przedmiotów ochrony oraz monitoring realizacji działań ochronnych na terenie obszarów Natura 2000”, BUCZYNA JANINOWSKA PLH100017 - teren rezerwatu przyrody „Parowy Janinowskie”, Świebodzin 2. Lesner B., Sieradzki J., Pawenta W., Brylak Ł. 2021, Dokumentacja Projektu Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 Buczyna Janinowska PLH100017 w województwie łódzkim, Ekolesner 3. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi, Lesner B. Ekolesner 2023, dane niepublikowane

5. STATUS OCHRONY OBSZARU (OPCJONALNIE)

5.1. Istniejące formy ochrony na poziomie krajowym i regionalnym:

Kod	Pokrycie [%]	Kod	Pokrycie [%]	Kod	Pokrycie [%]
PL02	7.83	PL03	100.0	PL04	100.0

5.2. Powiązanie opisanego obszaru z innymi formami ochrony:

na poziomie krajowym lub regionalnym:

Kod rodzaju	Nazwa terenu	Rodzaj	Pokrycie [%]
PL03	Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich	*	100.0
PL02	Parowy Janinowskie	*	7.83
PL04	Doliny Mrogi i Mrożycy	*	100.0

6. ZARZĄDZANIE OBSZAREM

6.1. Organ lub organy odpowiedzialne za zarządzanie obszarem:

Organizacja:	Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi
Adres:	Polska Traugutta 25 90-113 Łódź
Adres e-mail:	sekretariat@lodz.rdos.gov.pl

6.2. Plan(-y) zarządzania:

Aktualny plan zarządzania istnieje:

☒ Tak	Nazwa: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Buczyna Janinowska PLH100017 Link: http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2023/5251/
☐ Nie, ale jest w przygotowaniu	
☐ Nie	

7. MAPA OBSZARU

Nr ID INSPIRE:

PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH100017

Mapa załączona jako plik PDF w formacie elektronicznym (opcjonalnie)

☒ Tak ☐ Nie

Odniesienie lub odniesienia do oryginalnej mapy wykorzystanej przy digitalizacji granic elektronicznych
(opcjonalnie)

--