



NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

dla obszarów specjalnej ochrony (OSO),
proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (pOZW),
obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW) oraz
specjalnych obszarów ochrony (SOO)

OBSZAR PLH100026
NAZWA
OBSZARU Lubiaszów w Puszczy Pilickiej

ZAWARTOŚĆ

- [1. IDENTYFIKACJA OBSZARU](#)
- [2. POŁOŻENIE OBSZARU](#)
- [3. INFORMACJE PRZYRODNICZE](#)
- [4. OPIS OBSZARU](#)
- [5. STATUS OCHRONY OBSZARU](#)
- [6. POWIĄZANIA OBSZARU](#)
- [7. MAPA OBSZARU](#)

1. IDENTYFIKACJA OBSZARU

1.1. Typ B	1.2. Kod obszaru PLH100026	Powrót
---------------	-------------------------------	------------------------

1.3. Nazwa obszaru

Lubiaszów w Puszczy Pilickiej

1.4. Data opracowania 2008-10	1.5. Data aktualizacji 2024-05
----------------------------------	-----------------------------------

1.6. Instytucja lub osoba przygotowująca wniosek:

Nazwisko/Organizacja: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Adres: Polska Al. Jerozolimskie 136 Warszawa 02-305
Adres e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl

Data zaproponowania obszaru jako OZW:	2009-10
Data zatwierdzenia obszaru jako OZW(*):	2012-01
Data objęcia obszaru ochroną SOO:	2018-05
Krajowe odniesienie prawne dla formy ochrony SOO:	rozp. MŚ z dn. 13 marca 2018 r. w spr. soo Lubiaszów w Puszczy Pilickiej (PLH100026)

Wyjaśnienia:	Zmniejszenie 12.2012 r.
--------------	-------------------------

2. POŁOŻENIE OBSZARU

2.1. Położenie centralnego punktu [wartości dziesiętne stopni]:

[Powrót](#)

Długość geograficzna
19.8703

Szerokość geograficzna
51.4262

2.2. Powierzchnia [ha]:
202.81

2.3. Obszar morski [%]
0.0

2.4. Długość obszaru [km]:
2.0

2.5. Kod i nazwa regionu administracyjnego

Kod poziomu NUTS 2 Nazwa regionu

PL11	Łódzkie
------	---------

2.6. Region biogeograficzny

Kontynentalny (100.0
%)

3. INFORMACJE PRZYRODNICZE

3.1. Typy siedlisk przyrodniczych występujących na terenie obszaru i ocena znaczenia obszaru dla tych siedlisk:

[Powrót](#)

Typy siedlisk wymienione w załączniku I						Ocena obszaru			
Kod	PF	NP	Pokrycie [ha]	Jaskinie [liczba]	Jakość danych	A B C D	A B C		
						Reprezentatywność	Powierzchnia względna	Stan zachowania	Ocena ogólna
9170			186.53		M	A	C	A	A
91E0			2.56		M	A	C	A	C
91P0			0.33		G	C	C	C	C

- PF: dla typów siedlisk, do których mogą odnosić się zarówno formy priorytetowe, jak i niepriorytetowe (6210, 7130, 9430) należy wpisać „x” w kolumnie PF celem wskazania formy priorytetowej.
- NP: jeśli dany typ siedliska nie istnieje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Pokrycie: można wpisywać z dokładnością do wartości dziesiętnych.
- Jaskinie: w przypadku siedlisk typu 8310 i 8330 (jaskinie) należy podać liczbę jaskiń, jeśli nie są dostępne szacunkowe dane na temat powierzchni.
- Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. zgrubne dane szacunkowe).

3.2. Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 2009/147/WE i gatunki wymienione w załączniku II do dyrektywy 92/43/EEG oraz ocena znaczenia obszaru dla tych gatunków

Gatunki					Populacja na obszarze						Ocena obszaru			
Grupa	Kod	Nazwa naukowa	S	NP	Typ	Wielkość		Jednostka	Kategoria	Jakość danych	A B C D	A B C		
						Min	Maks		C R V P		Populacja	Stan zachowania	Izolacja	Ogólnie

- Grupa: A = płazy, B = ptaki, F = ryby, I = bezkręgowce, M = ssaki, P = rośliny, R = gady.
- S: jeśli dane o gatunku są szczególnie chronione i nie mogą być udostępnione publicznie, należy wpisać „tak”.
- NP: jeśli dany gatunek nie występuje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Typ: p = osiadłe, r = wydające potomstwo, c = przelotne, w = zimujące (w przypadku roślin i gatunków niemigrujących należy użyć terminu „osiadłe”).
- Jednostka: i = osobniki pojedyncze, p = pary lub inne jednostki według standardowego wykazu jednostek i kodów zgodnego ze sprawozdawczością na podstawie art. 12 i 17 (zob. [portal referencyjny](#)).
- Kategorie liczebności (kategoria): C = powszechne, R = rzadkie, V = bardzo rzadkie, P = obecne - wypełnić, jeżeli brak jest danych (DD), lub jako uzupełnienie informacji o wielkości populacji.
- Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. zgrubne dane szacunkowe); DD = brak danych (kategorię tę należy stosować wyłącznie, jeśli nie da się dokonać nawet zgrubnej oceny wielkości populacji - w takiej sytuacji można pozostawić puste pole dotyczące wielkości populacji, jednak pole „Kategorie liczebności” musi być wypełnione).

3.3. Inne ważne gatunki fauny i flory (opcjonalnie)

Gatunek					Populacja na obszarze				Motywacja						
Grupa	KOD	Nazwa naukowa	S	NP	Wielkość		Jednostka	Kategoria	Gatunki wymienione w załączniku	Inne kategorie					
					Min	Maks		C R V P		IV	V	A	B	C	D
I		Carabus clatratus						P							X
B	A238	Dendrocopos medius						P							X
P		Digitalis grandiflora						V							X
P		Lilium martagon						V							X
M		Nyctalus leisleri						P							X
M		Nyctalus noctula						P							X
P		Platanthera bifolia						V							X
M		Vespertilio murinus						P							X

- Grupa: A = płazy, B = ptaki, F = ryby, Fu = grzyby, I = bezkręgowce, L = porosty, M = ssaki, P = rośliny, R = gady.
- KOD: w odniesieniu do ptaków z gatunków wymienionych w załączniku IV i V należy zastosować nazwę naukową oraz kod podany na portalu referencyjnym.
- S: jeśli dane o gatunku mają charakter poufny i nie mogą być udostępnione publicznie, należy wpisać „tak”.
- NP: jeśli dany gatunek nie występuje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Jednostka: i = osobniki pojedyncze, p = pary lub inne jednostki Według standardowego Wykazu jednostek i kodów zgodnego ze sprawozdawczością na podstawie art. 12 i 17 (zob. [portal referencyjny](#)).
- Kategoria: kategorie liczebności (kategoria): C = powszechne, R = rzadkie, V = bardzo rzadkie, P = występuje.
- Kategorie motywacji: IV, V: gatunki z załączników do dyrektywy siedliskowej, A: dane z Krajowej

4. OPIS OBSZARU

4.1. Ogólna charakterystyka obszaru

[Powrót](#)

Klasa siedliska przyrodniczego	Pokrycie [%]
N16	11.36
N19	51.22
N17	37.42
Ogółem pokrycia siedliska przyrodniczego	100

Dodatkowa charakterystyka obszaru:

Według podziału fizyczno-geograficznego Polski [7] obszar Natura 2000 Lubiaszów w Puszczy Pilickiej PLH100026 położony jest w prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego [31], podprowincji Nizin Środkowopolskich [318], makroregionie Wzniesień Południowomazowieckich [318.8] i mezoregionie Równiny Piotrkowskiej [318.84]. Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej położony jest w Krainie Małopolskiej (VI), w Mezoregionie Piotrkowsko-Opoczyńskim (VI.2) [4]. Administracyjnie obszar położony jest na terenie województwa łódzkiego, w powiecie piotrkowskim, na terenie gmin Sulejów i Wolbórz. Według administracji Lasów Państwowych znajduje się w granicach Nadleśnictwa Piotrków, w leśnictwie Żarnowica. Obszar Natura 2000 Lubiaszów w Puszczy Pilickiej PLH100026 położony jest na wysokości ok. 180 m n.p.m. Kształtuje się jako płaska powierzchnia lekko opadająca w kierunku S-E, ku dolinie rzeki Pilicy. Najwyższy punkt osiąga wysokość 193 m n.p.m., najniższe rejony wynoszą ok. 175 m n.p.m. (dolina Goleszanki). Występują tu różnego rodzaju formy powierzchniowe pochodzenia polodowcowego, eolicznego, rzecznoego, a także takie, które powstały wskutek antropogenicznej działalności człowieka. Obszar obejmuje ekosystemy o naturalnych cechach, dawnej Puszczy Pilickiej. Powierzchnia obszaru w zdecydowanej części zajęta jest przez fitocenozy grądu subkontynentalnego *Tilio-Carpinetum* w odmianie małopolskiej, z udziałem jodły pospolitej *Abies alba*. Grądy reprezentują szerokie spektrum zróżnicowania ekologicznego: od higrofilnych grądów niskich do grądów wysokich z udziałem gatunków termofilnych. Cechą świadczącą o naturalnym charakterze ekosystemów jest ponadto duży udział martwego drewna na dnie lasu. Występują tu stare drzewostany jodły w wieku 150 lat o wysokości ponad 35 m, grupa modrzewia polskiego w wieku 140 lat o wysokości 40 m oraz 200-letnie dęby. W południowej części obiektu znajduje się dolina niewielkiego cieku, w której wykształcił się łęg jesionowo-olszowy *Fraxino-Alnetum* [2]. Obszar położony jest w całości na terenie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego, nie sąsiaduje bezpośrednio z innymi obszarami Natura 2000. Obszar Natura 2000 Lubiaszów w Puszczy Pilickiej PLH100026 pokrywa się w całości z rezerwatem przyrody „Lubiaszów”.

4.2. Jakość i znaczenie

W obszarze PLH100026 przedmiotem ochrony są obecnie siedliska: 9170 i 91E0, ujęte w Załączniku I Dyrektywy siedliskowej..

9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (*Galio-Carpinetum*, *Tilio-Carpinetum*)

W obszarze Natura 2000 Lubiaszów w Puszczy Pilickiej dominują wielogatunkowe lasy grądowe o charakterze kontynentalnym *Tilio-Carpinetum*. Grąd w rezerwacie Lubiaszów zróżnicowany jest na pięć zbiorowisk i reprezentuje szerokie spektrum zróżnicowania ekologicznego: od higrofilnych grądów niskich do grądów wysokich z udziałem gatunków termofilnych. Siedlisko przyrodnicze jest typowo wykształcone z licznymi gatunkami charakterystycznymi i reprezentatywnymi. Na szczególną uwagę zasługuje fragment lasu w południowej części rezerwatu z 200-letnim drzewostanem dębowym. Sztandarowym dla obszaru jest podzespół grądu typowego *Tilio-Carpinetum* typicum ze stałym udziałem jodły. W płatach tego zbiorowiska zachowała się bogata zielna flora grądowa. Są to przede wszystkim: zawilec gajowy *Anemone nemorosa*, przyłaszczka pospolita *Hepatica nobilis*, nerecznica samcza *Dryopteris filix-mas*, fiołek leśny *Viola*

reichenbachiana, gwiazdnica wielkokwiatowa *Stellaria holostea*, miodunka  ma *Pulmonaria obscura*, groszek wiosenny *Lathyrus vernus*, marzanka wonna *Galium odoratum*, przytulia Szultesa *Galium schultesii*, lilia  łotog  w *Lilium martagon*, kokoryczka wielokwiatowa *Polygonatum multiflorum*, barwinek pospolity *Vinca minor*, zdroj wka rutewkowata *Isopyrum thalictroides* i inne. W niektórych pracach dotycz cych Lubiaszowa tego typu zbiorowisko bywa o klasyfikowane jako tzw. Czarny las, tj. podzesp   jod owy gr du Tilio-Carpinetum abietetosum. Zbiorowisko gr du typowego zdegenerowanego ze znacznym udzia em sosny w drzewostanie Tilio-Carpinetum typicum deg. *Pinus sylvestris* cechuje si  do c liczny  udzia em sosny wprowadzonej antropogenicznie. Jest ona gatunkiem wsp łdominuj cym w znacznej cz sci. Pinetyzacja, tj. borowienie jest nadal dominuj c  form  degeneracji pomimo zachodz cego procesu regeneracji zbiorowiska gr dowego. Drzewostan badanego zbiorowiska posiada charakter ka l ubowy, jest zwykle 2 - 3 gatunkowy; obok sosny pospolitej *Pinus sylvestris* najcz ściej wyst puje: d b szypu kowy *Quercus robur*, grab pospolity *Carpinus betulus*, g dzie Niedziedzie lipa drobnolistna *Tilia cordata*, brzoza brodawkowata *Betula pendula*, osika *Populus tremula* i in. Pojawiaj  si  r wnie  inne gatunki wprowadzone antropogenicznie: obce ekologicznie, zw szcza buk pospolity *Fagus sylvatica* oraz obce geograficznie (neofity), np. robinia akacjowa *Robinia pseudoacacia* i d b czerwony *Quercus rubra*. Podszyt tego lasu jest na og   słabo rozwini ty; g dzie Niedziedzie do c dobrze odnawia si  grab, słabiej: d b, lipa i in. Runo jest wyra nie zubo one pod wzg dem ilo ciowym i jako ciowym. Charakterystycznym zbiorowiskiem dla Lubiaszowa jest gr d typowy Tilio-Carpinetum typicum ze starodrzewem d bowym. Zajmuje on 9-hektarowy fragment łagodnego zbocza doliny Rosochy ze starym, prawie 220-letnim, drzewostanem d bu szypu kowego *Quercus robur*, wchodz cym w faz  rozpadu. Liczne, pot ne d by, stare graby, pojedyncze sosny i jod y rosn  na  yznym i  wie ym siedlisku. We florze zielonej stwierdzono, m.in.: przylaszczk  pospolit  *Hepatica nobilis*, wawrzynka wilczelisko *Daphne mezereum*, groszek wiosenny *Lathyrus vernus*, miodunk   m  *Pulmonaria obscura*, gajowca   łtego *Galeobdolon luteum*, wiechlin  gajow  *Poa nemoralis*, lili   łotog  w *Lilium martagon* oraz storczyki: podkolan bia y *Platanthera bifolia* i kruszczyk szerokolistny *Epipactis helleborine*. Zbiorowisko gr du niskiego Tilio-Carpinetum stachyetosum sylvaticae to  yzny, cienisty las z dominacj  d bu szypu kowego i sta  obecno ci  olszy oraz wyst puj cych domieszkowo: wi zu, jaworu, lipy, jesionu. W runie charakterystyczna jest obecno c geofit  wczesnowiosennych. Zbiorowisko to, zajmuj ce bogate gleby brunatne w strefie kontaktowej z bardzo dobrze uwilgotnionymi czarnymi ziemiami wykazuje zwi zki florystyczne z łegiem. Spo ród gatunk  runa wyr niaj cych ten podzesp   wyst puj  tu: czy ciec le ny *Stachys sylvatica*, kopytnik pospolity *Asarum europaeum*, czworolist pospolity *Paris quadrifolia*, zawilec   łty *Anemone ranunculoides* i jaskier kosmaty *Ranunculus lanuginosus*. Zbiorowisko gr du wysokiego zdegenerowanego z udzia em sosny w drzewostanie Tilio-Carpinetum calamagrostietosum deg. *Pinus sylvestris* wyst puje na siedliskach nieco mniej  yznych i lekko przesuszonych, gdzie panuj  gleby bielcowe w ciwe słabo zbielcowane, a g dzie Niedziedzie brunatne zdegradowane. Drzewostan twor  przede wszystkim d b (zwykle jest to mieszaniec *Quercus robur* x *Q. petraea*) i sosna, a w domieszce zwykle: grab, lipa, brzoza i osika, sporadycznie inne gatunki, w tym obce, np. d b czerwony i robinia. Pod wzg dem florystycznym i siedliskowym fitocenozy gr du wysokiego zb żone s  do ubogiej d browy  wiatlistej oraz do boru mieszanego sosnowo-d bowego. W ród gatunk  wsp lnych dla tych trzech zbiorowisk znajduj  si , m.in.: bor wka czarna *Vaccinium myrtillus*, papro  orlica pospolita *Pteridium aquilinum*, konwalia majowa *Convallaria majalis*, trzcinnik le ny *Calamagrostis arundinacea* i gorysz pag rkowy *Peucedanum oreoselinum*.

Reprezentatywno c A – doskona a. Siedlisko na terenie badanego obszaru odznacza si  typowym sk adem gatunkowym, zar wno warstwy drzewostanu, podszycia jak i runa.

Powierzchnia wzg dna – C. Powierzchnia siedliska w obszarze znajduje si  w przedziale poni ej 2 % powierzchni siedliska w kraju.

Stan zachowania A – doskona y. W tym: stopie  zachowania struktury II – dobrze zachowana, du a cz c powierzchni zachowana w spos b typowy z licznymi starodrzewami i martwym drewnem oraz r norodn  flor ; stopie  zachowania funkcji I – doskona e perspektywy, siedliska s  obj te ochron  rezerwatow , brak znaczcych zagro e  dla zachowania siedliska w obszarze.

Ocena og lna A – doskona a. Ocena reprezentatywno ci oraz stanu zachowania na poziomie A, a tak e og lny obraz siedliska w obszarze pozwalaj  na nadanie doskona ej oceny og lnej.

Jako c danych M – dane o przecie nej jako ci. Obszar po o ony na gruntach Las w Pa stwowch, siedliska le ne sklasyfikowane. Z obszaru pochod  publikacje naukowe dotycz ce rezerwatu przyrody „Lubiasz w” (materia y o charakterze archiwalnym). Dla rezerwatu przyrody „Lubiasz w”, pokrywaj cego si  granicami z obszarem Natura 2000, w roku 2009 sporz dzono dokumentacj  na potrzeby ustanowienia planu ochrony jednak badania by y ukierunkowane na zbiorowiska fitosocjologiczne rezerwatu, a nie siedliska przyrodnicze w rozumieniu przedmiot  ochrony obszar w Natura 2000. W ramach Monitoringu stanu przedmiot 

ochrony oraz monitoringu realizacji działań ochronnych na terenie obszaru Natura 2000 Lubiaszów w Puszczy Pilickiej PLH100026 w 2017 roku zostały wykonane badania terenowe tylko na wyznaczonych transektach.

*91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (*Salicetum albo-fragilis*, *Populetum albae*, *Alnenion glutinoso-incanae*) i olsy źródliskowe

Na żyznych glebach czarnych, na terasie zalewowej rzeczki Rosochy, rozwinęły się fitocenozy łęgowe reprezentujące zespół przystrumykowego łęgu jesionowo-olszowego *Fraxino-Alnetum*. Obok olszy czarnej *Alnus glutinosa* występuje tu: jesion wyniosły *Fraxinus excelsior*, olsza szara *Alnus incana*, czerecha zwyczajna *Padus avium*, osika *Populus tremula*, brzoza *Betula pendula*, sporadycznie lipa *Tilia cordata*, jawor *Acer pseudoplatanus*, świerk *Picea abies* i dąb szypułkowy *Quercus robur*. Podszyt i runo jest bujne i zwykle silnie zwarte. Podszyt tworzą najczęściej: czerecha zwyczajna *Padus avium*, kruszyna *Frangula alnus*, leszczyna *Coryllus avellana*, sporadycznie bez czarna *Sambucus nigra* i kalina koralowa *Viburnum opulus*. W runie, obok licznych geofitów wczesnowiosennych: zawilec gajowy *Anemone nemorosa*, zawilec żółty *Anemone ranunculoides*, kokoryczka wielokwiatowa *Polygonatum multiflorum*, ziarnopłon wiosenny *Ficaria verna* i in. na uwagę zasługuje wawrzynek wilczełyko *Daphne mezereum* i typowy dla łęgu gatunek paproci - wietlica samicza *Athyrium filix-femina*.

Reprezentatywność A – doskonała. Siedlisko na terenie obszaru wykształcone typowo z licznymi gatunkami charakterystycznymi oraz starodrzewem olszowym.

Powierzchnia względna C. Powierzchnia siedliska w obszarze znajduje się w przedziale poniżej 2% powierzchni siedliska w kraju.

Stan zachowania A – doskonały. W tym: stopień zachowania struktury I – doskonale zachowana, z uwagi na typowość wykształcenia fitocenozy oraz udział gatunków charakterystycznych.

Ocena ogólna C – znacząca. Stanowisko posiada stabilny areal jednak ze względu na niewielką powierzchnię nie stanowi istotnego znaczenia dla ochrony siedliska przyrodniczego w kraju.

Jakość danych M – dane o przeciętnej jakości. Obszar położony na gruntach Lasów Państwowych, siedliska leśne sklasyfikowane. Z obszaru pochodzą publikacje naukowe dotyczące rezerwatu przyrody „Lubiaszów” (materiały o charakterze archiwalnym). Dla rezerwatu przyrody „Lubiaszów”, pokrywającego się granicami z obszarem Natura 2000, w roku 2009 sporządzono dokumentację na potrzeby ustanowienia planu ochrony jednak badania były ukierunkowane na zbiorowiska fitytosocjologiczne rezerwatu, a nie siedliska przyrodnicze w rozumieniu przedmiotów ochrony obszarów Natura 2000. W ramach Monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu realizacji działań ochronnych na terenie obszaru Natura 2000 Lubiaszów w Puszczy Pilickiej PLH100026 w 2017 roku zostały wykonane badania terenowe tylko na wyznaczonych transektach.

Lilia złotogłów *Lilium martagon*

Gatunek podlega ochronie ścisłej. W skali Polski środkowej ma kategorię zagrożenia LR nt – o małym ryzyku zagrożenia, słabo zagrożony. Posiadane dane nie pozwalają na dokonanie szacunkowej oceny wielkości populacji, kategorię liczebności określono jako V – bardzo rzadkie. Generalnie w fitocenozach grądowych, głównie w podzespole typowym

o dynamicznie rozwijającym się drzewostanie lub warstwie krzewów, a więc w warunkach silnie zacieniających runo, gatunek ten wykazuje tendencję do zanikania. Przeważnie notowany jest pojedynczo lub po kilka osobników. Najpierw obserwuje się brak kwitnienia lub jest ono zdawkowe, zaczynają przeważać osobniki płonne. Następnie pokrój rośliny cechuje się coraz słabszą fizjonomią, aż do jej finalnego ustąpienia.

Naparstnica zwyczajna *Digitalis grandiflora*

Gatunek podlega ochronie częściowej. W skali Polski środkowej ma kategorię zagrożenia VU – narażone. Posiadane dane nie pozwalają na dokonanie szacunkowej oceny wielkości populacji, kategorię liczebności określono jako V – bardzo rzadkie. Oceniając na podstawie warunków siedliskowych, należy spodziewać się punktowego występowania.

Podkolan biały *Platanthera bifolia*

Gatunek podlega ochronie częściowej. W skali Polski środkowej ma kategorię zagrożenia VU – narażone. Posiadane dane nie pozwalają na dokonanie szacunkowej oceny wielkości populacji, kategorię liczebności określono jako V – bardzo rzadkie. Oceniając na podstawie warunków siedliskowych, należy spodziewać się punktowego występowania.

Biegacz bagienny *Carabus clatratus*

Gatunek podlega ochronie częściowej. W Polskiej czerwonej księdze zwierząt ma on kategorię EN – gatunki bardzo wysokiego ryzyka, silnie zagrożone. Znajduje się również na Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce, gdzie również ma kategorię EN - zagrożone. W obszarze odnotowano obecność tego gatunku, jednak brak dokładnych danych na temat liczebności i charakteru występowania, stąd nadano kategorię liczebności P – obecny.

Borowiec leśny *Nyctalus leisleri*

Gatunek podlega ochronie ścisłej. W Polskiej czerwonej księdze zwierząt ma on kategorię VU – gatunki wysokiego ryzyka, narażone na wyginięcie. Znajduje się również na Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce, gdzie również ma kategorię VU - narażone. W obszarze odnotowano obecność tego gatunku, jednak brak dokładnych danych na temat liczebności i charakteru występowania, stąd nadano kategorię liczebności P – obecny.

Mroczak posrebrzany *Vespertilio murinus*

Gatunek podlega ochronie ścisłej. W Polskiej czerwonej księdze zwierząt ma on kategorię LC – gatunki na razie nie zagrożone wymarciem. Znajduje się również na Czerwonej liście kręgowców Polski, gdzie posiada kategorię LC – gatunek najmniejszej troski. W obszarze odnotowano obecność tego gatunku, jednak brak dokładnych danych na temat liczebności i charakteru występowania, stąd nadano kategorię liczebności P – obecny.

Borowiec wielki *Nyctalus noctula*

Gatunek podlega ochronie ścisłej. Gatunek ściśle związany z siedliskiem leśnym – głównie jako miejsce rozrodu (dziuple), ale i miejsce letnich kryjówek, rzadziej jako miejsce zimowania. W obszarze odnotowano obecność tego gatunku, jednak brak dokładnych danych na temat liczebności i charakteru występowania, stąd nadano kategorię liczebności P – obecny.

A238 dzięcioł średni *Dendrocopos medius*

Gatunek podlega ochronie ścisłej. Został umieszczony w Zał. I Dyrektywy Ptasiej. Znajduje się również w Czerwonej Księdze Ptaków Ziemi Łódzkiej, gdzie ma kategorię VU – narażony. Związany ze świetlistymi dąbrowami i innymi lasami liściastymi. Obecność starych dębów i innych drzew liściastych jest kluczowa dla zachowania siedliska tego gatunku. W obszarze odnotowano obecność tego gatunku, jednak brak dokładnych danych na temat liczebności i charakteru występowania, stąd nadano kategorię liczebności P – obecny.

Wniosek o usunięcie siedliska 91P0 z listy przedmiotów ochrony oczekuje na akceptację Komisji Europejskiej.

4.3. Zagrożenia, presje i działania mające wpływ na obszar

Najważniejsze oddziaływania i działalność mające duży wpływ na obszar

Oddziaływania negatywne			
Poziom	Zagrożenia i presje [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnętrzne [i o b]
H	I01		b
H	K05.02		i
H	B07		o
Oddziaływania pozytywne			
Poziom	Działania, zarządzanie [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnętrzne [i o b]
L	X	X	i

Poziom: H = wysoki, M = sredni, L = niski.

Zanieczyszczenie: N = stosowanie azotu, P = stosowanie fosforu/fosforanów, A = stosowanie

kwasów/zakwaszanie, T = toksyczne chemikalia nieorganiczne,

O = toksyczne chemikalia organiczne, X = zanieczyszczenia mieszane.

i = wewnętrzne, o = zewnętrzne, b = jednocześnie.

4.4. Własność (opcjonalnie)

Typ		[%]
Publiczna	Krajowa/federalna	0
	Kraj	0
	związkowy/województwo	0
	Lokalna/gminna	0
	Inna publiczna	0
Własność łączna lub współwłasność		0
Prywatna		0
Nieznana		100
Suma		100

4.5. Dokumentacja (opcjonalnie)

1. Stopczyński M., Kurowski J.K., Kiedrzyński M., Witosławski P., Rączka G., Sugiero D., Rolniczak K., Wierzbicka A., Patalan I., Hejduk J. 2009. Plan Ochrony Rezerwatu „Lubiaszów”, Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”, „Hektor” Grzegorz Rączka, Poznań, Łódź, Brzeg2. Ruszczyńska J., Świączkowska J. 2017. Monitoring stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji działań ochronnych na terenie obszarów Natura 2000 w województwie łódzkim. Część III - Lubiaszów w Puszczy Pilickiej PLH100026. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

5. STATUS OCHRONY OBSZARU (OPCJONALNIE)

5.1. Istniejące formy ochrony na poziomie krajowym i regionalnym:

[Powrót](#)

Kod	Pokrycie [%]	Kod	Pokrycie [%]	Kod	Pokrycie [%]
PL02	99.95	PL03	100.0		

5.2. Powiązanie opisanego obszaru z innymi formami ochrony:

na poziomie krajowym lub regionalnym:

Kod rodzaju	Nazwa terenu	Rodzaj	Pokrycie [%]
PL03	Sulejowski Park Krajobrazowy	-	100.0
PL02	Lubiaszów	*	99.95

6. ZARZĄDZANIE OBSZAREM

6.1. Organ lub organy odpowiedzialne za zarządzanie obszarem:

[Powrót](#)

Organizacja:	Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi
Adres:	Polska Traugutta 25 90-113 Łódź
Adres e-mail:	sekretariat@lodz.rdos.gov.pl

6.2. Plan(-y) zarządzania:

Aktualny plan zarządzania istnieje:

☒ Tak	Nazwa: Zarządzenie Nr 22/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Lubiaszów” (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 102, poz. 863). Link: https://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2011/102/863/
☐ Nie, ale jest w przygotowaniu	
☐ Nie	

7. MAPA OBSZARU

[Powrót](#)

Nr ID INSPIRE:

PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH100026

Mapa załączona jako plik PDF w formacie elektronicznym (opcjonalnie)

☒ Tak ☐ Nie

Odniesienie lub odniesienia do oryginalnej mapy wykorzystanej przy digitalizacji granic elektronicznych (opcjonalnie)

--