



NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

dla obszarów specjalnej ochrony (OSO),
proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (pOZW),
obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW) oraz
specjalnych obszarów ochrony (SOO)

OBSZAR PLH100028
NAZWA
OBSZARU Polany Puszczy Bolimowskiej

ZAWARTOŚĆ

- [1. IDENTYFIKACJA OBSZARU](#)
- [2. POŁOŻENIE OBSZARU](#)
- [3. INFORMACJE PRZYRODNICZE](#)
- [4. OPIS OBSZARU](#)
- [5. STATUS OCHRONY OBSZARU](#)
- [6. POWIĄZANIA OBSZARU](#)
- [7. MAPA OBSZARU](#)

1. IDENTYFIKACJA OBSZARU

1.1. Typ B	1.2. Kod obszaru PLH100028	Powrót
---------------	-------------------------------	------------------------

1.3. Nazwa obszaru

Polany Puszczy Bolimowskiej

1.4. Data opracowania 2008-10	1.5. Data aktualizacji 2025-01
----------------------------------	-----------------------------------

1.6. Instytucja lub osoba przygotowująca wniosek:

Nazwisko/Organizacja:	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Adres:	Polska Al. Jerozolimskie 136 Warszawa 02-305
Adres e-mail:	kancelaria@gdos.gov.pl

Data zaproponowania obszaru jako OZW:	2009-10
Data zatwierdzenia obszaru jako OZW(*):	2012-01
Data objęcia obszaru ochroną SOO:	2023-09
Krajowe odniesienie prawne dla formy ochrony SOO:	rozp. MKiŚ z dn. 27 lipca 2023 r. w spr. soo Polany Puszczy Bolimowskiej (PLH100028)

Wyjaśnienia:	Korekta granic - 02.2023 r.
--------------	-----------------------------

2. POŁOŻENIE OBSZARU

2.1. Położenie centralnego punktu [wartości dziesiętne stopni]:

[Powrót](#)

Długość geograficzna
20.1058

Szerokość geograficzna
52.0387

2.2. Powierzchnia [ha]:
134.1

2.3. Obszar morski [%]
0.0

2.5. Kod i nazwa regionu administracyjnego

Kod poziomu NUTS 2

Nazwa regionu

PL11

Łódzkie

2.6. Region biogeograficzny

Kontynentalny (100.0
%)

3. INFORMACJE PRZYRODNICZE

3.1. Typy siedlisk przyrodniczych występujących na terenie obszaru i ocena znaczenia obszaru dla tych siedlisk:

[Powrót](#)

Typy siedlisk wymienione w załączniku I						Ocena obszaru			
Kod	PF	NP	Pokrycie [ha]	Jaskinie [liczba]	Jakość danych	A B C D	A B C		
						Reprezentatywność	Powierzchnia względna	Stan zachowania	Ocena ogólna
6410			26.72		M	A	C	B	B
6430			13.23		M	B	C	B	C
6510			72.77		M	A	C	B	B

- PF: dla typów siedlisk, do których mogą odnosić się zarówno formy priorytetowe, jak i niepriorytetowe (6210, 7130, 9430) należy wpisać „x” w kolumnie PF celem wskazania formy priorytetowej.
- NP: jeśli dany typ siedliska nie istnieje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Pokrycie: można wpisywać z dokładnością do wartości dziesiętnych.
- Jaskinie: w przypadku siedlisk typu 8310 i 8330 (jaskinie) należy podać liczbę jaskiń, jeśli nie są dostępne szacunkowe dane na temat powierzchni.
- Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. zgrubne dane szacunkowe).

3.2. Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 2009/147/WE i gatunki wymienione w załączniku II do dyrektywy 92/43/EEG oraz ocena znaczenia obszaru dla tych gatunków

Gatunki	Populacja na obszarze	Ocena obszaru
---------	-----------------------	---------------

Grupa	Kod	Nazwa naukowa	S	NP	Typ	Wielkość		Jednostka	Kategoria	Jakość danych	A B C D	A B C		
						Min	Maks		C R V P		Populacja	Stan zachowania	Izolacja	Ogólnie
P	1617	Angelica palustris			p	200	250	i	C	G	C	B	B	C
M	1308	Barbastella barbastellus			r				P	DD	D			
A	1188	Bombina bombina			p				P	DD	D			
M	1352	Canis lupus			p	2	8	i	V	M	D			
M	1337	Castor fiber			p	4	7	i	P	P	D			
I	1060	Lycaena dispar			p				P	DD	D			
M	1324	Myotis myotis			r				P	DD	D			
I	6179	Phengaris nausithous			p	500	1000	i	C	M	C	B	C	B
I	6177	Phengaris teleius			p	350	700	i	C	M	C	B	C	B
A	1166	Triturus cristatus			p				C	M	D			

- Grupa: A = płazy, B = ptaki, F = ryby, I = bezkręgowce, M = ssaki, P = rośliny, R = gady.
- S: jeśli dane o gatunku są szczególnie chronione i nie mogą być udostępnione publicznie, należy wpisać „tak”.
- NP: jeśli dany gatunek nie występuje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Typ: p = osiadłe, r = wydające potomstwo, c = przelotne, w = zimujące (w przypadku roślin i gatunków niemigrujących należy użyć terminu „osiadłe”).
- Jednostka: i = osobniki pojedyncze, p = pary lub inne jednostki według standardowego wykazu jednostek i kodów zgodnego ze sprawozdawczością na podstawie art. 12 i 17 (zob. [portal referencyjny](#)).
- Kategorie liczebności (kategoria): C = powszechne, R = rzadkie, V = bardzo rzadkie, P = obecne - wypełnić, jeżeli brak jest danych (DD), lub jako uzupełnienie informacji o wielkości populacji.
- Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. zgrubne dane szacunkowe); DD = brak danych (kategorię tę należy stosować wyłącznie, jeśli nie da się dokonać nawet zgrubnej oceny wielkości populacji - w takiej sytuacji można pozostawić puste pole dotyczące wielkości populacji, jednak pole „Kategorie liczebności” musi być wypełnione).

4. OPIS OBSZARU

4.1. Ogólna charakterystyka obszaru

[Powrót](#)

Klasa siedliska przyrodniczego	Pokrycie [%]
N16	28.09
N17	1.27
N19	30.23
N10	40.41
Ogółem pokrycia siedliska przyrodniczego	100

Dodatkowa charakterystyka obszaru:

Obszar położony jest na Równinie Łowicko-Błońskiej, mezoregionu wchodzącego w skład Niziny Środkowomazowieckiej. Składa się z czterech, starych, śródleśnych polan znajdujących się w Puszczy Bolimowskiej. Choć wszystkie z nich charakteryzuje płaskie ukształtowanie terenu to różnią się od siebie pochodzeniem i formacją. Dwie najcenniejsze polany mają pochodzenie autogeniczne (Strożyska, Siwica), a dwie - antropogeniczne (Olszówka, Bielawy). Na wszystkich polanach zaznacza się sukcesyjna presja roślinności zbiorowisk zaroślowych i leśnych. Jest to spowodowane obniżeniem poziomu wód gruntowych i wieloletnim brakiem tradycyjnego, ekstensywnego, kośnego użytkowania. Właściwe polanom śródleśne zbiorowiska łąk trzęślicowych w najlepszym stanie zachowały się na Polanie Strożyskiej (częściowo użytkowana łąkowo) oraz na niewielkich płatach na Polanie Siwicy (dzięki powtarzanym zabiegom ochrony czynnej – koszenie, usuwanie zakrzewień). Położenie polan wśród lasów Puszczy Bolimowskiej, w oddaleniu od siedzib ludzkich i ochrona w granicach Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, sprawia że antropopresja jest tu niewielka, co sprzyja zachowaniu bogatej różnorodności biologicznej i może dodatkowo wzmacniać efekt ochrony czynnej.

4.2. Jakość i znaczenie

Na terenie centralnej Polski Obszar Natura 2000 Polany Puszczy Bolimowskiej PLH100028 odznacza się bardzo wysoką wartością przyrodniczą, naukową i dydaktyczną. Na uwagę zasługują tu zwłaszcza łąki trzęślicowe – siedlisko 6410, z zestawem gatunków charakterystycznych: kosaćca syberyjskiego, goryczki wąskolistnej, goździka pysznego, nasięźrzała pospolitego. W obszarze znajdują się płaty łąk trzęślicowych najlepiej zachowane w centralnej Polsce. Na Polanach Bielawy i Strożyskiej występują płaty siedliska 6510 – niżowych i górskich świeżych łąk użytkowanych ekstensywnie (*Arrhenatherion elatioris*). Na dwóch Polanach (Siwica, Strożyska) stwierdzono występowanie unikalnego w regionie Polski środkowej staroduba łąkowego. Także na tych dwóch polanach stwierdzane są dobrze zachowane populacje motyli: modraszka telejusa oraz modraszka nausitousa – przedmiotów ochrony obszaru.

Najpoważniejszym zagrożeniem dla przedmiotów ochrony obszaru jest zaniechanie użytkowania części polan co powoduje ich zarastanie. Dla wszystkich przedmiotów ochrony (z wyjątkiem proponowanego do usunięcia siedliska 6430) w obszarze prowadzone są działania ochronne polegające na koszeniu roślinności zielnej i usuwaniu krzewów. Ze względu na skomplikowaną strukturę własności na najcenniejszej polanie Strożyskiej prowadzenie działań ochronnych jest znacząco utrudnione.

6410 Zmienne wilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)

Siedlisko 6410 w obszarze Natura 2000 Polany Puszczy Bolimowskiej występuje na 3 z 4 polan: Strożyskiej, Siwicy i Olszówce i reprezentuje podtyp 6410-1 łąki olszewnikowo-trzęślicowe *Selino carvifoliae*-Molinietum. Najlepiej zachowane płaty siedliska występują na Polanie Stróżyskiej i południowej części Polany Siwicy. Głównym zagrożeniem dla siedliska jest zarastanie [23].

Powierzchnia siedliska w obszarze: 7,6 ha. Obecnie część jednego z płatów siedliska znajduje się poza granicami obszaru Natura 2000. Korekta granicy obszaru przekazana do KE 01.2022 naprawia ten błąd, po akceptacji zmiany granicy powierzchnia siedliska w obszarze wyniesie 7,86 ha.

Reprezentatywność A – doskonała. Na podstawie wyników prac terenowych uznano, że siedlisko 6410 w obszarze jest wykształcone doskonale – biorąc pod uwagę specyfikę położenia – w dużej odległości od pozostałych miejsc występowania siedliska w Polsce.

Powierzchnia względna C. Powierzchnia siedliska w obszarze znajduje się w przedziale poniżej – 2% powierzchni siedliska w kraju.

Ocena stanu zachowania B – dobry stan zachowania. Stanowiska siedliska 6410 odnotowano na trzech spośród czterech polan obszaru. Są to najlepiej zachowane stanowiska siedliska w centralnej Polsce.

Ocena ogólna B – dobra. Stan siedliska w obszarze należy uznać za dobry, powierzchnia siedliska jest największa spośród wszystkich obszarów Natura 2000 w centralnej Polsce.

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (*Arrhenatherion elatioris*)

Powierzchnia siedliska w obszarze: 2,85 ha

Łąki należące do związku Arrhenatherion stwierdzono na wszystkich polanach ostoi, jednak nie wszystkie płaty można uznać za siedlisko 6510. Najlepiej wykształcone płaty, które uznano za siedlisko przyrodnicze występują na Polanie Bielawy i w południowej części Polany Strożyska. Wszystkie płaty charakteryzują się jednak niewłaściwym stopniem zachowania przede wszystkim ze względu na niewielką liczbę gatunków typowych [23].

Reprezentatywność B – dobra. Na podstawie wyników prac terenowych uznano, że siedlisko 6510 w obszarze jest wykształcone dobrze – biorąc pod uwagę specyfikę położenia – jednak skład gatunkowy na stanowisku odbiega od stanu wzorcowego (niska liczba gatunków).

Powierzchnia względna C. Powierzchnia siedliska w obszarze zajmuje poniżej 2% powierzchni siedliska w kraju.

Ocena stanu zachowania B, dobry stan zachowania. Stanowiska siedliska 6510 odnotowano na dwóch spośród czterech polan obszaru.

Ocena ogólna C – znacząca. Stan siedliska w obszarze należy uznać za znaczący w skali kraju.

1617 Starodub łąkowy *Ostericum palustre*

Starodub łąkowy podawany jest z Polany Siwica od początku lat 80 XX wieku [1]. Podczas badań w roku 2010 nie został on odnaleziony [22]. W 2019 r. na Polanie Siwica stwierdzono dwa duże (2,1 ha i 1,8 ha) stanowiska o łącznej liczebności 234 osobniki, występuje skupieniach liczących kilka/kilkanaście pędów. Na stanowisku Siwica 1 starodub występuje w płatach ziółorośli krwawnicowo-wiązówkowych *Lythro-Filipenduletum*, rozwijających się na zarastającej łące trzęślicowej, natomiast na stanowisku Siwica 2 w szuwarze wielkoturzycowym z dominującymi *Carex acutiformis* i *Carex appropinquata*. Głównym zagrożeniem dla tego przedmiotu ochrony jest ekspansja gatunków rodzimych (przede wszystkim trzcinnika piaskowego *Calamagrostis epigejos*, ostrożenia polnego *Cirsium arvense* i wiązówki błotnej *Filipendula ulmaria*) oraz obecność gatunku obcego – nawłoci kanadyjskiej *Solidago canadensis* [23].

Populacja C. Uznano, że, liczebność gatunku na stanowisku mieści się w przedziale do 2% populacji krajowej.

Stan zachowania B – dobry. Gatunek występuje na dwóch polanach, duża liczba osobników kwitnąca. Na Polanie Siwica prowadzone są działania ochronne, oczyszczanie powierzchni z drzew i krzewów, cykliczne koszenie.

Izolacja B – populacja nie izolowana, ale występująca na peryferiach zasięgu.

Ocena ogólna C – znacząca. Stan stanowisk gatunku w obszarze należy uznać za dobry, powierzchnia siedlisk gatunku jest największa spośród wszystkich obszarów Natura 2000 w centralnej Polsce.

6177 Modraszek telejus *Phengaris (Maculinea) telejus*

Gatunek podawany z obszaru w licznych publikacjach. Funkcjonowanie gatunku w obszarze potwierdza prowadzony na stanowisku krajowego monitoringu. Najliczniejsza populacja występuje na Polanie Strożyskiej [23], ale obecny jest także na Siwicy [28, 27].

Populacja – C liczebność populacji w obszarze mieści się w przedziale $2\% \geq p > 0\%$. Uznano, że jest znacząca jako przedmiot ochrony. W centralnej Polsce występuje niewiele obszarów z optymalnymi warunkami siedliskowymi łąkami trzęślicowymi, z licznymi krwiściągami lekarskimi.

Stan zachowania - B dobry. Obecny stan zbadania obszaru potwierdził obecność optymalnych siedlisk dla

gatunku, na Polanie Strożyskiej oraz Polanie Siwica. Na obydwu polanych są prowadzone cyklicznie wykaszania (Strożyska użytkownicy prywatnie, Siwica – ochrona czynna w ramach działań RDOŚ w Łodzi). Izolacja - C populacja nieizolowana w obrębie rozległego obszaru występowania. Siedliska odpowiednie dla gatunku w centralnej Polsce występują w dużym rozproszeniu.
Ocena ogólna - B znacząca. Na podstawie badań terenowych oceny siedlisk oraz wcześniejszych danych o występowaniu gatunku w obszarze uznano, że Polany Bolimowskiej mają znaczenie ponadregionalne dla populacji krajowej gatunku.
Jakość danych G – wysoka. Stanowiska są podane cyklicznym oceną liczebności, prowadzony jest na nich Państwowy Monitoring Środowiska.

6179 Modraszek nausitous Phengaris (Maculinea) nausitous

Gatunek podawany z obszaru w licznych publikacjach. Funkcjonowanie gatunku w obszarze potwierdza prowadzony na stanowisku krajowy monitoring. Najliczniejsza populacja występuje na Polanie Strożyskiej [23], ale obecny jest także na Siwicy [28, 27].

Populacja – C liczebność populacji w obszarze mieści się w przedziale $2\% \geq p > 0\%$. Uznano, że jest znacząca jako przedmiot ochrony. W centralnej Polsce występuje niewiele obszarów z optymalnymi warunkami siedliskowymi: łąkami trzęślicowymi, z licznymi krwiściągami lekarskimi.

Stan zachowania - B dobry. Obecny stan zbadania obszaru potwierdził obecność optymalnych siedlisk dla gatunku, na Polanie Strożyskiej oraz Polanie Siwica. Na obydwu polanych są prowadzone cyklicznie wykaszania (Strożyska użytkownicy prywatnie, Siwica – ochrona czynna w ramach działań RDOŚ w Łodzi). Izolacja - C populacja nieizolowana w obrębie rozległego obszaru występowania. Siedliska odpowiednie dla gatunku w centralnej Polsce występują w dużym rozproszeniu.
Ocena ogólna - B znacząca. Na podstawie badań terenowych oceny siedlisk oraz wcześniejszych danych o występowaniu gatunku w obszarze uznano, że Polany Bolimowskiej mają znaczenie ponadregionalne dla populacji krajowej gatunku.

6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)

Ocena reprezentatywności D – nieistotne. Wniosek o usunięcie siedliska z listy przedmiotów ochrony oczekuje na akceptację.

Ze względu na brak wody płynącej trudno jest w obszarze wykazywać ziołorośla nadrzeczne. Niewielkie płyty o charakterze welonowym obecne są przede wszystkim na Polanie Siwica, wokół znajdujących się tam dołów potorfowych i rozwijają się w postaci wąskich, często przerywanych pasów. Są one utworzone przez chmiel zwyczajny *Humulus lupulus* i kielisznik zaroślowy *Calystegia sepium*. Pnącza te porastają przeważnie krzewy dzikiego bzu czarnego *Sambucus nigra* lub wierzby. Obok typowych pnączy przytulia czepna *Galium aparine* i pokrzywa zwyczajna *Urtica dioica* tworzą zwarte płyty, na których porasta kielisznik. Wymagają miejsc stale, ale tylko okresowo zalewanych. Tych nitrofilnych zbiorowisk, utworzonych przede wszystkim przez pokrzywę z niewielkim udziałem kielisznika, nie można uznać na siedlisko przyrodnicze 6430. Z całą pewnością nie należy jednak traktować płatów takich nitrofilnych ziołorośli jako cel ochrony, zwłaszcza w sytuacji, kiedy pozostałe siedliska i gatunki (6410, 6510 i starodub łąkowy) wymagają regularnego koszenia, które z kolei eliminuje ziołorośla nitrofilne. Powierzchnia płatów nitrofilnych zbiorowisk nawiązujących do siedliska 6430 wynosi około 2,46 ha [23, 30].

1060 Czerwończyk nieparek *Lycaena dispar*

Gatunek występuje w obszarze dość powszechnie. Spotykany jest właściwie we wszystkich wilgotniejszych półnaturalnych zbiorowiskach otwartych, w których rosną potencjalne rośliny żywicielskie (fioletka poszarpana, ostrożeń polny, różne gatunki szczawi) [21, 27].
Ocena populacji D – gatunek występuje jednak nie jest przedmiotem ochrony.

1188 kumak nizinny *Bombina bombina*

Na polanie Siwica obserwowano nieliczne osobniki wydające głos godowy. Zbiorniki (doły potorfowe) znajdujące się na terenie polany Siwicy są miejscem rozrodu niewielkiej populacji tego gatunku [21]. Pojedyncze osobniki stwierdzono także na Polanie Strożyskiej [25].
Ocena populacji D – gatunek występuje jednak nie jest przedmiotem ochrony.

1308 mopek zachodni *Barbastella barbastellus*

W lipcu 2003 r. w pobliżu zbiornika przeciwpożarowego, tuż przy polanie Siwicy została schwytana młoda samica tego gatunku. Z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo polana może być wykorzystywana jako miejsce żerowania gatunku [21]. Mopek zachodni obserwowany był także w 2017 r. przy Polanie Strożyska wraz z innymi gatunkami nietoperzy w ramach obozu chiropterologicznego [29] oraz odnotowany w roku 2022 w budkach szczelinowych założonych w obszarze w ramach projektu Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Nietoperzy [29].

Ocena populacji D – gatunek występuje jednak nie jest przedmiotem ochrony.

1324 nocek duży *Myotis myotis*

Podobnie jak w przypadku gatunku 1308 w lipcu 2003 r. stwierdzono występowanie samicy nad zbiornikiem przeciwpożarowym przy granicy z obszarem [21]. Gatunek stwierdzony (przy granicy obszaru) także w trakcie nasłuchów detektorowych [26].

Ocena populacji D – gatunek występuje jednak nie jest przedmiotem ochrony.

1337 bóbr europejski *Castor fiber*

W obszarze obecność bobrów obserwowana jest na polanach Olszówka i Siwica [23, 30].

Ocena populacji D – gatunek występuje jednak nie jest przedmiotem ochrony.

1283 gniewosz plamisty *Coronella austriaca*

Z Puszczy Bolimowskiej podawany z różnych lokalizacji [29]. Dla gatunku wykonywane są też działania z ochrony czynnej – tworzenie schronów kamiennych przez Bolimowski Park Krajobrazowy. W bezpośrednim sąsiedztwie Polany Siwica obserwowany wielokrotnie w Chyleńcu [24].

Ocena populacji D – gatunek występuje jednak nie jest przedmiotem ochrony.

1352 wilk *Canis lupus*

Od kilku lat gatunek regularnie jest obserwowany w obszarze, jego obecność potwierdzono także za pomocą fotopułapek [29]. Kompleks leśny Puszczy Bolimowskiej wraz z niezabudowanymi terenami przyległymi stanowi rewir łowiecki jednej rodziny tego gatunku ssaka [27], w związku z czym przyjęto, że jego liczebność mieści się w przedziale 2-8 osobników (w obszarze Natura 2000, jak i całym kompleksie leśnym).

4.3. Zagrożenia, presje i działania mające wpływ na obszar

Najważniejsze oddziaływania i działalność mające duży wpływ na obszar

Oddziaływania negatywne			
Poziom	Zagrożenia i presje [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnętrzne [i o b]
H	A03.03		i
L	A03.01		i
H	K02		i
H	I02		i
M	K02.01		i
Oddziaływania pozytywne			
Poziom	Działania, zarządzanie	Zanieczyszczenie (opcjonalnie)	Wewnętrzne / zewnętrzne

	[kod]	[kod]	[i o b]
H	A03		i

Poziom: H = wysoki, M = średni, L = niski.

Zanieczyszczenie: N = stosowanie azotu, P = stosowanie fosforu/fosforanów, A = stosowanie

kwasów/zakwaszanie, T = toksyczne chemikalia nieorganiczne,

O = toksyczne chemikalia organiczne, X = zanieczyszczenia mieszane.

i = wewnętrzne, o = zewnętrzne, b = jednocześnie.

4.4. Własność (opcjonalnie)

Typ		[%]
Publiczna	Krajowa/federalna	0
	Kraj	0
	związkowy/województwo	0
	Lokalna/gminna	0
	Inna publiczna	0
Własność łączna lub współwłasność		0
Prywatna		0
Nieznana		100
Suma		100

4.5. Dokumentacja (opcjonalnie)

1 Pisarek W. 1984 Szata roślinna polan Puszczy Bolimowskiej Maszynopis pracy magisterskiej, Katedra Botaniki UŁ. Łódź 1-572 Olaczek R., Pisarek, W. 1987 Projekt rezerwatu łąkowo - torfowiskowego "Polany Puszczy Bolimowskiej" Wojewódzki Konserwator Przyrody w Skierniewicach. Maszynopis 2-153 Pisarek W. 1989. Flora polan Puszczy Bolimowskiej i jej aspekt zoologiczny. Fragm. Flor. Geobot. 34(1-2): 81-100.4 Kucharski L. 1995 Rezerwat łąkowo-torfowiskowy "Polana Siwica" Dokumentacja projektowa. Katedra Botaniki UŁ, ss: 19 5 Jakubowska-Gabara J. i in. 1996. Plan Ochrony Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Faza II. Środowisko biotyczne. Szata roślinna. Towarzystwo Urbanistów Polskich-Zarząd Główny, Warszawa. 6 Markowski J. i in. 1996. Plan Ochrony Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Faza II. Środowisko biotyczne. Gospodarka łowiecka. Towarzystwo Urbanistów Polskich-Zarząd Główny, Warszawa. 7 Kucharski L., Pisarek, W. 1998 Polany Puszczy Bolimowskiej Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, Skierniewice 1-388 Czyżewska K. i in. 1999. Roślinność Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Monographiae botanicae 85, Łódź.9 Kucharski L., Pisarek, W. 1999 Roślinność łąk Bolimowskiego Parku Krajobrazowego Roślinność Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Monogr. Bot. 85 139 - 17610 Hejduk J. 1999 Kręgowce lądowe Polany Siwica. Zoologiczna ścieżka dydaktyczna Skierniewice, ss. 50 plansze barwne 11 Olaczek R. 1999 Puszcza Bolimowska - przeszłość i przyszłość Roślinność Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Monogr. Bot., Łódź 5-2512 Jakubowska-Gabara J., Markowski J. 2002. Bolimowski Park Krajobrazowy. Monografia przyrodnicza. Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej, Łódź. 13 Kurowski J. K. (red.). 2002. Parki krajobrazowe Polski Środkowej. Katedra Geobot. i Ekol. Roś. UŁ, Łódź. 14 Jakubowska-Gabara J., Kucharski L., Warcholińska, A. 2003 Vascular plants, bryophytes, lichens and lichenicolous fungi in the Bolimów Landscape Park Monographiae Botanicae, vol.92, 2003, Łódź15 Gajęcka K. 2004 Chiropterofauna Bolimowskiego Parku Krajobrazowego Praca magisterska, Kat. Dyd. Biol. i Bad. Różn. Biol., UŁ, Łódź 16 Rąkowski G. i in. 2004. Parki Krajobrazowe w Polsce. Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa.17 Falkowski M., Falkowska, K., Niewczas, E. 2006 Operat Ochrony szaty roślinnej. Plan Ochrony Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. NFOŚ, Warszawa 3-16918 Klimaszewski K., Mazurkiewicz A., Cygan, J.P. 2006 Operat ochrony zwierząt. Plan Ochrony Bolimowskiego Parku Krajobrazowego NFOŚ, Warszawa 1-7619 Traut-Seliga A. 2006 Problemy zachowania ekosystemów łąkowych metodą czynnej ochrony Rozpr. dokt. Kat. Ochrony Przyrody, UŁ, Łódź 3-25120 Kowalczyk J.K., Kurzac T. 2007 Chronione, zagrożone i rzadkie gatunki owadów w rezerwacie Polana Siwica w Bolimowski Parku Krajobrazowym Chrońmy Przyr. Ojcz. 63(4) 60-6921 Traut-Seliga A., Kowalczyk, J.K., Kurzac, T., Hejduk, J., Seliga, A. 2007 Studium botaniczno-faunistyczne dla rezerwatu przyrody "Polana Siwica". Skierniewic-Łódź.22 Lesner B., Sieradzki J., Michalska-Hejduk D., Jaskuła R., Sobczyk R., Brylak Ł., Lesner

E. 2019. Dokumentacja Projektu Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 Polany Puszczy Bolimowskiej PLH100025, w województwie łódzkim. Łódź.23 Maniakowski M. 2019. Informacja ustna. Dane niepublikowane.24 BPK. 2020. Bolimowski Park Krajobrazowy. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Informacja ustna.25 Pawenta 2021. Informacja ustna. Dane niepublikowane.26 Semaniuk K, Cmoch M., Dmoch A., Janiszewski T., Lesner B., Maniakowski M., Pawenta W., Sękiewicz M., Sieradzki J., Sobczyk R., Szymankiewicz K., Wardecki Ł., Zięba G. 2022. Budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Warszawa Zachodnia — CPK – Łódź Niciarniana. Ekspertyza przyrodnicza dla odcinka węzeł CPK-Łódź. Część tekstowa. Warszawa.27 Sobczyk R. 2022. Informacja ustna. Dane niepublikowane.28 BPK 2022. Bolimowski Park Krajobrazowy. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Informacja ustna. Dane niepublikowane.

5. STATUS OCHRONY OBSZARU (OPCJONALNIE)

[Powrót](#)

5.1. Istniejące formy ochrony na poziomie krajowym i regionalnym:

Kod	Pokrycie [%]	Kod	Pokrycie [%]	Kod	Pokrycie [%]
PL02	50.58	PL03	100.0	PL04	30.26

5.2. Powiązanie opisanego obszaru z innymi formami ochrony:

na poziomie krajowym lub regionalnym:

Kod rodzaju	Nazwa terenu	Rodzaj	Pokrycie [%]
PL03	Bolimowski Park Krajobrazowy	-	100.0
PL02	Polana Siwica	*	50.58
PL04	Bolimowsko-Radziejowicki z doliną Środkowej Rawki (woj. łódzkie)	*	30.26

6. ZARZĄDZANIE OBSZAREM

[Powrót](#)

6.1. Organ lub organy odpowiedzialne za zarządzanie obszarem:

Organizacja:	Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi
Adres:	Polska Traugutta 25 90-113 Łódź
Adres e-mail:	sekretariat@lodz.rdos.gov.pl

6.2. Plan(-y) zarządzania:

Aktualny plan zarządzania istnieje:

☒	Tak	Nazwa: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Polany Puszczy Bolimowskiej PLH100028 Link: http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2020/7102/
		Nazwa: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 7 lutego 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Polany Puszczy Bolimowskiej PLH100028 Link: https://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2024/1158/

☐ Nie, ale jest w przygotowaniu

☐ Nie

7. MAPA OBSZARU

[Powrót](#)

Nr ID INSPIRE:

PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH100028

Mapa załączona jako plik PDF w formacie elektronicznym (opcjonalnie)

☒ Tak ☐ Nie

Odniesienie lub odniesienia do oryginalnej mapy wykorzystanej przy digitalizacji granic elektronicznych (opcjonalnie)