



NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

dla obszarów specjalnej ochrony (OSO),
proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (pOZW),
obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW) oraz
specjalnych obszarów ochrony (SOO)

OBSZAR PLH120077
NAZWA
OBSZARU Rudniańskie Modraszki - Kajasówka

ZAWARTOŚĆ

- [1. IDENTYFIKACJA OBSZARU](#)
- [2. POŁOŻENIE OBSZARU](#)
- [3. INFORMACJE PRZYRODNICZE](#)
- [4. OPIS OBSZARU](#)
- [5. STATUS OCHRONY OBSZARU](#)
- [6. POWIĄZANIA OBSZARU](#)
- [7. MAPA OBSZARU](#)

1. IDENTYFIKACJA OBSZARU

1.1. Typ B	1.2. Kod obszaru PLH120077	Powrót
---------------	-------------------------------	------------------------

1.3. Nazwa obszaru

Rudniańskie Modraszki - Kajasówka

1.4. Data opracowania 2008-09	1.5. Data aktualizacji 2025-07
----------------------------------	-----------------------------------

1.6. Instytucja lub osoba przygotowująca wniosek:

Nazwisko/Organizacja:	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Adres:	Polska Al. Jerozolimskie 136 Warszawa 02-305
Adres e-mail:	kancelaria@gdos.gov.pl

Data zaproponowania obszaru jako OZW:	2009-10
Data zatwierdzenia obszaru jako OZW(*):	2012-01
Data objęcia obszaru ochroną SOO:	2023-09
Krajowe odniesienie prawne dla formy ochrony SOO:	rozp. MKiŚ z dn. 3 sierpnia 2023 r. w spr. soo Rudniańskie Modraszki - Kajasówka (PLH120077)

Wyjaśnienia:	Korekta granic - 02.2023 r.
--------------	-----------------------------

2. POŁOŻENIE OBSZARU

2.1. Położenie centralnego punktu [wartości dziesiętne stopni]:

[Powrót](#)

Długość geograficzna
19.6679

Szerokość geograficzna
50.0202

2.2. Powierzchnia [ha]:
424.97

2.3. Obszar morski [%]
0.0

2.5. Kod i nazwa regionu administracyjnego

Kod poziomu NUTS 2

Nazwa regionu

PL21

Małopolskie

2.6. Region biogeograficzny

Kontynentalny (100.0
%)

3. INFORMACJE PRZYRODNICZE

3.1. Typy siedlisk przyrodniczych występujących na terenie obszaru i ocena znaczenia obszaru dla tych siedlisk:

[Powrót](#)

Typy siedlisk wymienione w załączniku I						Ocena obszaru			
Kod	PF	NP	Pokrycie [ha]	Jaskinie [liczba]	Jakość danych	A B C D	A B C		
						Reprezentatywność	Powierzchnia względna	Stan zachowania	Ocena ogólna
6210			3.72		M	B	C	C	C
6230			0.17		G	D			
6410			29.6		G	A	C	C	B
6510			7.18		G	C	C	C	C

- PF: dla typów siedlisk, do których mogą odnosić się zarówno formy priorytetowe, jak i niepriorytetowe (6210, 7130, 9430) należy wpisać „x” w kolumnie PF celem wskazania formy priorytetowej.
- NP: jeśli dany typ siedliska nie istnieje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Pokrycie: można wpisywać z dokładnością do wartości dziesiętnych.
- Jaskinie: w przypadku siedlisk typu 8310 i 8330 (jaskinie) należy podać liczbę jaskiń, jeśli nie są dostępne szacunkowe dane na temat powierzchni.
- Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. zgrubne dane szacunkowe).

3.2. Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 2009/147/WE i gatunki wymienione w załączniku II do dyrektywy 92/43/EEG oraz ocena znaczenia obszaru dla tych gatunków

--	--	--

Gatunki					Populacja na obszarze					Ocena obszaru			
Grupa	Kod	Nazwa naukowa	S	NP	Typ	Wielkość		Jednostka	Kategoria	Jakość danych	A B C D	A B C	
						Min	Maks		C R V P		Populacja	Stan zachowania	Izolacja
M	1337	Castor fiber			p	8	12	i	P	M	D		
I	1060	Lycaena dispar			p	50	150	i	P	M	C	B	C
I	4038	Lycaena helle			p					DD	D		
I	6179	Phengaris nausithous			p	40	60	i	P	G	C	C	C
I	6177	Phengaris teleus			p	50	100	i	P	M	C	C	C

- Grupa: A = płazy, B = ptaki, F = ryby, I = bezkręgowce, M = ssaki, P = rośliny, R = gady.
- S: jeśli dane o gatunku są szczególnie chronione i nie mogą być udostępnione publicznie, należy wpisać „tak”.
- NP: jeśli dany gatunek nie występuje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Typ: p = osiadłe, r = wydające potomstwo, c = przelotne, w = zimujące (w przypadku roślin i gatunków niemigrujących należy użyć terminu „osiadłe”).
- Jednostka: i = osobniki pojedyncze, p = pary lub inne jednostki według standardowego wykazu jednostek i kodów zgodnego ze sprawozdawczością na podstawie art. 12 i 17 (zob. [portal referencyjny](#)).
- Kategorie liczebności (kategoria): C = powszechne, R = rzadkie, V = bardzo rzadkie, P = obecne - wypełnić, jeżeli brak jest danych (DD), lub jako uzupełnienie informacji o wielkości populacji.
- Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. zgrubne dane szacunkowe); DD = brak danych (kategorię tę należy stosować wyłącznie, jeśli nie da się dokonać nawet zgrubnej oceny wielkości populacji - w takiej sytuacji można pozostawić puste pole dotyczące wielkości populacji, jednak pole „Kategorie liczebności” musi być wypełnione).

4. OPIS OBSZARU

4.1. Ogólna charakterystyka obszaru

[Powrót](#)

Klasa siedliska przyrodniczego	Pokrycie [%]
N17	3.42
N10	28.66
N16	0.78
N23	0.01
N12	67.12
Ogółem pokrycia siedliska przyrodniczego	100

Dodatkowa charakterystyka obszaru:

Obszar, położony jest w mezoregionach Garb Tenczyński (341.34 — część północna) i Obniżenie Cholerzyńskie (512.32 — część centralna i południowa). Obszar ma w przewadze charakter rolniczy. Znaczący udział terenów zadrzewionych (niewielkie płąty lasów, szpalery i skupiska drzew) zaznacza się w południowo-zachodniej jego części oraz w części północnej (zręb tektoniczny Garbu Tenczyńskiego). Analizowany obszar jest odwadniany systemem połączonych, częściowo niedrożnych rowów,

odprowadzających wody w kierunku południowym do cieku Jesionka, który uchodzi z kolei do potoku Rudno (dopływu Wisły), już poza granicami obszaru. Wspomniane rowy są w kilku miejscach podpiętrzone przez bobry.

Obszar jest wyniesiony od 219,1 do 320,1 m n.p.m.. Południowa część ma charakter równiny, część centralna jest w przewadze nieznacznie nachylona w kierunku południowym. Jedynie w rejonie północnej granicy obszaru zbocza są bardzo strome lub urwiste, nachylone ku południowemu wschodowi.

Pokrywa glebowa nawiązuje do budowy geologicznej. Dno doliny Jesionki i innych cieków pokrywają gleby glejowe wytworzone na holocenijskich namulach i piaskach. Są one w przewadze traktowane jako użytki zielone. Tereny wyniesione ponad dna dolin, których podłoże geologiczne stanowią plejstoceńskie piaski terasów nadzalewowych, pokryte są czarnymi ziemiami zdegradowanymi. Inne typy i podtypy gleb — gleby brunatne i gleby brunatne wylugowane, wytworzone na piaskach wodnolodowcowych, pokrywają lokalnie fragmenty północnej części analizowanego terenu. Mają one nieznaczny udział w pokrywie glebowej i użytkowane są zazwyczaj jako grunty orne z racji lepszej przydatności rolniczej. Wąski pas terenu w północnej części obszaru (w granicach rezerwatu przyrody Kajasówka) zbudowany jest z górnourajskich wapieni i pokryty jest rędzinami

Szata roślinna ma mozaikowaty charakter. Roślinność obszaru tworzą liczne, zazwyczaj niewielkie płaty zbiorowisk o różnym charakterze — od gruntów ornych, przez zróżnicowane pod względem intensywności użytkowania i stopnia uwilgotnienia płaty łąk kośnych, po roślinność nie podlegającą aktualnie użytkowaniu, reprezentującą różne etapy sukcesji wtórnej dawnych pól i łąk — ugory opanowane przez gatunki ruderalne, czasem obcego pochodzenia, skupiska jeżyn, zarośla tarniny, zagajniki olszowe i brzozowe. W miejscach podtopionych rozwijają się dość rozległe płaty szuwarów. Fragment zrębu tektonicznego Garbu Tenczyńskiego w północnej części obszaru porośnięty jest lasem, a w obrębie urwistych zboczy i odsłoniętych skał zarastającymi murawami kserotermicznymi.

Mozaikowość szaty roślinnej nawiązuje do rozdrobnienia podziału ewidencyjnego gruntów (mającego związek ze złożoną strukturą własności).

4.2. Jakość i znaczenie

Przedmiotami ochrony w obszarze są:

A) trzy typy siedlisk przyrodniczych:

- 6120 — murawy kserotermiczne Festuco-Brometea, a
- 6410 — zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion);
- 6510 — niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris);

B) trzy gatunki motyli:

- 1060 — czerwończyk nieparek *Lycaena dispar*,
- 6177 — modraszek telejus *Phengaris teleius*,
- 6179 — modraszek nausithous *Phengaris nausithous*.

Ponadto, poniższe siedliska przyrodnicze i gatunki zwierząt nie stanowią przedmiotów ochrony ze względu na nieistotną reprezentatywność czy też nieznaczającą wielkość populacji:

- 6230 — niżowe i górskie murawy bliźniczkowe (Nardion — płaty bogate florystycznie);
- 1337 — bóbr europejski *Castor fiber*);
- 4038 — czerwończyk fioletek *Lycaena helle*.

Ponadto na uwagę zasługuje występowanie w obszarze gatunków roślin i zwierząt wymienionych w Polskich Czerwonych Listach takich jak: kosaciec syberyjski (*Iris sibirica*), goryczka wąskolistna (*Gentiana pneumonanthe*), mieczyk dachówkowaty (*Gladiolus imbricatus*), świerszcz polny (*Gryllus campestris*), skalnik driada (*Minois dryas*), długoskrzydłak sierposz (*Phaneroptera falcata*).

6210 Murawy kserotermiczne Festuco-Brometea

Murawy kserotermiczne w obszarze Rudniańskie Modraszki – Kajasówka występują na terenie rezerwatu przyrody Kajasówka, gdzie tworzą mozaikę ciepłolubnych zbiorowisk roślinnych i nie występują w postaci ciągłych, dużych płatów.

Jakość danych: M – dane o przeciętnej jakości.

Reprezentatywność: B – dobra – w płatach muraw występują gatunki charakterystyczne (wskaźnik oceniony na FV), jednak udział każdego z gatunków jest niewielki.

Powierzchnia wyznaczonego płatu mozaiki ciepłolubnych zbiorowisk roślinnych, w obrębie którego występuje siedlisko 6210 wynosi 3,72 ha, co stanowi mniej niż 2 % krajowych zasobów siedliska w kontynentalnym regionie biogeograficznym – ocena powierzchni względnej: C.

Stan zachowania: C – średni – stopień zachowania struktury: III (średnio zachowana – ze względu na dużą

ekspansję krzewów i podrostu drzew) oraz zachowanie funkcji II (dobre perspektywy) przy możliwości odtworzenia: II – możliwe przy średnim nakładzie środków.

Biorąc pod uwagę dobrą reprezentatywność (B), ocenę powierzchni względnej (C) oraz średni stan zachowania (C), nadano siedlisku ocenę ogólną C.

6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)

Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe to bogate w gatunki, wilgotne lub okresowo suche łąki z udziałem trzęślicy modrej *Molinia caerulea*, rozwijające się na glebach organogenicznych i mineralnych, od silnie zakwaszonych do zasadowych i o zmiennym poziomie wody gruntowej. Łąki te są zróżnicowane florystycznie i należą do najcenniejszych półnaturalnych zbiorowisk. W obszarze Natura 2000 Rudniańskie Modraszki – Kajasówka płaty łąk trzęślicowych rozmieszczone są równomiernie na terenach otwartych w całym obszarze. Jakość danych: G - dane pochodzące z inwentaryzacji przyrodniczej.

Reprezentatywność siedliska przyrodniczego w obszarze oceniono na A (doskonałą — ocenę nadano biorąc pod uwagę dużą reprezentację gatunków charakterystycznych dla siedliska w sensie fitosocjologicznym oraz wysoką zgodność z przewodnikami metodycznymi).

Względna powierzchnia. Zasoby krajowe siedliska przyrodniczego 6410 w kontynentalnym regionie biogeograficznym wynoszą 20000 ha co oznacza, że w obszarze Natura 2000 Rudniańskie Modraszki — Kajasówka PLH120077 znajduje się mniej niż 2 % (29,6 ha) – ocena powierzchni względnej: C.

Stan zachowania: Stopień zachowania struktury siedliska przyrodniczego określono na III – średnio zachowana lub częściowo zdegradowana (większość łąk tego typu podlega negatywnym oddziaływaniom takim jak: podtopienia, brak użytkowania, zbyt intensywne użytkowanie, inwazja gatunków obcych), stopień zachowania funkcji określono na III – średnie lub niekorzystne perspektywy, w związku z czym nadano ocenę stanu zachowania C (znacząca).

Ocena ogólna: Biorąc pod uwagę doskonałą reprezentatywność (A), średni stan zachowania siedliska (C) oraz niewielki udział w zasobach krajowych siedliska (kryterium względnej powierzchni - ocena C), ocena ogólna znaczenia obszaru dla ochrony siedliska przyrodniczego w Polsce została określona jako dobra (B).

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (*Arrhenatherion elatioris*)

Łąki łąkowe są bogatymi florystycznie, wysokoprodukcyjnymi, wielokośnymi zbiorowiskami rozwijającymi się na niżu lub niższych położeniach w górach. Cechuje je udział takich traw, jak: rajgras wyniosły (*Arrhenatherum elatius*), kupkówka pospolita (*Dactylis glomerata*), stokłosa miękka (*Bromus hordaceus*), konietlica łąkowa (*Trisetum flavescens*). W runi znaczny udział mają wysokie byliny z rodziny baldaszkowatych: marchew zwyczajna (*Daucus carota*), barszcz zwyczajny (*Heracleum sphondylium*), pasternak zwyczajny (*Pastinaca sativa*), biedrzyca wielka (*Pimpinella major*). W obszarze Natura 2000 Rudniańskie Modraszki – Kajasówka płaty łąk świeżych rozmieszczone są równomiernie na terenach otwartych w całym obszarze

Jakość danych: G — dane pochodzące z inwentaryzacji przyrodniczych.

Reprezentatywność siedliska przyrodniczego w obszarze: C – znacząca — ocenę nadano biorąc pod uwagę niezbyt dużą reprezentację gatunków charakterystycznych dla siedliska w sensie fitosocjologicznym.

Względna powierzchnia – krajowe zasoby siedliska przyrodniczego 6510 w kontynentalnym regionie biogeograficznym wynoszą 732500 ha co oznacza, że w obszarze Natura 2000 Rudniańskie Modraszki — Kajasówka PLH120077 znajduje się znikomy odsetek zasobów krajowych (7,18 ha, stąd ocena kryterium względnej powierzchni: C).

Stan zachowania: Stopień zachowania struktury siedliska przyrodniczego określono na III – średnio zachowana lub częściowo zdegradowana (większość łąk tego typu ma charakter porolny, co decyduje o małej reprezentatywności, a ponadto łąki reprezentujące siedlisko przyrodnicze 6510 często opanowane są przez gatunki inwazyjne i ekspansywne), stopień zachowania funkcji określono na III – średnie lub niekorzystne perspektywy, w związku z czym nadano ocenę stanu zachowania C (znacząca).

Ocena ogólna: Biorąc pod uwagę znaczącą reprezentatywność (C) znaczący stan zachowania siedliska (C) oraz niewielki udział w zasobach krajowych siedliska (kryterium względnej powierzchni - ocena C), ocena ogólna znaczenia obszaru dla ochrony siedliska przyrodniczego w Polsce została określona jako znacząca (C).

6230 Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie)

Płaty siedliska występują w obszarze na niewielkiej powierzchni (0,17 ha) w mozaice ze zbiorowiskami zaroślowymi i ksenosporadycznymi (opanowanymi przez gatunki roślin obcego pochodzenia) i charakteryzują się znikomą reprezentacją gatunków charakterystycznych oraz ubóstwem gatunkowym.

Powierzchnia siedliska 6230 w obszarze ma znikomy udział w krajowych zasobach tego siedliska i jest nieznacząca dla ochrony siedliska w skali kraju (ocena: D).

1060 Czerwończyk nieparek (*Lycaena dispar*)

Gatunek motyla preferujący wilgotne łąki, torfowiska niskie, doliny rzeczne, a także bardziej suche siedliska z obecnym szczawiem *Rumex ssp.*, na których składa jaja.

Jakość danych: M – dane pochodzące z inwentaryzacji uzupełnione szacunkami.

Populacja: Wielkość populacji w obszarze oszacowano na 50-150 osobników. Wielkość krajowej populacji gatunku w kontynentalnym regionie biogeograficznym została wskazana na 7500 komórek siatki 1 x 1 km, stwierdzone stanowiska w obszarze obejmują 5 komórki siatki – ocena populacji: C.

Stan zachowania: B – dobry – stopień zachowania cech siedliska gatunku oceniono na II – elementy dobrze zachowane (zasoby roślin żywicielskich larw motyla – szczawiów *Rumex sp.* są niewielkie. Szczawie mają mały udział w budowaniu poszczególnych zbiorowisk roślinnych, w tym zbiorowisk reprezentujących chronione w obszarze siedliska przyrodnicze, choć są szeroko rozpowszechnione).

Izolacja. Populacja czerwończyka nieparka jest nieizolowana w obrębie rozległego obszaru występowania, stąd ocena izolacji – C.

Ocena ogólna: Biorąc pod uwagę ocenę „C” populacji, ocenę „B” stanu zachowania siedliska i ocenę „C” izolacji stanowisk na tle zasięgu gatunku, ocena ogólna znaczenia obszaru Rudniańskie Modraszki – Kajasówka PLH120077 dla ochrony czerwończyka nieparka w Polsce została określona jako znacząca (C).

6177 Modraszek telejus (*Phengaris teleius*)

Gatunek motyla o dużych wymaganiach siedliskowych: do zamknięcia cyklu życiowego potrzebuje zarówno rośliny żywicielskiej krwiściągę lekarskiego (*Sanguisorba officinalis*), na którym składa jaja i gdzie początkowo żerują larwy, jak i mrówek gospodarzy z rodzaju *Myrmica*, w gniazdach których postaci larwalne motyli odżywiają się larwami mrówczymi i spędzają zimę. Gatunek charakterystyczny dla łąk trzęślicowych i świeżych oraz torfowisk niskich.

Jakość danych: M – dane pochodzące z inwentaryzacji uzupełnione szacunkami.

Populacja: wielkość populacji gatunku w obszarze oszacowano na 50-100 os. Wielkość krajowej populacji gatunku w kontynentalnym regionie biogeograficznym została wskazana na 200 komórek siatki 1 x 1 km, stwierdzone stanowiska w obszarze obejmują 4 komórki siatki, co stanowi 2% zasobów krajowych, wielkość krajowej populacji jest jednak zapewne niedoszacowana, stąd ocena populacji: C.

Stan zachowania: C – średni - stopień zachowania cech siedliska gatunku oceniono na III – elementy średnio zachowane lub częściowo zdegradowane, co koresponduje z oceną stopnia zachowania struktury siedliska przyrodniczego 6410 – zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (*Molinion*), będącego siedliskiem modraszka telejusa, ze względu na stały udział krwiściągu lekarskiego *Sanguisorba officinalis* – gatunku żywicielskiego larw motyla. Stopień możliwości odtworzenia oceniono na II – możliwe przy średnim nakładzie środków.

Izolacja: Populacja modraszka telejusa jest nieizolowana w obrębie rozległego obszaru występowania, stąd ocena izolacji – C.

Ocena ogólna: Biorąc pod uwagę ocenę „C” populacji, ocenę „C” stanu zachowania siedliska i ocenę „C” izolacji stanowisk na tle zasięgu gatunku, ocena ogólna znaczenia obszaru Rudniańskie Modraszki – Kajasówka PLH120077 dla ochrony modraszka telejusa w Polsce została określona jako znacząca (C).

6179 Modraszek nausithous (*Phengaris nausithous*)

Gatunek ten podobnie jak modraszek telejus związany jest z wilgotnymi łąkami, torfowiskami niskimi i torfowiskami węglanowymi, jednak preferuje tereny bardziej zakrzaczone i nie preferuje miejsc całkowicie odkrytych. Obecność tego gatunku uzależniona jest również od występowania rośliny pokarmowej - krwiściągę lekarskiego i odpowiedniego gatunku mrówki.

Jakość danych: M – dane pochodzące z inwentaryzacji uzupełnione szacunkami.

Populacja: wielkość populacji gatunku w obszarze oszacowano na 40-60 os. Wielkość krajowej populacji gatunku w kontynentalnym regionie biogeograficznym została wskazana na 283 komórki siatki 1 x 1 km, stwierdzone stanowiska w obszarze obejmują 3 komórki siatki – ocena populacji: C.

Stan zachowania: C – średni - stopień zachowania cech siedliska gatunku oceniono na III – elementy średnio zachowane lub częściowo zdegradowane, co koresponduje z oceną stopnia zachowania struktury siedliska przyrodniczego 6410 – zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (*Molinion*), będącego siedliskiem modraszka nausithousa, ze względu na stały udział krwiściągu lekarskiego *Sanguisorba officinalis* – gatunku żywicielskiego larw motyla. Stopień możliwości odtworzenia oceniono na II – możliwe przy średnim

nakładzie środków.

Izolacja: Populacja modraszka nausithousa jest nieizolowana w obrębie rozległego obszaru występowania, stąd ocena izolacji — C.

Ocena ogólna: Biorąc pod uwagę ocenę „C” populacji, ocenę „C” stanu zachowania siedliska i ocenę „C” izolacji stanowisk na tle zasięgu gatunku, ocena ogólna znaczenia obszaru Rudniańskie Modraszki — Kajasówka PLH120077 dla ochrony modraszka nausithousa w Polsce została określona jako znacząca (C).

1337 Bóbr europejski (Castor fiber)

W obszarze Natura 2000 bóbr zasiedla 2 stanowiska, a szacowana liczebność jego populacji w obszarze wynosi 8-12 osobników, została zatem uznana za nieistotną z punktu widzenia ochrony zasobów krajowych (ocena D).

4038 Czerwończyk fioletek (Lycaena helle)

Czerwończyk fioletek nie został wykazany w trakcie badań terenowych zarówno w granicach Rudniańskiego Parku Krajobrazowego, jak i poza nim. Ze względu na potencjalne występowanie gatunku i historyczne dane dotyczące jego występowania w obszarze, gatunek oceniony na ocenę D – populacja nieistotna.

4.3. Zagrożenia, presje i działania mające wpływ na obszar

Najważniejsze oddziaływania i działalność mające duży wpływ na obszar

Oddziaływania negatywne			
Poziom	Zagrożenia i presje [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnętrzne [i o b]
H	A03.03		i
H	K02.01		i
M	I01		b
M	I02		b
M	A02		i
H	A03.01		i
H	A02.03		i
L	A08		b
M	B01		b
M	E01.03		b
L	F03.02.01		o
H	J02.01		b
Oddziaływania pozytywne			
Poziom	Działania, zarządzanie [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnętrzne [i o b]
H	A03		i

Poziom: H = wysoki, M = średni, L = niski.

Zanieczyszczenie: N = stosowanie azotu, P = stosowanie fosforu/fosforanów, A = stosowanie kwasów/zakwaszanie, T = toksyczne chemikalia nieorganiczne,

O = toksyczne chemikalia organiczne, X = zanieczyszczenia mieszane.

i = wewnętrzne, o = zewnętrzne, b = jednoczesne.

4.4. Własność (opcjonalnie)

Typ	[%]
Krajowa/federalna	0

Publiczna	Kraj	0
	związkowy/województwo	0
	Lokalna/gminna	0
	Inna publiczna	0
Własność łączna lub współwłasność		0
Prywatna		0
Nieznana		100
Suma		100

4.5. Dokumentacja (opcjonalnie)

1. Kołodziej M., Ociepa A.M., Wieczorek K. 2014. Dokumentacja do projektu planu ochrony Rudniańskiego Parku Krajobrazowego Tom VII Dokumentacja zakresu Planu Zadań Ochronnych obszaru Rudniańskie Modraszki-Kajasówka PLH 120077. Krameko Sp. z o.o.2. Nejfeld P., Matuszek-Nejfeld M. 2018. Ekspertyza fitysocjologiczna i entomologiczna dla części obszaru Natura 2000 Rudniańskie Modraszki – Kajasówka PLH120077 poza granicami Rudniańskiego Parku Krajobrazowego.3. Kulpiński K., Tyc A. 2020. Wyniki monitoringu siedlisk przyrodniczych w rezerwach przyrody „Biała Góra”, „Białowodzka Góra Nad Dunajcem”, „Dolina Klucz wody”, „Dolina Mnikowska”, „Dolina Szklarki”, „Kajasówka”, „Skała Kmity”, „Skałki Przegorzalskie”, „Skołczanka”, „Wąwóz Bolechowicki”, „Dolina Eliaszków”, „Panieńska Góra”, „Kwiatówka”.4. Kata K. 2023. Raport z wykonania ekspertyzy lepidopterologicznej dla obszarów Natura 2000 Rudno PLH120058 i Rudniańskie Modraszki - Kajasówka PLH120077 w granicach Rudniańskiego Parku Krajobrazowego. RDOŚ w Krakowie.

5. STATUS OCHRONY OBSZARU (OPCJONALNIE)

5.1. Istniejące formy ochrony na poziomie krajowym i regionalnym:

[Powrót](#)

Kod	Pokrycie [%]	Kod	Pokrycie [%]	Kod	Pokrycie [%]
PL03	25.49	PL02	3.0		

5.2. Powiązanie opisanego obszaru z innymi formami ochrony:

na poziomie krajowym lub regionalnym:

Kod rodzaju	Nazwa terenu	Rodzaj	Pokrycie [%]
PL02	Kajasówka	*	3.0
PL03	Rudniański Park Krajobrazowy	*	25.49
PL03	Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy	*	0.0

6. ZARZĄDZANIE OBSZAREM

6.1. Organ lub organy odpowiedzialne za zarządzanie obszarem:

[Powrót](#)

Organizacja:	Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
Adres:	Polska Mogilska 25 31-542 Kraków
Adres e-mail:	sekretariat@krakow.rdos.gov.pl

6.2. Plan(-y) zarządzania:

Aktualny plan zarządzania istnieje:

☒	Tak	Nazwa: Uchwała Nr XLI/631/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Rudniańskiego Parku Krajobrazowego uwzględniającego zakres planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Rudno PLH120058 i Rudniańskie modraszki – Kajasówka PLH120077 Link: http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/WDU_K/2017/6180/akt.pdf Nazwa: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Rudniańskie Modraszki-Kajasówka PLH120077 Link: http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/WDU_K/2020/8814/akt.pdf
☐	Nie, ale jest w przygotowaniu	
☐	Nie	

7. MAPA OBSZARU

[Powrót](#)

Nr ID INSPIRE:

PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH120077

Mapa załączona jako plik PDF w formacie elektronicznym (opcjonalnie)

☒ Tak ☐ Nie

Odniesienie lub odniesienia do oryginalnej mapy wykorzystanej przy digitalizacji granic elektronicznych (opcjonalnie)

--