



NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

dla obszarów specjalnej ochrony (OSO),
proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (pOZW),
obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW) oraz
specjalnych obszarów ochrony (SOO)

OBSZAR PLH140003
NAZWA
OBSZARU Dąbrowa Radziejowska

ZAWARTOŚĆ

- [1. IDENTYFIKACJA OBSZARU](#)
- [2. POŁOŻENIE OBSZARU](#)
- [3. INFORMACJE PRZYRODNICZE](#)
- [4. OPIS OBSZARU](#)
- [5. STATUS OCHRONY OBSZARU](#)
- [6. POWIĄZANIA OBSZARU](#)
- [7. MAPA OBSZARU](#)

1. IDENTYFIKACJA OBSZARU

1.1. Typ B	1.2. Kod obszaru PLH140003	Powrót
---------------	-------------------------------	------------------------

1.3. Nazwa obszaru

Dąbrowa Radziejowska

1.4. Data opracowania 2002-10	1.5. Data aktualizacji 2024-03
----------------------------------	-----------------------------------

1.6. Instytucja lub osoba przygotowująca wniosek:

Nazwisko/Organizacja:	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Adres:	Polska Al. Jerozolimskie 136 Warszawa 02-305
Adres e-mail:	kancelaria@gdos.gov.pl

Data zaproponowania obszaru jako OZW:	2004-04
Data zatwierdzenia obszaru jako OZW(*):	2008-01
Data objęcia obszaru ochroną SOO:	2022-06
Krajowe odniesienie prawne dla formy ochrony SOO:	rozp. MKiŚ z dn. 28 kwietnia 2022 r. w spr. soo Dąbrowa Radziejowska (PLH140003)

Wyjaśnienia:	Zmniejszenie pow - 11.2019 r.
--------------	-------------------------------

2. POŁOŻENIE OBSZARU

2.1. Położenie centralnego punktu [wartości dziesiętne stopni]:

[Powrót](#)

Długość geograficzna
20.5417

Szerokość geograficzna
52.0198

2.2. Powierzchnia [ha]:
51.79

2.3. Obszar morski [%]
0.0

2.5. Kod i nazwa regionu administracyjnego

Kod poziomu NUTS 2 Nazwa regionu

PL12	Mazowieckie
------	-------------

2.6. Region biogeograficzny

Kontynentalny (100.0
%)

3. INFORMACJE PRZYRODNICZE

3.1. Typy siedlisk przyrodniczych występujących na terenie obszaru i ocena znaczenia obszaru dla tych siedlisk:

[Powrót](#)

Typy siedlisk wymienione w załączniku I						Ocena obszaru			
Kod	PF	NP	Pokrycie [ha]	Jaskinie [liczba]	Jakość danych	A B C D	A B C		
						Reprezentatywność	Powierzchnia względna	Stan zachowania	Ocena ogólna
9170			40.9		G	D			
9110			1.61		G	C	C	C	C

- PF: dla typów siedlisk, do których mogą odnosić się zarówno formy priorytetowe, jak i niepriorytetowe (6210, 7130, 9430) należy wpisać „x” w kolumnie PF celem wskazania formy priorytetowej.
- NP: jeśli dany typ siedliska nie istnieje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Pokrycie: można wpisywać z dokładnością do wartości dziesiętnych.
- Jaskinie: w przypadku siedlisk typu 8310 i 8330 (jaskinie) należy podać liczbę jaskiń, jeśli nie są dostępne szacunkowe dane na temat powierzchni.
- Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. zgrubne dane szacunkowe).

4. OPIS OBSZARU

4.1. Ogólna charakterystyka obszaru

[Powrót](#)

Klasa siedliska przyrodniczego	Pokrycie [%]
N17	1.9
N16	96.33
N19	1.75
N12	0.02
Ogółem pokrycia siedliska przyrodniczego	100

Dodatkowa charakterystyka obszaru:

Uroczysko Radziejowice znajduje się na północnych krańcach Wysoczyzny Rawskiej, mezoregionu wchodzącego w skład makroregionu Wzniesień Południowomazowieckich. Całą powierzchnię obszaru zajmują ekosystemy leśne o dość jednorodnej strukturze przestrzennej. Płaski, równy teren oraz jednorodne podłoże glebowe powodują, że zróżnicowanie występujących tu zbiorowisk roślinnych jest nieznaczne. Występują tu dwa leśne siedliska przyrodnicze, wymienione w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej i ujęte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 13 kwietnia 2010 r. Są to: grądy subkontynentalne 9170 i ciepłolubne dąbrowy 91I0. Grądy powierzchniowo dominują na tym terenie, zajmując 80% jego powierzchni. Najładniej wykształcone siedliska grądowe znajdują się w północnej i centralnej części. Są to lasy składające się z dębu bezszypułkowego z niewielkim udziałem dębu szypułkowego i brzozy brodawkowatej. Na części powierzchni występuje zwarte II piętro, składające się głównie z graba z niewielkim udziałem lipy drobnolistnej. Podszyt jest rozwinięty w różnym stopniu. Tam gdzie II piętro jest silnie i zwarte jest go mało, natomiast w miejscach gdzie II piętro jest słabo rozwinięte podszyt składa się z leszczyny, czerechmy pospolitej, graba, dębów, lipy, jarzębu, kruszyny, trzmieliny. Siedliska grądowe charakteryzują się korzystnymi tendencjami rozwojowymi, wykazującymi tendencje regeneracyjne, głównie wskutek bujnego rozwoju dolnych warstw lasu. Siedlisko ciepłolubnych dąbrów występuje na terenie obszaru w podtypie 91I0-1 świetlista dąbrowa. Płaty, które jednoznacznie można zaliczyć do tego siedliska znajdują się w centralnej części obszaru, gdzie występuje: *Galium boreale*, *Melittis melissophyllum*, *Peucedanum oreoselinum*, *Campanula persicifolia*, *Astragalus glycyphyllos*, *Hypericum montanum*, *Sedum maximum*, *Calamintha vulgaris*. Drzewostan jest tu budowany przez dęby bezszypułkowe z domieszką innych gatunków liściastych.

4.2. Jakość i znaczenie

91I0 Ciepłolubne dąbrowy (*Quercetalia pubescenti petraeae*)
Siedlisko występuje na terenie rezerwatu w podtypie 91I0-1 świetlista dąbrowa. Płat, który jednoznacznie można zaliczyć do tego siedliska znajduje się w centralnej części rezerwatu. Stwierdzono tu występowanie gatunków typowych dla tego siedliska: *Galium boreale*, *Melittis melissophyllum*, *Peucedanum oreoselinum*, *Campanula persicifolia*, *Astragalus glycyphyllos*, *Hypericum montanum*, *Sedum maximum*, *Calamintha vulgaris*. Występują tu również dwa gatunki storczyków: *Platanthera bifolia* i *Epipactis helleborine*. Drzewostan jest budowany przez około 100 letnie dęby bezszypułkowe z domieszką dębu szypułkowego, brzozy brodawkowatej i osiki. Górne piętro jest silnie zwarte a niewielki dostęp światła do dolnych warstw drzewostanów jest zapewniony przez brak drugiego piętra. Bujnie rozwinięty jest natomiast podszyt, złożony z kruszyny, czerechmy pospolitej, leszczyny, graba, jarzębu pospolitego, trzmieliny brodawkowatej i pospolitej a także podrostów i nalotów dębu. Aktualny stan siedliska jest niezadowalający. Znaczne zacienienie dna lasu nie sprzyja rozwojowi grupy gatunków światłolubnych oraz zachowaniu struktury przestrzennej właściwej dla świetlistej dąbrowy. Zbyt duże zwarcie drzewostanu dębowego jest częściowo niwelowane przez udział brzozy i osiki, które poprzez bardziej ażurową koronę dopuszczają do dna lasu więcej światła. Znacznym zagrożeniem jest natomiast rozwijające się młode pokolenie dębu i podszyt, głównie grab i czerechma pospolita. Pierwotnie oszacowany areal świetlistych dąbrów (Jakubowska Gabara 1985) obejmował cały obszar rezerwatu. Dąbrowy te były wówczas w różnym stanie zachowania; wyszczególniono postać mszystą, postać z *Festuca ovina*, postać z *Carpinus betulus*, postać zakrzewioną, postać zubożoną i postać typową. Cechy pozwalające na taki podział są do dziś widoczne w terenie, aczkolwiek nastąpiły zasadnicze zmiany w roślinności. Płaty przed ponad 25 laty identyfikowane jako postaci: zakrzewiona, z grabem i typowa, obecnie zajmują zbiorowiska bez wątplenia grądowe, z niewielkim tylko udziałem gatunków ciepłolubnych takich jak: *Convallaria majalis*, *Melittis mellisophyllum*. Płaty określane, jako postać mszysta obecnie również charakteryzują się obfitym występowaniem mszaków, zwłaszcza *Leucobryum glaucum* w runie. Płaty zaliczone poprzednio do świetlistej dąbrowy, postaci z *Festuca ovina*,

obecnie także zdominowane są przez ten gatunek trawy. Nie są to jednak świetliste dąbrowy, ale trawiaste postaci kwaśnych dąbrów.

Biorąc powyższe pod uwagę reprezentatywność siedliska, powierzchnię względną ($2\% \geq p > 0\%$) i stan zachowania oceniono na poziomie średnim – C. Ocenę ogólną określono na podstawie ocen częściowych i nadano jej wartość znaczącą – C.

Przedstawione oceny wynikają z danych dokumentacji do planu ochrony dla rezerwatu Dąbrowa Radziejowska obejmującego zakres planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 [6].

9170 grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

Grądy powierzchniowo dominują na terenie rezerwatu, zajmując 80% jego powierzchni. Najładniej wykształcone siedliska grądowe znajdują się w północnej i centralnej części rezerwatu. Są to lasy składające się z dębu bezszypułkowego z niewielkim udziałem dębu szypułkowego, brzozy brodawkowatej. Na części powierzchni występuje zwarte II piętro, budowane głównie przez graba z niewielkim udziałem lipy drobnolistnej. Podszyt jest rozwinięty w różnym stopniu: tam gdzie II piętro jest silnie i zwarte jest go mało, natomiast w miejscach gdzie II piętro jest słabo rozwinięte podszyt, składający się z leszczyny, czerechy pospolitej, graba, dębów, lipy, jarzębu, kruszyny, trzmieliny, występuje obficie. Runo wykształcone jest albo w postaci typowej z *Anemone nemorosa*, *Hepatica nobilis*, *Stellaria holostea*, *Melica nutans*, *Maianthemum bifolium*. W uboższych postaciach siedliska 9170 w runie spotykane są elementy borowe jak np. *Vaccinium myrtillus*, *Pteridium aquilinum*, *Trientalis europaea* itp. Siedliska grądów charakteryzują się stałym, lecz niewielkim udziałem gatunków ciepłolubnych dąbrów. Są to głównie: *Melittis mellisophyllum*, *Convallaria majalis*, *Clinopodium vulgare*. Reprezentatywność siedliska oceniona została jako nieznacząca, w związku z czym nadano mu ocenę – D. Siedlisko jest chronione jako przedmiot ochrony w 330 obszarach Natura 2000 na terenie Polski, z czego 17 obszarów znajduje się w granicach woj. mazowieckiego (powierzchnia siedliska pokrywa ok. 0,47 % powierzchni pokrycia tym typem siedliska w kraju). Niniejsze wskazuje na wystarczającą reprezentację siedliska w ujęciu krajowym.

Przedstawione oceny wynikają z danych dokumentacji do planu ochrony dla rezerwatu Dąbrowa Radziejowska obejmującego zakres planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 [6]

4.3. Zagrożenia, presje i działania mające wpływ na obszar

Najważniejsze oddziaływania i działalność mające duży wpływ na obszar

Oddziaływania negatywne			
Poziom	Zagrożenia i presje [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnętrzne [i o b]
H	K02.01		i
H	K04.01		i
H	I01		b
L	J03.02		o
M	C01.01		o
M	E01		o
M	E06		o
Oddziaływania pozytywne			
Poziom	Działania, zarządzanie [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnętrzne [i o b]

Poziom: H = wysoki, M = średni, L = niski.

Zanieczyszczenie: N = stosowanie azotu, P = stosowanie fosforu/fosforanów, A = stosowanie

kwasów/zakwaszanie, T = toksyczne chemikalia nieorganiczne,
 O = toksyczne chemikalia organiczne, X = zanieczyszczenia mieszane.
 i = wewnętrzne, o = zewnętrzne, b = jednocześnie.

4.4. Własność (opcjonalnie)

Typ		[%]
Publiczna	Krajowa/federalna	0
	Kraj	0
	związkowy/województwo	0
	Lokalna/gminna	0
	Inna publiczna	0
Własność łączna lub współwłasność		0
Prywatna		0
Nieznana		100
Suma		100

4.5. Dokumentacja (opcjonalnie)

1. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Radomiu. Plan gospodarczy rezerwatu Dąbrowa Radziejowska na okres od 1.01.1989 do 31.12.1998.2. DEGÓRSKI M. 1990. Warunki siedliskowe kateny ekosystemów leśnych na Wysoczyźnie Rawskiej (ze szczególnym uwzględnieniem dynamiki wodno-troficznych właściwości gleb). Dokumentacja Geograficzna, 5-6: 7-206.3. JAKUBOWSKA-GABARA J. 1981. Dokumentacja rezerwatu leśnego Dąbrowa w Radziejowicach. Mscr.4. JAKUBOWSKA-GABARA J. 1985. Szata roślinna uroczyska Radziejowice. Acta Universitatis Lodzensis, Folia Botanica, 6: 3-34.5. JAKUBOWSKA-GABARA J. 1985. Zespoły leśne Wysoczyzny Rawskiej i ich antropogeniczne zniekształcenia. Monogr. Bot. 65: 3–148.6. Dokumentacja do planu ochrony dla rezerwatu Dąbrowa Radziejowska obejmującego zakres planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000

5. STATUS OCHRONY OBSZARU (OPCJONALNIE)

[Powrót](#)

5.1. Istniejące formy ochrony na poziomie krajowym i regionalnym:

Kod	Pokrycie [%]	Kod	Pokrycie [%]	Kod	Pokrycie [%]
PL02	100.0	PL04	100.0		

5.2. Powiązanie opisanego obszaru z innymi formami ochrony:

na poziomie krajowym lub regionalnym:

Kod rodzaju	Nazwa terenu	Rodzaj	Pokrycie [%]
PL02	Dąbrowa Radziejowska	*	100.0
PL04	Bolimowsko-Radziejowicki z doliną Środkowej Rawki (woj. mazowieckie)	-	100.0

6. ZARZĄDZANIE OBSZAREM

6.1. Organ lub organy odpowiedzialne za zarządzanie obszarem:

Organizacja:	Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
Adres:	Polska Henryka Sienkiewicza 3 00-015 Warszawa
Adres e-mail:	sekretariat@warszawa.rdos.gov.pl

6.2. Plan(-y) zarządzania:

Aktualny plan zarządzania istnieje:

☒	Tak	Nazwa: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie rezerwatu przyrody Dąbrowa Radziejowska Link: https://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2016/7244/
		Nazwa: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 17 października 2016 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Dąbrowa Radziejowska Link: https://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2016/8993/
☐	Nie, ale jest w przygotowaniu	
☐	Nie	

7. MAPA OBSZARU

Nr ID INSPIRE:

PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH140003

Mapa załączona jako plik PDF w formacie elektronicznym (opcjonalnie)

☒ Tak ☐ Nie

Odniesienie lub odniesienia do oryginalnej mapy wykorzystanej przy digitalizacji granic elektronicznych (opcjonalnie)

--