



NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

dla obszarów specjalnej ochrony (OSO),
proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (pOZW),
obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW) oraz
specjalnych obszarów ochrony (SOO)

OBSZAR PLH140055
NAZWA
OBSZARU Łąki Soleckie

ZAWARTOŚĆ

- [1. IDENTYFIKACJA OBSZARU](#)
- [2. POŁOŻENIE OBSZARU](#)
- [3. INFORMACJE PRZYRODNICZE](#)
- [4. OPIS OBSZARU](#)
- [5. STATUS OCHRONY OBSZARU](#)
- [6. POWIĄZANIA OBSZARU](#)
- [7. MAPA OBSZARU](#)

1. IDENTYFIKACJA OBSZARU

1.1. Typ B	1.2. Kod obszaru PLH140055	Powrót
---------------	-------------------------------	------------------------

1.3. Nazwa obszaru

Łąki Soleckie

1.4. Data opracowania 2008-02	1.5. Data aktualizacji 2024-11
----------------------------------	-----------------------------------

1.6. Instytucja lub osoba przygotowująca wniosek:

Nazwisko/Organizacja:	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Adres:	Polska Al. Jerozolimskie 136 Warszawa 02-305
Adres e-mail:	kancelaria@gdos.gov.pl

Data zaproponowania obszaru jako OZW:	2009-10
Data zatwierdzenia obszaru jako OZW(*):	2012-01
Data objęcia obszaru ochroną SOO:	2023-10
Krajowe odniesienie prawne dla formy ochrony SOO:	rozp. MKiŚ z dn. 11 września 2023 r. w spr. soo Łąki Soleckie (PLH140055)

2. POŁOŻENIE OBSZARU

[Powrót](#)

2.1. Położenie centralnego punktu [wartości dziesiętne stopni]:

Długość geograficzna

21.0998

Szerokość geograficzna

52.0362

2.2. Powierzchnia [ha]:

222.06

2.3. Obszar morski [%]

0.0

2.5. Kod i nazwa regionu administracyjnego

Kod poziomu NUTS 2

Nazwa regionu

PL12	Mazowieckie
------	-------------

2.6. Region biogeograficzny

Kontynentalny (100.0 %)

3. INFORMACJE PRZYRODNICZE

[Powrót](#)

3.1. Typy siedlisk przyrodniczych występujących na terenie obszaru i ocena znaczenia obszaru dla tych siedlisk:

Typy siedlisk wymienione w załączniku I						Ocena obszaru			
Kod	PF	NP	Pokrycie [ha]	Jaskinie [liczba]	Jakość danych	A B C D	A B C		
						Reprezentatywność	Powierzchnia względna	Stan zachowania	Ocena ogólna
6410			5.5		M	C	C	C	C
6510			61.0		M	C	C	C	C

- PF: dla typów siedlisk, do których mogą odnosić się zarówno formy priorytetowe, jak i niepriorytetowe (6210, 7130, 9430) należy wpisać „x” w kolumnie PF celem wskazania formy priorytetowej.
- NP: jeśli dany typ siedliska nie istnieje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Pokrycie: można wpisywać z dokładnością do wartości dziesiętnych.
- Jaskinie: w przypadku siedlisk typu 8310 i 8330 (jaskinie) należy podać liczbę jaskiń, jeśli nie są dostępne szacunkowe dane na temat powierzchni.
- Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. zgrubne dane szacunkowe).

3.2. Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 2009/147/WE i gatunki wymienione w załączniku II do dyrektywy 92/43/EEG oraz ocena znaczenia obszaru dla tych gatunków

[illegible]

					Min	Maks		C R V P		Populacja	zachowania	Izolacja	Ogólnie
A	1188	Bombina bombina		p				R	DD	D			
M	1337	Castor fiber		p				P	DD	D			
I	1060	Lycaena dispar		p				P	DD	C	C	C	C
I	6177	Phengaris teleius		p				P	DD	C	C	C	C
I	1014	Vertigo angustior		p				R	DD	C	C	A	C
I	1016	Vertigo moulinsiana		p				R	DD	C	C	A	C

- Grupa: A = płazy, B = ptaki, F = ryby, I = bezkręgowce, M = ssaki, P = rośliny, R = gady.
- S: jeśli dane o gatunku są szczególnie chronione i nie mogą być udostępnione publicznie, należy wpisać „tak”.
- NP: jeśli dany gatunek nie występuje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Typ: p = osiadłe, r = wydające potomstwo, c = przelotne, w = zimujące (w przypadku roślin i gatunków niemigrujących należy użyć terminu „osiadłe”).
- Jednostka: i = osobniki pojedyncze, p = pary lub inne jednostki według standardowego wykazu jednostek i kodów zgodnego ze sprawozdawczością na podstawie art. 12 i 17 (zob. [portal referencyjny](#)).
- Kategorie liczebności (kategoria): C = powszechne, R = rzadkie, V = bardzo rzadkie, P = obecne - wypełnić, jeżeli brak jest danych (DD), lub jako uzupełnienie informacji o wielkości populacji.
- Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. zgrubne dane szacunkowe); DD = brak danych (kategorię tę należy stosować wyłącznie, jeśli nie da się dokonać nawet zgrubnej oceny wielkości populacji - w takiej sytuacji można pozostawić puste pole dotyczące wielkości populacji, jednak pole „Kategorie liczebności” musi być wypełnione).

4. OPIS OBSZARU

4.1. Ogólna charakterystyka obszaru

[Powrót](#)

Klasa siedliska przyrodniczego	Pokrycie [%]
N16	0.02
N23	1.17
N10	88.22
N17	0.3
N19	0.01
N12	10.27
Ogółem pokrycia siedliska przyrodniczego	100

Dodatkowa charakterystyka obszaru:

Obszar położony jest na Równinie Warszawskiej i obejmuje zatorfioną dolinę rzeki Małej. Pierwotnie obszar ten miał charakter mokradła stałego, jednakże wskutek rozbudowy sieci drenażu powierzchniowego, obniżeniu ulega zwierciadło wody, a torfy podlegają procesowi murszenia. Tym samym teren ten ma obecnie charakter mokradła okresowego, zalewanego jedynie podczas wiosennych roztopów. Dominują tu łąki użytkowane ekstensywnie oraz różnej wielkości płaty turzycowisk, ziołorośli i zarośli wierzb szerokolistnych. W południowej części znajduje się kompleks stawów złożony z dwóch zbiorników wypełnionych wodą, o umiarkowanym stopniu zarośnięcia przez roślinność szuwarową związku Phragmition. Sąsiedztwo terenów

leśnych sprawia, że obszar Natura 2000 tworzy interesujący krajobrazowo i przyrodniczo układ przestrzenny o znacznej różnorodności biologicznej. Wśród roślinności terenów otwartych na uwagę zasługuje mozaika zróżnicowanych pod względem składu gatunkowego łąk świeżych, szuwarów związku *Magnocaricion* oraz zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych związku *Molinion*, które wykazują znaczne zniekształcenia głównie w wyniku zarzucenia gospodarki łąkowej. Obszar Łąki Soleckie niemal w całości położony jest w granicach Chojnowskiego Parku Krajobrazowego oraz częściowo w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, stanowiąc tym samym część korytarza migracji o znaczeniu lokalnym i regionalnym.

4.2. Jakość i znaczenie

W obszarze PLH140055 Łąki Soleckie zinwentaryzowano 2 siedliska przyrodnicze (oba jako przedmiot ochrony) z Załącznika I Dyrektywy siedliskowej i 6 gatunków (4 jako przedmiot ochrony) z Załącznika II.

6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe *Molinion*

Łąki cechuje znaczny stopień przekształcenia. W wyniku zaniechania użytkowania doszło do utraty cech swoistych dla tego typu zbiorowisk roślinnych. Do tego czynnikiem istotnie wpływającym na stan zachowania przedmiotu ochrony mają zaburzenia hydrologiczne (od przesuszenia po wtórne zabagnienie), w efekcie których łąki ulegają procesowi sukcesji. Z jednej strony zarastają krzewami i podrostem drzew, z drugiej wzrasta rola innych gatunków roślin zielnych. W miejscach o znacznym poziomie wód gruntowych wzrasta rola gatunków ziołoroślowych, jak: wiązówka błotna *Filipendula ulmaria* i tojeść pospolita *Lisimachia vulgaris*. W miejscach przesuszonych ekspansję wykazują śmiałek darniowy *Deschampsia caespitosa*, pokrzywa zwyczajna *Urtica dioica* i ostrożeń lancetowaty *Cirsium vulgare*. Zdegradowane łąki trzęślicowe opalone są przez nawłóć późną *Solidago gigantea*. Wszystkie płaty łąk trzęślicowych w większym lub mniejszym stopniu cechuje: znaczne nagromadzenie martwej materii (wojłók) utrudniające kiełkowanie i wzrost roślin, zmniejszony udział jakościowy i ilościowy gatunków charakterystycznych, fragmentacja powierzchni i postępująca sukcesja. Mimo tych znacznych zmian nadal można wyróżnić na terenie Obszaru dwa podtypy w obrębie siedliska przyrodniczego:

- Podtyp 6410.1 – Łąki olszewnikowo-trzęślicowe *Selino Molinietum*, obejmujące bardzo rzadkie w granicach ostoi siedlisko przyrodniczo-florystycznie, stanowione przez łąkę wilgotną, której fizjonomię nadaje trzęślica modra *Molinia caerulea* oraz czarcikęs łąkowy *Succisa pratensis*. W najlepiej zachowanych płatach występują m.in.: krwiściąg lekarski *Sanguisorba officinalis*, sierpik barwierski *Serratula tinctoria* i goździk pyszny *Dianthus superbus*.
- Podtyp 6410.2 – Zmiennowilgotne łąki sitowo-trzęślicowe, reprezentowane przez zespół *Junco-Molinietum*. Charakterystyczną fizjonomię nadają mu: trzęślica modra *Molinia caerulea* oraz sity – rozpięchły *Juncus effusus* i skupiony *J. conglomeratus*. Istotnym elementem są rośliny związane z torfowiskami przejściowymi ze związku *Caricetalia nigrae*: turzyca pospolita *Carex nigra*, mietlica psia *Agrostis canina* i fiołek błotny *Viola palustris*.

Biorąc powyższe pod uwagę, reprezentatywność uznano za znaczącą, zaś stan zachowania siedliska oceniono jako średni, dlatego też obu parametrom nadano ocenę C. Względna powierzchnia siedliska przyrodniczego

w obszarze nie przekracza 2% ogólnej powierzchni pokrytej przez ten typ siedliska przyrodniczego w obrębie kraju, w związku z czym parametr ten również otrzymał ocenę C. Ocenę ogólną określono metodą najlepszej oceny eksperckiej i nadano jej wartość znaczącą – C.

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie *Arrhenatherion elatioris* Siedlisko przyrodnicze reprezentowane przez różne postacie wilgotnościowe łąki rajgrasowej *Arrhenatheretum elatioris*. Oprócz rajgrasu wyniosłego *Arrhenatherum elatius* do charakterystycznych gatunków należą m.in.: barszcz syberyjski *Heracleum sybericum*, chaber łąkowy *Centaurea jacea*, dzwonek rozpięchły *Campanula patula*, konieczyna łąkowa *Trifolium pratense*, babka lancetowata *Plantago lanceolata*, szelężnik większy *Rhinanthus serotinus*, krwawnik pospolity *Achillea millefolium*, kupkówka pospolita *Dactylis glomerata*, przytulia pospolita *Galium mollugo*, przytulia właściwa *Galium verum*, tomka wonna *Anthoxanthum odoratum* i wiechlina łąkowa *Poa pratensis*. Pod względem fitosocjologicznym w obrębie obszaru Natura 2000 występuje 5 podzespołów:

- **Arrhenatheretum elatioris alchemilletosum* ze znacznym udziałem krwawnika pospolitego;
- **Arrhenatheretum elatioris sanguisorbetosum officinalis* ze znacznym udziałem krwiściągu lekarskiego;
- **Arrhenatheretum elatioris alopecuro-polygotenosum*, cechujący się znacznym udziałem ilościowym gatunków przechodzących z wilgotnych łąk należących do związku *Calthion palustris*, zwłaszcza: rdestu wężownika *Polygonum bistorta*, fioletki poszarpanej *Lychnis flos-cuculi* i jaskra ostrego *Ranunculus acris*;

**Arrhenatheretum elatioris caricetosum gracilis* z turzycą zaostrzoną;

**Arrhenatheretum elatioris alopecuro-phalaridetosum* cechujący się zwiększonym udziałem mozgi trzcinowatej *Phalaris arundinacea*, krwawnicy pospolitej *Lythrum salicaria*, wiązówki błotnej *Filipendula ulmaria* i tojeści pospolitej *Lisimachia vulgaris*.

Podobnie jak w przypadku łąk trzęślicowych, w wyniku zaniechania lub ograniczenia użytkowania uruchomione zostały procesy sukcesji. Z jednej strony zarastają krzewami i podrostem drzew, z drugiej wzrasta rola innych gatunków roślin zielnych, zwłaszcza ekspansywnych traw m.in. śmiłka darniowego *Deschampsia caespitosa*. Jednocześnie po każdym sezonie wegetacyjnym wzrasta grubość martwej nierozłożonej materii (wojłok) utrudniającej kiełkowanie i wzrost gatunków łąkowych. Biorąc powyższe pod uwagę, reprezentatywność uznano za znaczącą, zaś stan zachowania siedliska oceniono jako średni, dlatego też obu parametrom nadano ocenę C. Powierzchnia względna siedliska, tj. udział powierzchni pokrytej siedliskiem przyrodniczym w obszarze w stosunku do całkowitej powierzchni pokrytej przez ten typ siedliska w obrębie terytorium państwa nie przekracza 2%, w związku z czym parametr ten otrzymał ocenę C. Ocenę ogólną określono metodą najlepszej oceny eksperckiej i nadano jej wartość znaczącą – C.

1060 Czerwończyk nieparek *Lycaena dispar*

W granicach obszaru Natura 2000 gatunek występuje głównie w jego południowej części. W czerwcu 2014 r. obserwowano ponad 20 osobników na transekcie wzdłuż urządzeń melioracyjnych położonych na zachód od rzeki Małej (indeks liczebności wynosi tu > 15 osobników/250 m) oraz stawach, gdzie na skarpach występują rośliny żywicielskie w szczególności: szczaw lancetowaty *Rumex hydrolapathum* oraz szczaw omszony *Rumex confertus*. Stan populacji kształtuje się na granicy stabilności, co wynika z postępującego procesu sukcesji, ograniczenia lub zaprzestania dotychczasowego sposobu wykorzystania terenu (koszenie, wypas), a niekiedy zaniechania utrzymywania drożności systemów melioracyjnych. Obszar występowania będzie się w perspektywie czasu zawężał do bezpośredniego sąsiedztwa rowów opaskowych na stawach rybnych oraz urządzeń wodnych występujących na zachód od koryta rzeki Małej. Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzono, że wielkość populacji gatunku i jej zagęszczenie w stosunku do populacji krajowej nie przekracza wartości 2%, a stan zachowania należy ocenić jako średni, dlatego też obu parametrom nadano ocenę C. Populację ocenia się jako nieizolowaną w obrębie rozległego obszaru występowania w związku z czym parametr otrzymał ocenę C. Ocenę ogólną określono metodą najlepszej oceny eksperckiej i nadano jej wartość znaczącą – C.

6177 Modraszek telejus *Maculinea (Phengaris) teleius*

Populację w obrębie obszaru Natura 2000 należy uznać za średnio liczną (4-8 os/100 m, ind. liczebności wynosił tu <10 osobników/100 m). W obrębie całego terenu występują znaczne zasoby krwiściągę lekarskiego *Sanguisorba officinalis*, co stwarza bardzo dobre perspektywy zachowania gatunku, przy zachowaniu lub przewróceniu ekstensywnego użytkowania łąk. Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzono, że wielkość populacji gatunku i jej zagęszczenie w stosunku do populacji krajowej nie przekracza wartości 2%, a stan zachowania należy ocenić jako średni, dlatego też obu parametrom nadano ocenę C. Populację ocenia się jako nieizolowaną w obrębie rozległego obszaru występowania w związku z czym parametr ten również otrzymał ocenę C. Ocenę ogólną określono metodą najlepszej oceny eksperckiej i nadano jej wartość znaczącą – C.

W ramach działań wynikających z planu zadań ochronnych dla obszaru, planowane jest przeprowadzenie prac

z zakresu uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiocie ochrony.

1014 Poczwarówka zwężona *Vertigo angustior*

W granicach obszaru stanowisko gatunku zarejestrowano w ramach prac Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w 2008 r., a populację oceniono wówczas na funkcjonującą w sposób stabilny.

Obserwacje terenowe prowadzone na potrzeby planu zadań ochronnych w 2014 r. wykazały jednak, że stan zachowania przedmiotu ochrony uległ wyraźnemu pogorszeniu, co w konsekwencji może doprowadzić do zaniku gatunku

w Ostoi (sporadyczne występowanie osobników dorosłych, stanowisko przekształcone z silnie zaznaczającą się ekspansją gatunków inwazyjnych – nawłoci oraz wyraźną zmianą stosunków wodnych - okresowy deficyt wody). Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzono, że wielkość populacji gatunku i jej zagęszczenie w stosunku do populacji krajowej nie przekracza wartości 2%, a stan zachowania należy ocenić jako średni, dlatego też obu parametrom nadano ocenę C. Populację ocenia się jako niemal izolowaną w obrębie rozległego obszaru występowania w związku z czym parametr ten otrzymał ocenę A. Ocenę ogólną

określono metodą najlepszej oceny eksperckiej i nadano jej wartość znaczącą – C.

1016 Poczwarówka jajowata *Vertigo moulinsiana*

Poczwarówka jajowata jest największym gatunkiem z rodzaju *Vertigo* występującym w Polsce. Preferuje miejsca odsłonięte, o umiarkowanym zacienieniu. Przebywa chętnie na wysokości ponad 30-40 cm, wykorzystując głównie liście kosaćca i turzyc. Gatunek został odnotowany w 2014 r. w obrębie tego samego stanowiska, w którym był notowany przez Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w 2008 r. Obserwacje terenowe prowadzone w 2014 r. na potrzeby planu zadań ochronnych wykazały jednak, że stan zachowania przedmiotu ochrony uległ wyraźnemu pogorszeniu (sporadyczne występowanie osobników dorosłych, stanowisko przekształcone z silnie zaznaczającą się ekspansją gatunków inwazyjnych - nawłoci). Stwierdzono ponadto postępujące zarastanie olchą przy zachowanym stanie uwilgotnienia siedliska. Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzono, że wielkość populacji gatunku i jej zagęszczenie w stosunku do populacji krajowej nie przekracza wartości 2%, a stan zachowania należy ocenić jako średni, dlatego też obu parametrom nadano ocenę C. Populację ocenia się jako niemal izolowaną w obrębie rozległego obszaru występowania w związku z czym parametr ten otrzymał ocenę A. Ocenę ogólną określono metodą najlepszej oceny eksperckiej i nadano jej wartość znaczącą – C.

1337 Bóbr europejski *Castor fiber*

Występowanie gatunku stwierdzono w granicach urządzeń wodnych położonych na zachód od rzeki Małej oraz stawów, co prawdopodobnie należy uznać za terytorium występowania jednej rodziny. Gatunek nieistotny (ocena populacji – D).

1188 Kumak nizinny *Bombina bombina*

W 2014 r. liczebność gatunku szacowano na łącznie nie więcej niż 10 dorosłych okazów, a prawdopodobnie jest to liczba nieco zawyżona, gdyż występowanie kumaka na omawianym terenie wyraźnie spada. Podczas prac terenowych nie udało się odnaleźć jaj, larw ani młodocianych osobników, które wskazywałyby na możliwość rozrodu tego płaza na terenie obszaru Natura 2000. Gatunek nieistotny (ocena populacji – D).

Oceny siedlisk przyrodniczych i gatunków umieszczonych w punkcie 3.2 dokonano na podstawie badań terenowych i ekspertyz przyrodniczych [1-6]

**Modraszek nausitous* (6179) oczekuje na zgodę Komisji Europejskiej co do jego wykreślenia z katalogu przedmiotów ochrony obszaru.

4.3. Zagrożenia, presje i działania mające wpływ na obszar

Najważniejsze oddziaływania i działalność mające duży wpływ na obszar

Oddziaływania negatywne			
Poziom	Zagrożenia i presje [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnętrzne [i o b]
H	A03.03		o
L	A02.03		o
L	A08		o
M	E01.03		o
L	K01.04		b
H	K02.01		i
H	I01		i
H	J02.05		o
H	J02.10		o
M	D01.02		o
Oddziaływania pozytywne			
			Wewnętrzne

Poziom	Działania, zarządzanie [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	/ zewnętrzne [i o b]
--------	------------------------------------	--	----------------------------

Poziom: H = wysoki, M = średni, L = niski.

Zanieczyszczenie: N = stosowanie azotu, P = stosowanie fosforu/fosforanów, A = stosowanie kwasów/zakwaszanie, T = toksyczne chemikalia nieorganiczne,
O = toksyczne chemikalia organiczne, X = zanieczyszczenia mieszane.

i = wewnętrzne, o = zewnętrzne, b = jednocześnie.

4.4. Własność (opcjonalnie)

Typ	[%]
Publiczna	Krajowa/federalna
	Kraj
	związkowy/województwo
	Lokalna/gminna
	Inna publiczna
Własność łączna lub współwłasność	
Prywatna	
Nieznana	
Suma	

4.5. Dokumentacja (opcjonalnie)

1. Bistula-Prószyński G. 2014. Ekspertyza entomologiczna na potrzeby opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łąki Soleckie PLH140055 - modraszek telejus Phengaris teleius 6177, modraszek nausitous Phengaris nausithous 6179 i czerwoczyk nieparek Lycaena dispar 1060. Biuro Badań, Monitoringu i Ochrony Przyrody „EcoFalk”. 2. Falkowski M. 2014. Ekspertyza botaniczna na potrzeby opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łąki Soleckie PLH140055. Biuro Badań, Monitoringu i Ochrony Przyrody „EcoFalk”. 3. Górski P. 2014. Ekspertyza herpetologiczna na potrzeby opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łąki Soleckie PLH140055. Biuro Badań, Monitoringu i Ochrony Przyrody „EcoFalk”. 4. Stróżyński W. 2014. Ekspertyza malakologiczna na potrzeby opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Kampinoska Dolina Wisły PLH140029, Łąki Ostrówieckie PLH140050 i Łąki Soleckie PLH140055, Warszawa. 5. Dokumentacja sporządzona na potrzeby planu zadań ochronnych dla obszaru Łąki Soleckie PLH1400556. Gobio Usługi przyrodnicze, 2018, Wykonanie ekspertyzy przyrodniczej gatunków owadów: czerwoczyk nieparek, modraszek telejus oraz modraszek nausitous na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy na obszarze Natura 2000 Łąki Soleckie PLH140055, Toruń.

5. STATUS OCHRONY OBSZARU (OPCJONALNIE)

5.1. Istniejące formy ochrony na poziomie krajowym i regionalnym:

[Powrót](#)

Kod	Pokrycie [%]	Kod	Pokrycie [%]	Kod	Pokrycie [%]
PL03	83.99	PL04	16.08		

5.2. Powiązanie opisanego obszaru z innymi formami ochrony:

na poziomie krajowym lub regionalnym:

Pokrycie

Kod rodzaju	Nazwa terenu	Rodzaj [%]	
PL03	Chojnowski Park Krajobrazowy	*	83.99
PL04	Warszawski	*	16.08

6. ZARZĄDZANIE OBSZAREM

6.1. Organ lub organy odpowiedzialne za zarządzanie obszarem:

[Powrót](#)

Organizacja:	Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
Adres:	Polska Henryka Sienkiewicza 3 00-015 Warszawa
Adres e-mail:	sekretariat@warszawa.rdos.gov.pl

6.2. Plan(-y) zarządzania:

Aktualny plan zarządzania istnieje:

☒ Tak	Nazwa: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łąki Solecie PLH140055 Link: http://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2017/12468/
☐ Nie, ale jest w przygotowaniu	
☐ Nie	

7. MAPA OBSZARU

[Powrót](#)

Nr ID INSPIRE:

PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH140055

Mapa załączona jako plik PDF w formacie elektronicznym (opcjonalnie)

☒ Tak ☐ Nie

Odniesienie lub odniesienia do oryginalnej mapy wykorzystanej przy digitalizacji granic elektronicznych (opcjonalnie)

--