



NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

dla obszarów specjalnej ochrony (OSO),
proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (pOZW),
obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW) oraz
specjalnych obszarów ochrony (SOO)

OBSZAR PLH200001

NAZWA
OBSZARU Jeleniewo

ZAWARTOŚĆ

- [1. IDENTYFIKACJA OBSZARU](#)
- [2. POŁOŻENIE OBSZARU](#)
- [3. INFORMACJE PRZYRODNICZE](#)
- [4. OPIS OBSZARU](#)
- [5. STATUS OCHRONY OBSZARU](#)
- [6. POWIĄZANIA OBSZARU](#)
- [7. MAPA OBSZARU](#)

1. IDENTYFIKACJA OBSZARU

1.1. Typ B	1.2. Kod obszaru PLH200001	Powrót
---------------	-------------------------------	------------------------

1.3. Nazwa obszaru

Jeleniewo

1.4. Data opracowania 2007-07	1.5. Data aktualizacji 2025-05
----------------------------------	-----------------------------------

1.6. Instytucja lub osoba przygotowująca wniosek:

Nazwisko/Organizacja:	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Adres:	Polska Al. Jerozolimskie 136 Warszawa 02-305
Adres e-mail:	kancelaria@gdos.gov.pl

Data zaproponowania obszaru jako OZW:	2004-04
Data zatwierdzenia obszaru jako OZW(*):	2008-01
Data objęcia obszaru ochroną SOO:	2022-03
Krajowe odniesienie prawne dla formy ochrony SOO:	rozp. MKiŚ z dn. 14 stycznia 2022 r. w spr. soo Jeleniewo (PLH200001)

Wyjaśnienia:	Powiększenie - 10.2009 r.
--------------	---------------------------

2. POŁOŻENIE OBSZARU

2.1. Położenie centralnego punktu [wartości dziesiętne stopni]:

[Powrót](#)

Długość geograficzna
22.9663

Szerokość geograficzna
54.2384

2.2. Powierzchnia [ha]:
5910.07

2.3. Obszar morski [%]
0.0

2.5. Kod i nazwa regionu administracyjnego

Kod poziomu NUTS 2

Nazwa regionu

PL34

Podlaskie

2.6. Region biogeograficzny

Kontynentalny (100.0
%)

3. INFORMACJE PRZYRODNICZE

3.1. Typy siedlisk przyrodniczych występujących na terenie obszaru i ocena znaczenia obszaru dla tych siedlisk:

[Powrót](#)

Typy siedlisk wymienione w załączniku I						Ocena obszaru			
Kod	PF	NP	Pokrycie [ha]	Jaskinie [liczba]	Jakość danych	A B C D	A B C		
						Reprezentatywność	Powierzchnia względna	Stan zachowania	Ocena ogólna
3140			667.83		G	B	C	B	B
3260			7.09		M	B	C	B	B
6210			19.77		G	C	C	B	B
6230			2.53		M	B	C	B	B
6510			228.13		M	B	C	B	B
7110			1.93		M	B	C	B	B
7140			21.56		M	B	C	C	C
7230			15.13		M	A	C	C	C
91D0			18.78		G	B	C	B	B
91E0			27.85		G	B	C	B	B

- PF: dla typów siedlisk, do których mogą odnosić się zarówno formy priorytetowe, jak i niepriorytetowe (6210, 7130, 9430) należy wpisać „x” w kolumnie PF celem wskazania formy priorytetowej.
- NP: jeśli dany typ siedliska nie istnieje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Pokrycie: można wpisywać z dokładnością do wartości dziesiętnych.
- Jaskinie: w przypadku siedlisk typu 8310 i 8330 (jaskinie) należy podać liczbę jaskiń, jeśli nie są dostępne szacunkowe dane na temat powierzchni.

- Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. zgrubne dane szacunkowe).

3.2. Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 2009/147/WE i gatunki wymienione w załączniku II do dyrektywy 92/43/EEG oraz ocena znaczenia obszaru dla tych gatunków

Gatunki					Populacja na obszarze						Ocena obszaru			
Grupa	Kod	Nazwa naukowa	S	NP	Typ	Wielkość		Jednostka	Kategoria	Jakość danych	A B C D	A B C		
						Min	Maks		C R V P		Populacja	Stan zachowania	Izolacja	Ogólnie
M	1308	Barbastella barbastellus			p				P	M	C	B	C	B
A	1188	Bombina bombina			p	100	200	i	P	P	C	B	C	B
M	1337	Castor fiber			p	100	160	i	P	P	B	B	C	B
P	1903	Liparis loeselii			p	250	370	i		M	C	B	C	B
M	1355	Lutra lutra			p	8	16	i	P	P	C	B	C	B
M	1318	Myotis dasycneme			r	150	300	i		P	A	B	C	A
A	1166	Triturus cristatus			p	6	50	i	P	P	C	B	C	B

- Grupa: A = płazy, B = ptaki, F = ryby, I = bezkręgowce, M = ssaki, P = rośliny, R = gady.
- S: jeśli dane o gatunku są szczególnie chronione i nie mogą być udostępnione publicznie, należy wpisać „tak”.
- NP: jeśli dany gatunek nie występuje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Typ: p = osiadłe, r = wydające potomstwo, c = przelotne, w = zimujące (w przypadku roślin i gatunków niemigrujących należy użyć terminu „osiadłe”).
- Jednostka: i = osobniki pojedyncze, p = pary lub inne jednostki według standardowego wykazu jednostek i kodów zgodnego ze sprawozdawczością na podstawie art. 12 i 17 (zob. [portal referencyjny](#)).
- Kategorie liczebności (kategoria): C = powszechne, R = rzadkie, V = bardzo rzadkie, P = obecne - wypełnić, jeżeli brak jest danych (DD), lub jako uzupełnienie informacji o wielkości populacji.
- Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. zgrubne dane szacunkowe); DD = brak danych (kategorię tę należy stosować wyłącznie, jeśli nie da się dokonać nawet zgrubnej oceny wielkości populacji - w takiej sytuacji można pozostawić puste pole dotyczące wielkości populacji, jednak pole „Kategorie liczebności” musi być wypełnione).

4. OPIS OBSZARU

4.1. Ogólna charakterystyka obszaru

[Powrót](#)

Klasa siedliska przyrodniczego	Pokrycie [%]
N19	2.08
N17	0.99
N16	3.83
N06	12.56
N10	0.9

N12	79.65
Ogółem pokrycia siedliska przyrodniczego	100

Dodatkowa charakterystyka obszaru:

Ostoja "Jeleniewo" położona jest w zasięgu mikroregionu Wzgórza Jeleniewskie, który wchodzi w skład mezoregionu Pojezierza Wschodniosuwalskiego i makroregionu Pojezierze Suwalskie.

Zasięgiem swoim obejmuje obszar morenowych wzniesień pomiędzy polodowcową rynną Czarnej Hańczy a rynnowymi jeziorami Szelment Wielki i Szelment Mały.

Tworzenie ostoi ma za zadanie ochronę największej w Polsce kolonii lęgowej nietoperza nocka łydkowłosego *Myotis dasycneme* (Boie, 1825), który został uznany za jeden z najrzadszych i najbardziej zagrożonych wymarciem gatunków nietoperzy w Europie (Limpens, 1999). Dotychczas istniejący Obszar Specjalnej Ochrony "Jeleniewo" obejmował swym zasięgiem jedynie miejsce pobytu kolonii lęgowej, tj. zabytkowy, drewniany kościół w Jeleniewie (0,42ha). Powiększenie obszaru ma na celu objęcie ochroną również obszaru żerowisk tego nietoperza.

Nocek łydkowłosy jest nietoperzem związanym z krajobrazem otwartym, z dużą ilością zbiorników i cieków wodnych. Jego stosunkowo długie i szerokie skrzydła są adaptacją do żerowania w czasie szybkiego, prostoliniowego lotu nad powierzchnią wód. W składzie pokarmu tego gatunku dominują muchówki, chrząszcze, chruściki, motyle i komary. Zdobycz jest chwyтана z powierzchni wody za pomocą dużych i charakterystycznych dla tego gatunku stóp, w skrzydła lub w błonę ogonową. Dzięki dobrze wykształconym skrzydłom i zdolności do szybkiego lotu (do 35km/h) może on żerować w odległości do 15 km od kolonii rozrodczych. Przeloty na żerowiska odbywają się wzdłuż liniowych elementów krajobrazu, którymi mogą być aleje drzew i zakrzewień, oraz ciek wodne.

Kolonie rozrodcze zakłada głównie w budynkach, (strychy, szczeliny ścian). Wielkość kolonii wynosi od kilkudziesięciu do kilkuset osobników. Samice wracają do tych samych kolonii w kolejnych latach. W połowie lub pod koniec czerwca rodzą się młode, zwykle jedno na samicę, które po 4-5 tygodniach uzyskują zdolność lotu i rozpoczynają samodzielne żerowanie. Kolonia lęgowych nocka łydkowłosego na strychu XIX-wiecznego Kościoła Parafialnego w Jeleniewie koło Suwałk (woj. podlaskie) jest jedną z największych w Polsce. Liczebność samic w kolonii określa się na 400-500 szt.

Ostoja "Jeleniewo" obejmuje swym zasięgiem również dolinę Czarnej Hańczy. Czarna Hańcza jest największą rzeką Suwalszczyzny. Należy ona do dorzecza Niemna, do którego odprowadza wody z powierzchni ponad 170 km². Źródła rzeki znajdują się powyżej jeziora Jegliniszki. Jej długość wynosi prawie 142 km, z czego 108 km znajduje się w granicach Polski.

W górnym biegu rzeki obserwuje się liczne zakola, przełomy, głazowiska. Na tym odcinku Czarna Hańcza, płynąc w głębokiej polodowcowej rynnie, przypomina wręcz rzekę podgórską o wartkim nurcie, niedużej głębokości i wysokiej przejrzystości wody. W Okolicach Turtula rzeka spowalnia swój bieg i meandruje w kierunku Suwałk rozległą doliną. Część lasów w sąsiedztwie koryta rzeki to łągi olszowo-jesionowe o wysokiej wartości przyrodniczej oraz tzw. łągi źródłiskowe.

Młodoślacalny charakter krajobrazu podkreśla wysoka liczba głazów narzutowych znajdujących się na zboczach pradoliny Czarnej Hańczy. Zbocza te obfitują w bogate gatunkowo fitocenozy kwiatnych muraw ciepłolubnych i bliśniczkowych.

Zróznicowane ukształtowanie terenu (z silnie nachylonymi zboczami) umożliwiło wytworzenie się torfowisk źródłiskowych w dolinie rzeki w okolicach wsi Potasznia oraz Podwysokie Jeleniewskie. Fitocenozy te charakteryzuje wysoka różnorodność florystyczna. Na szczególną uwagę zasługuje obecność rzadkich gatunków roślin kalcyfilnych. Na skutek zaprzestania gospodarowania na torfowiskach następuje rozwój zbiorowisk zaroślowych.

Ostoja stanowi istotne w skali kraju miejsce występowania populacji *Liparis loeselii*.

Na omawianym odcinku doliny Czarnej Hańczy stwierdzono występowanie również rzadkich gatunków ptaków, m.in. zimorodka, błotniaka stawowego i łąkowego, bielika, bąka, bociana białego, derkacza, żurawia, dzięcioła czarnego, lerkę, ortolana, gąsiorka.

4.2. Jakość i znaczenie

W obszarze PLH200001 przedmiotami ochrony są siedliska: 3140, 3260, 6210, 6230, 7110, 7140, 7230, 91D0 i 91E0, ujęte w Załączniku I Dyrektywy siedliskowej oraz kumak nizinny, trzaska grzebieniasta, bóbr i wydra, nocek łydkowłosy oraz lipiennik Loesela, ujęte w Załączniku II.

3140 Twardowodne, oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic *Charetea*

Siedlisko zostało stwierdzone w obrębie sześciu jezior - jeziora Okmin, dwóch bezimiennych zbiorników położonych w dolinie Czarnej Hańczy, na jej lewym brzegu, a także w jeziorach Iłgiel, Szelment Mały i Szelment Wielki. Ocena ogólna B, w tym reprezentatywność – B, względna powierzchnia – C, stan zachowania – B (struktura dobrze zachowana – II; stopień zachowania funkcji – II: perspektywy zachowania dobre; możliwość renaturyzacji/odtworzenia – II: przy średnim nakładzie sił i środków).

3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników *Ranuncion fluitantis*
Siedlisko na terenie ostoi ma jedno stanowisko – rzeka Czarna Hańcza. Ocena ogólna B, w tym reprezentatywność – B, względna powierzchnia – C, stan zachowania – B (struktura dobrze zachowana – II; stopień zachowania funkcji – II: perspektywy zachowania dobre; możliwość renaturyzacji/odtworzenia – II: przy średnim nakładzie sił i środków).

6210 Murawy kserotermiczne (*Festuco-Brometea*)

W granicach obszaru murawy występują zazwyczaj na zboczach wyniesień, zwłaszcza tych o ekspozycji południowo-zachodniej, na podłożu żwirowym lub żwirowo-gliniastym. Siedlisko potwierdzono na 25 stanowiskach. Ocena ogólna B, w tym reprezentatywność – C, względna powierzchnia – C, stan zachowania – B (struktura dobrze zachowana – II; stopień zachowania funkcji – II: perspektywy zachowania dobre; możliwość renaturyzacji/odtworzenia – II: przy średnim nakładzie sił i środków).

7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą

Ocena ogólna B, w tym: reprezentatywność – B, obszarze zidentyfikowano 3 płaty, które zakwalifikowano jako siedlisko 7110, w tym 2 bardzo małe i narażone na zanik w wyniku sukcesji w kierunku boru bagiennego i 1 większy, stanowiący dobry przykład wczesnej fazy rozwoju torfowiska wysokiego. Wszystkie wskaźniki struktury i funkcji tego płatu oceniono na FV wg metodyki GIOŚ; powierzchnia względna – C, wszystkie płaty zajmują 1,93 ha, co stanowi ułamek procenta wszystkich torfowisk wysokich w Polsce; stan zachowania - B, w tym: stopień zachowania struktury II – ocena FV wszystkich wskaźników struktury w dużym płacie, ale niższa w dwóch mniejszych płatach, stopień zachowania funkcji III – perspektywy średnie do niekorzystnych, ponieważ w bezpośrednim sąsiedztwie dużego płatu zgodnie z obowiązującym miejscowym planem rozpoczęto prace nad realizacją osiedla, możliwość odtworzenia – nie analizowano.

7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska

Torfowiska przejściowe i trzęsawiska z roślinnością z klasy *Scheuchzeria-Caricetea* występują w obszarze Natura 2000 Jeleniewo w 38 płatach o łącznej powierzchni ok. 22 ha. Reprezentują one najczęściej zbiorowiska ze związku *Caricion lasiocarpae*, znacznie rzadziej *Rhynchosporion albae* lub *Caricetalia nigrae*. Ocena ogólna C, w tym: reprezentatywność – B; powierzchnia względna – C, ($2\% \geq p > 0\%$); Stan zachowania C, w tym: stopień zachowania struktury III (średnio zachowana) – strukturę większości torfowisk przejściowych oceniono na U1 wg metodyki GIOŚ, najczęściej z powodu obniżonej oceny wskaźników kardynalnych „uwodnienie” i „struktura mchów”, nsko (na ogół U2) oceniono też wskaźnik „ekspansja drzew i krzewów”, stopień zachowania funkcji III – perspektywy na ogół średnie – wiele płatów zaniknie, jeżeli nie podejmie się ich czynnej ochrony, możliwość odtworzenia – II (możliwe przy średnim nakładzie środków) - większość płatów wymaga odkrzaczenia, niektóre poprawy stosunków wodnych i/lub ograniczenia dopływu biogenów.

7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk

Ocena ogólna C, w tym: reprezentatywność – B; torfowiska zasadowe zidentyfikowane jako siedliska 7230 występują w obszarze Natura 2000 Jeleniewo w 16 płatach o łącznej powierzchni ok. 15 ha. Reprezentują one na zbiorowiska ze związku *Caricion davallianae*, ale także nawiązujące do tego związku zbiorowiska z *Caricion lasiocarpae*, *Magnocaricion*, a nawet *Molinion caeruleae*. Są to torfowiska źródłkowe, przepływowe i o zasilaniu mieszanym, powierzchnia względna – C, ($2\% \geq p > 0\%$); stan zachowania - C, w tym: stopień zachowania struktury III (średnio zachowana) – strukturę większości torfowisk zasadowych oceniono na U1 wg metodyki GIOŚ, najczęściej z powodu obniżonej oceny wskaźników kardynalnych „pH”, „uwodnienie”, „struktura mchów” lub „ekspansja roślin zielnych”, stopień zachowania funkcji III – perspektywy na ogół średnie – znaczna część płatów jest narażona na ekspansję drzew i krzewów oraz trzciny i pałki szerokolistnej, część jest zbyt słabo uwodniona – bez ochrony czynnej ich stan będzie się pogarszał, możliwość odtworzenia – II (możliwe przy średnim nakładzie środków) - większość płatów wymaga odkrzaczenia, niektóre poprawy stosunków wodnych i/lub ograniczenia dopływu biogenów.

91D0 Bory i lasy bagienne

Na terenie obszaru natura 2000 Jeleniewo potwierdzono zaliczane do podtypu 91D0-2 siedliska sosnowego boru bagiennego *Vaccinio uliginosi-Pinetum* - wskazano 4 obiekty, w obrębie których stwierdzono występowanie siedliska 91D0. Ocena ogólna B, w tym reprezentatywność – B, względna powierzchnia – C, stan zachowania – B (struktura dobrze zachowana – II; stopień zachowania funkcji – II: perspektywy zachowania dobre; możliwość renaturyzacji/odtworzenia – II: przy średnim nakładzie sił i środków).

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe

Na terenie obszaru natura 2000 Jeleniewo obecność łągu jesionowo-olszowego *Fraxino-Alnetum*. w 7 lokalizacjach. Ocena ogólna B, w tym: reprezentatywność – B, względna powierzchnia – C, stan zachowania – B (struktura dobrze zachowana – II; stopień zachowania funkcji – II: perspektywy zachowania dobre; możliwość renaturyzacji/odtworzenia – II: przy średnim nakładzie sił i środków).

1188 Kumak nizinny (*Bombina bombina*)

Gatunek został potwierdzony na 36 stanowiskach w całym obszarze. Ocena ogólna B, w tym: populacja: ocena C, co stanowi <2% zasobów krajowych, stopień zachowania: ocena B – gatunek ten ma na terenie ostoi siedliska, które są zachowane w stopniu przynajmniej dobrym (stopień zachowania cech siedliska II).

1337 Bóbr europejski (*Castor fiber*)

Ocena ogólna B, w tym: populacja: ocena C (przedział $2\% \geq p > 0\%$); zachowanie - ocena B, w tym: stopień zachowania siedliska: II – elementy dobrze zachowane.

1903 Lipiennik Loesela (*Liparis loeselii*)

W obszarze stwierdzono obecność sześciu stanowisk gatunku Ocena ogólna – B w tym: populacja – C: zasoby lipiennika Loesela w granicach obszaru Natura 2000 Jeleniewo stanowią >2% łącznych zasobów tego gatunku na terenie Polski, stan zachowania – B: stopień zachowania cech siedliska – II (elementy dobrze zachowane); znaczna część populacji zlokalizowana jest w obrębie optymalnych dla gatunku siedlisk, na terenach o właściwych lub tylko nieznacznie zmienionych warunkach hydrologicznych, na torfowiskach niedotkniętych istotną ekspansją silnych konkurencyjnie gatunków roślin. Równocześnie na jednym ze stanowisk niepożądane byliny oraz krzewy i drzewa rozwijają się dynamicznie ze względu na zaburzenie układu hydrologicznego i okresowe przesychanie wierzchniej warstwy torfu. Możliwość odtworzenia – II (możliwe przy średnim nakładzie środków); poprawa warunków siedliskowych na stanowisku nr 4 jest możliwa, jednak wymaga umiarkowanych nakładów na wykonanie niezbędnych działań (ekspertyza hydrologiczne, poprawa warunków wodnych).

1355 Wydra (*Lutra lutra*)

Ocena ogólna B, w tym: populacja: ocena C (przedział $2\% \geq p > 0\%$); zachowanie - ocena B, w tym: stopień zachowania siedliska: II – elementy dobrze zachowane.

1318 Nocek łydkowłosy (*Myotis dasycneme*)

Głównym miejscem występowania gatunku jest kolonia rozrodcza zlokalizowana w drewnianym kościele w Jeleniewie. Ocena ogólna A, w tym: populacja - ocena C (przedział $100\% \geq p > 15\%$); zachowanie - ocena B, w tym: stopień zachowania siedliska: II – elementy dobrze zachowane.

1166 Traszka grzebieniasta (*Triturus cristatus*)

Gatunek został potwierdzony na 24 stanowiskach w całym obszarze. Ocena ogólna B, w tym: populacja: ocena C, co stanowi <2% zasobów krajowych, stan zachowania ocena B – gatunek ten ma na terenie ostoi siedliska, które są zachowane w stopniu przynajmniej dobrym (stopień zachowania cech siedliska II).

*Siedlisko 6510 i mopek zachodni oczekują na zgodę Komisji Europejskiej, co do ich wykreślenia z katalogu przedmiotów ochrony obszaru.

4.3. Zagrożenia, presje i działania mające wpływ na obszar

Najważniejsze oddziaływania i działalność mające duży wpływ na obszar

Oddziaływania negatywne

Poziom	Zagrożenia i presje [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnętrzne [i o b]
M	B01		i
M	A01		i
M	A05.01		i
H	E06		i
M	A07		i
L	E01.03		o
M	K02.03		i
M	K02.03		o
M	E04.01		i
M	C01.01		o
M	X		b
M	E04.01		o
M	E01.04		i
M	E03		i
M	C01.01		i
M	E03		o
H	E06		o

Oddziaływania pozytywne

Poziom	Działania, zarządzanie [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnętrzne [i o b]
M	B01		i
M	A05.01		i
M	A03		i
M	A03		o
M	A01		i
M	A04		i
M	X		b

Poziom: H = wysoki, M = średni, L = niski.

Zanieczyszczenie: N = stosowanie azotu, P = stosowanie fosforu/fosforanów, A = stosowanie kwasów/zakwaszanie, T = toksyczne chemikalia nieorganiczne,

O = toksyczne chemikalia organiczne, X = zanieczyszczenia mieszane.

i = wewnętrzne, o = zewnętrzne, b = jednocześnie.

4.4. Własność (opcjonalnie)

Typ	[%]
Publiczna	Krajowa/federalna
	0
	Kraj
	0
Publiczna	związkowy/województwo
	0
Publiczna	Lokalna/gminna
	0
Publiczna	Inna publiczna
	0
Własność łączna lub współwłasność	
0	
Prywatna	
0	
Nieznana	
100	

Suma	100
------	-----

4.5. Dokumentacja (opcjonalnie)

1. Instytut Badawczy Leśnictwa red. Falencka-Jabłońska M. 2011. (zmiany TOS ProHabitat, 2015) Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 Ostoja w Dolinie Górnego Nurca PLH200021 w województwie podlaskim. 2. Zapart A. 2014. Ochrona nocka łydkowłosego na obszarze Natura 2000 Jeleniewo i na Suwalszczyźnie– wyniki badań i efekty ekologiczne zadania. 3. Błachowski G. 2015. Zimowa inwentaryzacja nietoperzy na obszarze Natura 2000 Jeleniewo PLH200001. 4. Błachowski G., Kamocki A. 2020. Monitoring stanu ochrony z użyciem telemetrii nocka łydkowłosego *Myotis dasycneme* w obszarze Natura 2000 Jeleniewo PLH 200001. 5. Kołos A., Matowicka B., Kucharzyk J., Kamocki A. 2021. Ekspertyza na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o siedliskach przyrodniczych oraz uwarunkowaniach ich ochrony w Obszarze Natura 2000 Jeleniewo PLH200001 (3140, 6210, 6510. 91D0, 91E0). 6. Kucharzyk J., Mazurkiewicz M. 2021. Ekspertyza mająca na celu uzupełnienia stanu wiedzy o lipienniku *Loesela Liparis loeselii* w Obszarze Natura 2000 Jeleniewo PLH200001. 7. Tomasik Ł. i in 2021. Ekspertyza mająca na celu uzupełnienia stanu wiedzy o płazach w Obszarze Natura 2000 Jeleniewo PLH200001.

5. STATUS OCHRONY OBSZARU (OPCJONALNIE)

5.1. Istniejące formy ochrony na poziomie krajowym i regionalnym:

[Powrót](#)

Kod	Pokrycie [%]	Kod	Pokrycie [%]	Kod	Pokrycie [%]
PL04	98.41	PL03	0.0		

5.2. Powiązanie opisanego obszaru z innymi formami ochrony:

na poziomie krajowym lub regionalnym:

Kod rodzaju	Nazwa terenu	Rodzaj	Pokrycie [%]
PL03	Suwalski Park Krajobrazowy	*	0.0
PL04	Pojezierze Północnej Suwalszczyzny	*	98.41

6. ZARZĄDZANIE OBSZAREM

6.1. Organ lub organy odpowiedzialne za zarządzanie obszarem:

[Powrót](#)

Organizacja:	Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku
Adres:	Polska Dojlidy Fabryczne 23 15-554 Białystok
Adres e-mail:	sekretariat@bialystok.rdos.gov.pl

6.2. Plan(-y) zarządzania:

Aktualny plan zarządzania istnieje:

☒ Tak	Nazwa: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jeleniewo PLH200001 Link: https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/legalact/2014/1771/
---	--

Nazwa: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 26 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jeleniewo PLH200001

Link: <https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/legalact/2016/1991/>

Nazwa: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 2 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jeleniewo PLH200001

Link: <https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/legalact/2019/1910/>

☐ Nie, ale jest w przygotowaniu

☐ Nie

7. MAPA OBSZARU

[Powrót](#)

Nr ID INSPIRE:

PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH200001

Mapa załączona jako plik PDF w formacie elektronicznym (opcjonalnie)

☒ Tak ☐ Nie

Odniesienie lub odniesienia do oryginalnej mapy wykorzystanej przy digitalizacji granic elektronicznych (opcjonalnie)