



NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

dla obszarów specjalnej ochrony (OSO),
proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (pOZW),
obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW) oraz
specjalnych obszarów ochrony (SOO)

OBSZAR PLH220011
NAZWA
OBSZARU Jar Rzeki Raduni

ZAWARTOŚĆ

- [1. IDENTYFIKACJA OBSZARU](#)
- [2. POŁOŻENIE OBSZARU](#)
- [3. INFORMACJE PRZYRODNICZE](#)
- [4. OPIS OBSZARU](#)
- [5. STATUS OCHRONY OBSZARU](#)
- [6. POWIĄZANIA OBSZARU](#)
- [7. MAPA OBSZARU](#)

1. IDENTYFIKACJA OBSZARU

1.1. Typ B	1.2. Kod obszaru PLH220011	Powrót
---------------	-------------------------------	------------------------

1.3. Nazwa obszaru

Jar Rzeki Raduni

1.4. Data opracowania 2001-05	1.5. Data aktualizacji 2024-03
----------------------------------	-----------------------------------

1.6. Instytucja lub osoba przygotowująca wniosek:

Nazwisko/Organizacja:	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Adres:	Polska Al. Jerozolimskie 136 Warszawa 02-305
Adres e-mail:	kancelaria@gdos.gov.pl

Data zaproponowania obszaru jako OZW:	2004-04
Data zatwierdzenia obszaru jako OZW(*):	2008-01
Data objęcia obszaru ochroną SOO:	2022-01
Krajowe odniesienie prawne dla formy ochrony SOO:	rozp. MKiŚ z dn. 19 października 2021 r. w spr. soo Jar Rzeki Raduni (PLH220011)

Wyjaśnienia:	Zmiana granic 12.2012 r. (zmniejszenie)
--------------	---

2. POŁOŻENIE OBSZARU

2.1. Położenie centralnego punktu [wartości dziesiętne stopni]:

[Powrót](#)

Długość geograficzna
18.3075

Szerokość geograficzna
54.3058

2.2. Powierzchnia [ha]:
85.82

2.3. Obszar morski [%]
0.0

2.5. Kod i nazwa regionu administracyjnego

Kod poziomu NUTS 2

Nazwa regionu

PL63

Pomorskie

2.6. Region biogeograficzny

Kontynentalny (100.0
%)

3. INFORMACJE PRZYRODNICZE

3.1. Typy siedlisk przyrodniczych występujących na terenie obszaru i ocena znaczenia obszaru dla tych siedlisk:

[Powrót](#)

Typy siedlisk wymienione w załączniku I						Ocena obszaru			
Kod	PF	NP	Pokrycie [ha]	Jaskinie [liczba]	Jakość danych	A B C D	A B C		
						Reprezentatywność	Powierzchnia względna	Stan zachowania	Ocena ogólna
3150			0.49		G	D			
6430			0.88		M	A	C	A	C
6510			0.86		G	D			
7230			0.18		M	D			
9160			51.38		G	C	C	C	C
91E0			3.6		G	B	C	B	B
91F0			10.64		G	B	C	B	B

- PF: dla typów siedlisk, do których mogą odnosić się zarówno formy priorytetowe, jak i niepriorytetowe (6210, 7130, 9430) należy wpisać „x” w kolumnie PF celem wskazania formy priorytetowej.
- NP: jeśli dany typ siedliska nie istnieje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Pokrycie: można wpisywać z dokładnością do wartości dziesiętnych.
- Jaskinie: w przypadku siedlisk typu 8310 i 8330 (jaskinie) należy podać liczbę jaskiń, jeśli nie są dostępne szacunkowe dane na temat powierzchni.
- Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. zgrubne dane szacunkowe).

3.2. Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 2009/147/WE i gatunki wymienione w załączniku II do dyrektywy 92/43/EEG oraz ocena znaczenia obszaru dla tych gatunków

Gatunki					Populacja na obszarze					Ocena obszaru			
Grupa	Kod	Nazwa naukowa	S	NP	Typ	Wielkość		Jednostka	Kategoria	Jakość danych	A B C D	A B C	
						Min	Maks		C R V P		Populacja	Stan zachowania	Izolacja
P	1902	Cypripedium calceolus			p				V	M	D		
M	1355	Lutra lutra			p				P	M	D		
I	1037	Ophiogomphus cecilia			p				P	DD	D		
I	1032	Unio crassus			p				P	M	C	C	C

- Grupa: A = płazy, B = ptaki, F = ryby, I = bezkręgowce, M = ssaki, P = rośliny, R = gady.
- S: jeśli dane o gatunku są szczególnie chronione i nie mogą być udostępnione publicznie, należy wpisać „tak”.
- NP: jeśli dany gatunek nie występuje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Typ: p = osiadłe, r = wydające potomstwo, c = przelotne, w = zimujące (w przypadku roślin i gatunków niemigrujących należy użyć terminu „osiadłe”).
- Jednostka: i = osobniki pojedyncze, p = pary lub inne jednostki według standardowego wykazu jednostek i kodów zgodnego ze sprawozdawczością na podstawie art. 12 i 17 (zob. [portal referencyjny](#)).
- Kategorie liczebności (kategoria): C = powszechne, R = rzadkie, V = bardzo rzadkie, P = obecne - wypełnić, jeżeli brak jest danych (DD), lub jako uzupełnienie informacji o wielkości populacji.
- Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. zgrubne dane szacunkowe); DD = brak danych (kategorię tę należy stosować wyłącznie, jeśli nie da się dokonać nawet zgrubnej oceny wielkości populacji - w takiej sytuacji można pozostawić puste pole dotyczące wielkości populacji, jednak pole „Kategorie liczebności” musi być wypełnione).

4. OPIS OBSZARU

4.1. Ogólna charakterystyka obszaru

[Powrót](#)

Klasa siedliska przyrodniczego	Pokrycie [%]
N17	62.0
N19	37.98
N12	0.03
Ogółem pokrycia siedliska przyrodniczego	100

Dodatkowa charakterystyka obszaru:

Przebieg granic obszaru Natura 2000 Jar Rzeki Raduni PLH220011 pokrywa się z przebiegiem granic rezerwatu przyrody o tej samej nazwie. Obszar obejmuje przełomowy odcinek rzeki o długości ok. 6 km Raduni (o charakterze rzeki górskiej), osłonięty z obu stron lasami, stanowiący dobrze zachowany kompleks krajobrazowy (fizjocenozę) doliny rzecznej, złożony z wielu typów naturalnych i półnaturalnych biogeocenoz (ekosystemów): leśnych, wodnych, szuwarowych, łąkowych i ziołoroślowych. Rzeka płynie dnem kamienistego jaru, tworząc meandry. Obserwuje się tu niemal wszystkie podstawowe procesy, typowe dla przełomowych odcinków rzek na terenach młodoglacjalnych: stokowe i fluwialne (m.in. erozji rzecznej). Dolina i strome zbocza (do 45 st. nachylenia) o wysokości do 40 m, porośnięte są lasem liściastym (grądy, łągi); miejscami na dnie wąwozu występują podmokłe łąki i ziołorośla. Ostoja ma specyficzny mikroklimat, o

wysokiej wilgotności i niższych temperaturach w porównaniu z przyległymi terenami. Przełom rzeki rozcina rozległy kompleks leśny, w którym dominują siedliska grądowe.

Dużą wartość przedstawia także flora tego terenu, w tym liczne lub bardzo liczne populacje gatunków ściśle chronionych, m.in. tojadą dzióbatego *Aconitum variegatum*, wawrzynka wilczytka *Daphne mezereum*, lili żłotogłów *Lilium martagon*, pełnika europejskiego *Troillus europaeus* i listery jajowatej *Listera ovata*.

Najcenniejszym walorem florystycznym obszaru jest bogate skupienie roślin górskich (co najmniej 10 gatunków), zwłaszcza liczne populacje przewiercienia długolistnego *Bupleurum longifolium* i żebrowca górskiego *Pleurospermum austriacum*. Liczne elementy podgórsko-górskie i borealno-górskie odnotowano również w faunie obszaru Natura 2000, do najciekawszych należą chrząszcz rozpucz lepiężnikowiec *Liparis glabrioris* (jedno z czterech stanowisk na Niżu Polskim) i widelnica *Rhabdiopteryx acuminata* (jedno z dwóch stanowisk na Niżu). Szczególnie cenne są biocenozy wodne rzeki Raduni, cechujące się dobrze wykształconym bentosem (bogate gatunkowo zgrupowania reofilnych małży, ważek, jętek, widelnic i chrząszków, obfitujące w gatunki rzadkie i zagrożone), peryfitonem (w tym obecnością chronionego krasnorostu *Hildebrandia rivularis*), zbiorowiskami rdestnic (m.in. regionalnie narażoną rdestnicą alpejską *Potamogeton alpinus*), litofilną ichtiofauną i specyficznymi dla tego siedliska gatunkami ptaków (zimorodek *Alcedo atthis*, pliszka górska *Motacilla cinerea*).

Obszar stanowi jedną z najważniejszych w regionie ostoję gatunków puszczańskich, zwłaszcza związanych z wielkogabarytowym martwym drewnem, które od pewnego czasu nie jest w ogóle usuwane z obszaru, a także ze starymi drzewostanami o charakterze zbliżonym do naturalnego. Do grupy tej – obfitującej w taksony rzadkie, zagrożone lub chronione – należą liczne mszaki (m.in. ściśle chronione *Neckera complanata* i *Homalia trichomanoides*), grzyby wielkoowocnikowe (w tym, posiadający tu jedno z dwóch stanowisk na Pomorzu, czyreń osikowy *Phellinus tremulae*), porosty (ściśle chroniony, wymagający ochrony strefowej granicznik płucnik *Lobaria pulmonaria*) i owady (chrząszcze z rodziny kózkowatych *Anoplodera sexguttata* i *Saperda perforata*). Zbliżonej do naturalnej strukturze niektórych drzewostanów obszar zawdzięcza również bardzo bogate gatunkowo zgrupowanie ptaków lęgowych (50 gatunków), z licznym udziałem taksonów typowych dla starodrzewi (np. muchołówka mała *Ficedula parva*).

Z terenu ostoi wykazano 576 gatunków roślin naczyniowych (aktualnie 556 gatunków), 139 gatunków mszaków (aktualnie 113 gatunków), 1 gatunek makroskopowego glona, 195 gatunków grzybów wielkoowocnikowych, 8 gatunków mikrogrzybów nielichenizowanych, 147 gatunków porostów (w tym 139 gatunków po roku 1996), 315 gatunków owadów (nie licząc notowań XIX-wiecznych; aktualnie 251 gatunków), 74 gatunki mięczaków (aktualnie 31 gatunków), 7 gatunków pierścienic, 1 gatunek gąbki, 3 gatunki wypławków, 5 gatunków skorupiaków, 9 gatunków ryb, 2 gatunki płazów, 1 gatunek gada, 69 gatunków ptaków (aktualnie 68 gatunków) oraz 31 gatunków ssaków (aktualnie 27 gatunków). W trakcie prac nad planem zidentyfikowano tu również 27 jednostek roślinności, w tym 11 w randze zespołu. Spośród nich aktualnie występuje tu co najmniej 141 gatunków ściśle chronionych (16 roślin naczyniowych, 8 mszaków, 1 glon, 4 grzyby wielkoowocnikowe, 23 porosty, 7 owadów, 1 małż, 3 ryby, 2 płazy, 1 gad, 64 ptaki i 11 ssaków, w tym 6 nietoperzy), 97 gatunków ginących lub zagrożonych w Polsce (5 roślin naczyniowych, 2 mszaki, 27 grzybów wielkoowocnikowych, 40 porostów, 14 owadów, 3 małże, 1 pijawka, 1 skorupiak i 3 ryby) oraz 73 gatunki ginące i zagrożone na Pomorzu Gdańskim (45 roślin naczyniowych i 28 porostów).

4.2. Jakość i znaczenie

9160 – Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)

Obszar Natura 2000 PLH220011 „Jar Rzeki Raduni” stanowi jedną z najważniejszych w województwie pomorskim ostoję siedliska 9160. Siedlisko zajmuje powierzchnię 45,17 ha (Ciechanowski i in. 2011).

Siedlisko tworzy żyzny, wielogatunkowy las z wyjątkowo bogatym florystycznie runem, miejscami w różnym stopniu zdegenerowany przez nasadzenia gatunków iglastych. Zbiorowisko klimaksowe na zboczach doliny rzeki Raduni. Stopień zachowania struktury (II), ogólna ocena stanu zachowania C – średni lub zdegradowany.

91E0 – Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (*Salicetum albae*, *Populetum albae*, *Alnenion glutinoso-incanae*, olsy źródliskowe)

Siedlisko stanowią łęgi olszowe na I terasie zalewowej z bogatym runem ziołoroślowym i prawie stałym udziałem czeremchy w podszyciu, miejscami przekształcają się w fitocenozy grądowe (Ciechanowski i in. 2011). Stopień zachowania struktury (II), Stopień zachowania funkcji oceniono w kategorii (II). Ocena stanu zachowania B – dobry, ocena ogólna

B – dobra.

91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (*Ficario-Ulmetum*)

W obszarze występują naturalne fitocenozy łęgowe z bogatym runem ziołoroślowym, bez udziału gatunków

bagiennych i drzewostanach z dominacją olszy czarnej, rzadziej szarej, czeremchy i innych gatunków domieszkowych. W wielu miejscach ma miejsce dojrzewanie młodych fitocenoz oraz regeneracja płatów o zniekształconym drzewostanie (Ciechanowski i in. 2011). Stopień zachowania struktury (II), Stopień zachowania funkcji oceniono w kategorii (II). Ocena stanu zachowania B – dobry, ocena ogólna B – dobra. 3150–Starorzeczka i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z *Nympheion*, *Potamion* Powierzchnia siedliska w obszarze wynosi 0,49 ha. Płaty siedliska stanowią dawne meandry Raduni o różnym stopniu odcięcia od koryta. Dominują w nich zbiorowiska pleustonowe, rzadko szuwarowe, zanurzone makrofity spotyka się wyjątkowo. Brak szuwarów trzcinowych na obrzeżach, zwykle otoczenie stanowią lasy łęgowe i olsy. Stan zachowania: FV – właściwy (Ciechanowski i in. 2011). Biorąc pod uwagę niewielką powierzchnię siedliska w obszarze tj. 0.49 ha – reprezentatywność siedliska określono na D - nieznacząca.

6510 – Ekstensywnie użytkowane niżowe łąki świeże (*Arrhenatherion*)

W obszarze Natura 2000 Jar Rzeki Raduni PLH220011 siedlisko 6510 reprezentowane jest przez 2 płaty. Są to dawne ekstensywne łąki kośne, obecnie nieużytkowane. Aktualnie bardzo zubożony skład gatunkowy. Stan zachowania oceniono na U2 – zły. Oceniono również, iż w przypadku tego siedliska istnieje wysokie prawdopodobieństwo zaniku z powodu braku ekstensywnego użytkowania (koszenia). Głównym zagrożeniem dla siedliska jest brak czynnej ochrony w postaci użytkowania kośnego czego skutkiem jest stopniowe ubożenie składu gatunkowego i nasilająca się degeneracja; wtórna sukcesja roślinności prowadząca do rozwoju lasu (Ciechanowski i in. 2011). Reprezentatywność siedliska w obszarze oceniono na D - nieznacząca.

1032 Skójką gruboskorupowa *Unio crassus*

Małż notowany na całej długości odcinka rzeki Raduni w obszarze, osiągający zagęszczenia populacji 2,2-17,0 osobnika/m². Populacja *Unio crassus* stwierdzona w rzece Raduni w granicach obszaru Natura 2000 Jar Rzeki Raduni PLH22011 charakteryzuje się optymalnymi parametrami biologicznymi (liczebność, struktura wiekowa, struktura wielkości ciała) i można ją określić jako stan właściwy (FV), choć w obszarze nie prowadzono monitoringu gatunku wg metodyki GIOŚ.

1037 Trzepla zielona *Ophiogomphus cecilia*

Gatunek ważki występujący na całej długości odcinka rzeki Raduni w obszarze i odbywający rozród w jej wodach, czego dowodem są znalezione wylinki. Populacja *Ophiogomphus cecilia* stwierdzona w granicach obszaru Natura 2000 „Jar Rzeki Raduni” charakteryzuje się optymalnymi parametrami biologicznymi i można ją określić jako stan właściwy (FV), choć w obszarze Natura 2000 nie prowadzono monitoringu tego gatunku wg metodyki GIOŚ. Wysoko oceniona zostało jakość siedliska – wszystkie jego komponenty istotne dla trzepli zielonej ocenione zostały jako właściwe (FV) (Ciechanowski i in. 2011). Reprezentatywność gatunku w obszarze D - nieznacząca.

1355 wydra *Lutra lutra*

W rezerwacie Jar Rzeki Raduni stwierdzono 2 stanowiska wydry, co odpowiada przeciętnemu zagęszczeniu tego gatunku w warunkach Europy Środkowej (1-2 osobnik/10 km cieku), przez co stan zachowania lokalnej populacji (mimo braku badań wg. metodyki GIOŚ) oceniono jako właściwy, przy bardzo korzystnych parametrach siedliskowych (Ciechanowski i in. 2011). Nie daje to jednak podstaw do zmiany oceny ogólnej. Reprezentatywność gatunku w obszarze D – nieznacząca.

1902 – Obuwik pospolity – *Cypripedium calceolus*

Obuwik pospolity w obszarze Jar Rzeki Raduni jest gatunkiem skrajnie nielicznym. Aktualnie posiada 1 stanowisko nieopodal północnej granicy rezerwatu, w 2010 r. reprezentowane przez 1 płonnego osobnika; stan ochrony należy ocenić jako zły (U2). Nie potwierdzono występowania obuwika na stanowiskach wymienianych przez Piotrowską i Stasiak (1982). Nie prowadzono monitoringu gatunku wg metodyki GIOŚ (Ciechanowski i in. 2011). Reprezentatywność gatunku w obszarze D – nieznacząca.

4.3. Zagrożenia, presje i działania mające wpływ na obszar

Najważniejsze oddziaływania i działalność mające duży wpływ na obszar

Oddziaływania negatywne			
	Zagrożenia i presje	Zanieczyszczenie (opcjonalnie)	Wewnętrzne

Poziom	[kod]	[kod]	zewnątrzne [i o b]
M	X		b
M	E03		b
H	G01		i
L	J03		i
L	F04		i
L	F02		i
M	B02		i
H	G05.01		i
M	J02		b

Oddziaływania pozytywne

Poziom	Działania, zarządzanie [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnątrzne [i o b]
M	X		b

Poziom: H = wysoki, M = średni, L = niski.

Zanieczyszczenie: N = stosowanie azotu, P = stosowanie fosforu/fosforanów, A = stosowanie kwasów/zakwaszanie, T = toksyczne chemikalia nieorganiczne,

O = toksyczne chemikalia organiczne, X = zanieczyszczenia mieszane.

i = wewnętrzne, o = zewnętrzne, b = jednocześnie.

4.4. Własność (opcjonalnie)

Typ		[%]
Publiczna	Krajowa/federalna	0
	Kraj	0
	związkowy/województwo	0
	Lokalna/gminna	0
	Inna publiczna	0
Własność łączna lub współwłasność		0
Prywatna		0
Nieznana		100
Suma		100

4.5. Dokumentacja (opcjonalnie)

[1] Augustowski B. (red.). 1979. Pojezierze Kaszubskie. Gdańskie Tow. Nauk., Wydz. V Nauk o Ziemi. ss.602.GDLP 2007 Inwentaryzacja przyrodnicza. baza danych INVENT[2] Ciechanowski i in. 2011 Projekt Planu Ochronnych rezerwatu przyrody Jar Rzeki Raduni" uwzględniający projekt planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 Jar Rzeki Raduni PLH220011 Gdańsk.[3] Herbich J. 1998. Jar Raduni. Geneza przełomu. Związek roślinności z wiekiem stoków. W: J. Herbich, M. Herbichowa (red.). Szata roślinna Pomorza - różnicowanie, dynamika, zagrożenia, ochrona. Przew. sesji teren. 51 Zjazdu PTB. 15-19.IX.1998.Wyd. Uniw. Gdańskiego, Gdańsk.[4] Herbich J. 1998. Jar Raduni. Zmiany, zagrożenia i podstawowe problemy ochrony szaty roślinnej. W: J. Herbich, M.Herbichowa (red.). Szata roślinna Pomorza - różnicowanie, dynamika, zagrożenia, ochrona. Przew. sesji teren. 51 Zjazdu PTB. 15-19.IX.1998. Wyd. Uniw. Gdańskiego, Gdańsk.[5] Herbich J., Herbichowa M. 1998. Jar Raduni. Naturalne zbiorowiska leśne. W: J. Herbich, M. Herbichowa (red.). Szataroślinna Pomorza - różnicowanie, dynamika, zagrożenia, ochrona. Przew. sesji teren. 51 Zjazdu PTB.15-19.IX.1998. Wyd.Uniw. Gdańskiego, Gdańsk.[6] Herbich J., Markowski R. 1998a. Jar Raduni. Flora roślin naczyniowych ze szczególnym uwzględnieniem gatunków górskich. W: J. Herbich, M. Herbichowa (red.). Szata roślinna Pomorza - różnicowanie, dynamika, zagrożenia, ochrona. Przew. sesji teren. 51 Zjazdu PTB. 15-19.IX.1998. Wyd. Uniw. Gdańskiego, Gdańsk.[7] Herbich M., Herbich J.

1982. antropogeniczne przekształcenia zbiorowisk leśnych rezerwatu "Jar rzeki Raduni" na Pojezierzu Kaszubskim. Zesz. Nauk. Wydz. BiNoZ UG, Biol. 3: 19-35.[8] Kończyk A., Schmid K. 1992. Przyczynek do poznania fauny ssaków rezerwatu Jar Rzeki Raduni. Chrońmy Przyr. Ojcz. 48:583-87.[9] Piotrowska H. (red.). 1982. Szata roślinna rezerwatu Jar Rzeki Raduni na Pojezierzu Kaszubskim. Ochr. Przyr. 44: 21-64.[10] Piotrowska H., Stasiak J. 1984. Rośliny naczyniowe rezerwatu Jar rzeki Raduni na Pojezierzu Kaszubskim. Zesz. Nauk. Wydz. BiNoZ UG, Biol. 5: 93-124. [11] Piotrowska H., Stasiak J. 1984. Rośliny naczyniowe rezerwatu Jar rzeki Raduni na Pojezierzu Kaszubskim. Zesz. Nauk. Wydz. BiNoZ UG, Biol. 5: 93-124.

5. STATUS OCHRONY OBSZARU (OPCJONALNIE)

5.1. Istniejące formy ochrony na poziomie krajowym i regionalnym:

[Powrót](#)

Kod	Pokrycie [%]	Kod	Pokrycie [%]	Kod	Pokrycie [%]
PL02	100.0	PL04	100.0		

5.2. Powiązanie opisanego obszaru z innymi formami ochrony:

na poziomie krajowym lub regionalnym:

Kod rodzaju	Nazwa terenu	Rodzaj	Pokrycie [%]
PL04	Kartuski	*	0.05
PL02	Jar Rzeki Raduni	*	100.0
PL04	Doliny Raduni	*	99.95

6. ZARZĄDZANIE OBSZAREM

6.1. Organ lub organy odpowiedzialne za zarządzanie obszarem:

[Powrót](#)

Organizacja:	Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
Adres:	Polska Chmielna 54/57 80-748 Gdańsk
Adres e-mail:	sekretariat.gdansk@rdos.gov.pl

6.2. Plan(-y) zarządzania:

Aktualny plan zarządzania istnieje:

☒	Tak	Nazwa: Zarządzenie nr 28/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 28 września 2012r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Jar Rzeki Raduni" Link: http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2012/3434/akt.pdf
☐	Nie	Nazwa: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 04 lipca 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Jar Rzeki Raduni" Link: http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2016/2552/akt.pdf

☐ Nie, ale jest w przygotowaniu

☐ Nie

7. MAPA OBSZARU

[Powrót](#)

Nr ID INSPIRE:

PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH220011

Mapa załączona jako plik PDF w formacie elektronicznym (opcjonalnie)

☒ Tak ☐ Nie

Odniesienie lub odniesienia do oryginalnej mapy wykorzystanej przy digitalizacji granic elektronicznych (opcjonalnie)