



NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

dla obszarów specjalnej ochrony (OSO),
proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (pOZW),
obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW) oraz
specjalnych obszarów ochrony (SOO)

OBSZAR PLH220088

NAZWA
OBSZARU Dąbrówka

ZAWARTOŚĆ

- [1. IDENTYFIKACJA OBSZARU](#)
- [2. POŁOŻENIE OBSZARU](#)
- [3. INFORMACJE PRZYRODNICZE](#)
- [4. OPIS OBSZARU](#)
- [6. POWIĄZANIA OBSZARU](#)
- [7. MAPA OBSZARU](#)

1. IDENTYFIKACJA OBSZARU

1.1. Typ B	1.2. Kod obszaru PLH220088	Powrót
---------------	-------------------------------	------------------------

1.3. Nazwa obszaru

Dąbrówka

1.4. Data opracowania 2009-03	1.5. Data aktualizacji 2024-03
----------------------------------	-----------------------------------

1.6. Instytucja lub osoba przygotowująca wniosek:

Nazwisko/Organizacja:	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Adres:	Polska Al. Jerozolimskie 136 Warszawa 02-305
Adres e-mail:	kancelaria@gdos.gov.pl

Data zaproponowania obszaru jako OZW:	2009-10
Data zatwierdzenia obszaru jako OZW(*):	2012-01
Data objęcia obszaru ochroną SOO:	2022-01
Krajowe odniesienie prawne dla formy ochrony SOO:	rozp. MKiŚ z dn. 19 października 2021 r. w spr. soo Dąbrówka (PLH220088)

2. POŁOŻENIE OBSZARU

2.1. Położenie centralnego punktu [wartości dziesiętne stopni]:

Długość geograficzna
18.0834

Szerokość geograficzna
54.1659

2.2. Powierzchnia [ha]:

2.3. Obszar morski [%]

504.59

0.0

2.5. Kod i nazwa regionu administracyjnego

Kod poziomu NUTS 2

Nazwa regionu

PL63	Pomorskie
------	-----------

2.6. Region biogeograficzny

Kontynentalny (100.0 %)

3. INFORMACJE PRZYRODNICZE

3.1. Typy siedlisk przyrodniczych występujących na terenie obszaru i ocena znaczenia obszaru dla tych siedlisk:

Typy siedlisk wymienione w załączniku I						Ocena obszaru			
Kod	PF	NP	Pokrycie [ha]	Jaskinie [liczba]	Jakość danych	A B C D	A B C		
						Reprezentatywność	Powierzchnia względna	Stan zachowania	Ocena ogólna
3160			11.02		G	C	C	B	C
6230			3.07		G	C	C	C	C
7140			10.36		G	B	C	B	B
9110			22.3		G	C	C	C	C

- PF: dla typów siedlisk, do których mogą odnosić się zarówno formy priorytetowe, jak i niepriorytetowe (6210, 7130, 9430) należy wpisać „x” w kolumnie PF celem wskazania formy priorytetowej.
- NP: jeśli dany typ siedliska nie istnieje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Pokrycie: można wpisywać z dokładnością do wartości dziesiętnych.
- Jaskinie: w przypadku siedlisk typu 8310 i 8330 (jaskinie) należy podać liczbę jaskiń, jeśli nie są dostępne szacunkowe dane na temat powierzchni.
- Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. zgrubne dane szacunkowe).

3.2. Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 2009/147/WE i gatunki wymienione w załączniku II do dyrektywy 92/43/EEG oraz ocena znaczenia obszaru dla tych gatunków

[illegible]

					Min	Maks		C R V P		Populacja	Stan zachowania	Izolacja	Ogólnie
P	1831	Luronium natans		p	100	200	i		M	C	B	C	C
F	6236	Rhynchocypris percursus		p				C	M	B	B	A	B

- Grupa: A = płazy, B = ptaki, F = ryby, I = bezkręgowce, M = ssaki, P = rośliny, R = gady.
- S: jeśli dane o gatunku są szczególnie chronione i nie mogą być udostępnione publicznie, należy wpisać „tak”.
- NP: jeśli dany gatunek nie występuje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Typ: p = osiadłe, r = wydające potomstwo, c = przelotne, w = zimujące (w przypadku roślin i gatunków niemigrujących należy użyć terminu „osiadłe”).
- Jednostka: i = osobniki pojedyncze, p = pary lub inne jednostki według standardowego wykazu jednostek i kodów zgodnego ze sprawozdawczością na podstawie art. 12 i 17 (zob. [portal referencyjny](#)).
- Kategorie liczebności (kategoria): C = powszechne, R = rzadkie, V = bardzo rzadkie, P = obecne - wypełnić, jeżeli brak jest danych (DD), lub jako uzupełnienie informacji o wielkości populacji.
- Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. zgrubne dane szacunkowe); DD = brak danych (kategorię tę należy stosować wyłącznie, jeśli nie da się dokonać nawet zgrubnej oceny wielkości populacji - w takiej sytuacji można pozostawić puste pole dotyczące wielkości populacji, jednak pole „Kategorie liczebności” musi być wypełnione).

4. OPIS OBSZARU

4.1. Ogólna charakterystyka obszaru

[Powrót](#)

Klasa siedliska przyrodniczego	Pokrycie [%]
N19	18.03
N17	20.69
N12	61.28
Ogółem pokrycia siedliska przyrodniczego	100

Dodatkowa charakterystyka obszaru:

Ostoja położona jest na Pojezierzu Kaszubskim, pomiędzy Kłobuczynem, Śledziową Hutą a Dąbrówką, w powiecie kościerskim. Obejmuje fragment obszaru sandrowego i wysoczyzny morenowej o rzeźbie pagórkowatej i falistej z licznymi zagłębieniami, pierwotnie w większości bezodpływowymi powierzchniowo. Zagłębienia te są wypełnione torfowiskami i zbiornikami wodnymi. Stanowią one najbardziej wartościowe fragmenty ostoi. Największe torfowiska, w części wyeksploatowane, w części regenerujące, znajdują się na południowy-zachód od Kłobuczyna oraz na północny-wschód od Dąbrówki. Niektóre z torfowisk włączone są sztucznie w system odpływu powierzchniowego za pomocą rowów. Część zbiorników powstała w wyniku eksploatacji torfu. W obrębie torfowisk, regenerujących potorfi i obrzeży zbiorników wodnych występuje zróżnicowana roślinność mszarna z klasy Scheuchzerio-Caricetea nigrae. Tereny w otoczeniu torfowisk i zbiorników wodnych (w granicach zlewni bezpośrednich i terenów do nich przylegających) są w różny sposób użytkowane. W północnej i zachodniej części ostoi dominują lasy. Są to głównie lasy porolne oraz leśne zbiorowiska zastępcze, głównie z sosną w drzewostanach. Miejscami występuje kwaśna buczyna niżowa Luzulo pilosae-Fagetum. W południowej, centralnej i wschodniej części obszaru występują głównie pola uprawne, nieużytki, pastwiska oraz łąki. W ostoi znajdują się też niewielkie powierzchnie terenów zabudowanych Dąbrówki i Śledziowej Huty oraz pojedyncze rozproszone gospodarstwa rolne i zabudowania letniskowe, a także stary nieczynny cmentarz. W skład obszaru wchodzi kilka zbiorników ze strzeblą błotną (w tym kompleks częściowo połączonych mniejszych zbiorników), przy czym dwa z nich ("Dąbrówka II", "Kłobuczyno") to najprawdopodobniej największe w Polsce akweny zasiedlone przez strzeblę błotną.

Wielkość zbiorników waha się od 0,75 ha do 5,20 ha (razem 10 ha), a ich maksymalna głębokość sięga 2 m. Największy zbiornik "Dąbrówka II" jest dobrze zachowanym torfowiskiem, z wieloma połączonymi ze sobą basenami i wyraźnymi śladami dawniejszej eksploatacji torfu. W zbiornikach zaobserwowano liczne występowanie strzebli błotnej *Eupallasella perenurus*. Ponadto w wytypowanych akwenach stwierdzono występowanie karasia pospolitego *Carassius carassius* i karasia srebrzystego *Carassius gibelio*, a w jednym z nich słonecznicy *Leucaspis delineatus*. Bezpośrednie otoczenie zbiorników stanowi głównie las lub zadrzewienia, rzadziej pola uprawne. W jednym ze zbiorników, położonym około 350 m na NNE od głównego skrzyżowania dróg w Dąbrówce, występuje elisma wodna *Luronium natans* (stanowisko stwierdzone w 2008 r.). Populacja liczy obecnie 9 osobników, a perspektywy jej zachowania są niezadowalające. Towarzyszy jej jeżogłówka pokrewna *Sparganium angustifolium*. Jezioro jest niewielkie, z mszarem z *Comarum palustre* i *Carex rostrata* w części zachodniej oraz szeroką strefą szuwaru turzycy zaostrej *Carex rostrata* w pozostałej części zbiornika. Otwarta tafla jeziora częściowo zajęta jest przez płyty roślinności wodnej z udziałem *Potamogeton natans*.

4.2. Jakość i znaczenie

Przedmiotem ochrony w obszarze są 4 siedliska przyrodnicze (3160, 6230, 7140, 9110), elisma wodna oraz strzebla błotna.

3160 – Naturalne dystroficzne zbiorniki wodne:

Powierzchnia siedliska na większości badanych stanowisk nie podlega zmianom, na dwóch stanowiskach ulega powolnemu zarastaniu. Na podstawie dokumentacji do planu zadań ochronnych [Katewicz i in. 2013] określono stan zachowania siedliska określono jako FV, a jego reprezentatywność sklasyfikowano jako znaczącą (C). Stopień zachowania struktury oceniono jako dobrze zachowany (ocena II), również funkcja siedliska w obszarze wskazuje na dobre perspektywy zachowania (ocena II). Jedynie stanowisko Zbiornik Dąbrówka 2 z pięciu stanowisk uzyskał ocenę niezadowalającą (U1). Ogólny stan zachowania siedliska oceniono jako dobry (ocena B). Nie stwierdzono bezpośrednich zagrożeń, poza naturalnymi procesami związanymi z zarastaniem i wypłycaaniem. Jakość środowiska lądowego w otoczeniu oceniono jako dobrą lub średnią, środowisko leśne lub łąki z kępami traw i turzyc. Siedlisko zajmujące znaczną lub mniejszą powierzchnię całkowicie lub częściowo otaczające zbiornik wodny.

6230 – Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe:

Murawa bliźniczkowa zlokalizowana jest w północnej części obszaru, na południowy zachód od miejscowości Kłobuczyno. Na podstawie dokumentacji do planu zadań ochronnych [Katewicz i in. 2013] ogólna ocena stanu ochrony uzyskała kategorię U1 – stan niezadowalający. Struktura siedliska jest zachowana w stanie dobrym (ocena II) Płaty siedliska rozległe. Widoczne są zmiany fitocenozy w kierunku jej degeneracji. Perspektywy zachowania siedliska oceniono jako niezadowalające, co przekłada się na ocenę stanu zachowania (C). Ocena składowych siedliska pozwala uzyskać łączną ocenę ogólną na poziomie C – znacząca. Płaty siedliska są rozległe, jednakże widoczne są zmiany w powierzchni fitocenozy w kierunku jej degeneracji. Głównym zagrożeniem dla danego siedliska jest sukcesja wtórna przejawiająca się zarastaniem muraw przez drzewa i krzewy. Kolejnym zagrożeniem jest eutrofizacja siedliska oraz związana z tym zjawiskiem ekspansja gatunków żyźniejszych łąk, które otaczają murawy. Perspektywy zachowania siedliska są niezadowalające. Zagrożającym czynnikiem jest m.in. dopływ biogenów z pól uprawnych.

7140 – Torfowiska przejściowe i trzęsawiska:

Powierzchnia siedliska podlega zmianom związanym z wkraczaniem drzew i krzewów. Na większości stanowisk stopień uwodnienia jest prawidłowy. Istniejącym czynnikiem zagrażającym siedlisku jest presja wywołana działalnością człowieka, wkraczanie gatunków ekspansywnych roślin zielnych tj. *Molinia caerulea*, *Deschampsia caespitosa*. Perspektywy zachowania siedliska są niezadowalające, głównym zagrożeniem dla badanego siedliska jest proces zarastania przez krzewy i drzewa. Na podstawie dokumentacji do planu zadań ochronnych [Katewicz i in. 2013] stan zachowania siedliska oceniono jako dobry (B). Utrzymano ocenę ogólną na poziomie dobrym (B).

9110 – Kwaśne buczyny:

Udział buka w drzewostanie sięga 95%. Na podstawie dokumentacji do planu zadań ochronnych [Katewicz i in. 2013] reprezentatywność siedliska oceniono jako znaczącą (C). Charakterystyczna kombinacja florystyczna na obu stanowiskach jest w stanie właściwym (FV). W drzewostanie dominuje buk pospolity *Fagus sylvatica*, tworzący zwartą warstwę, miejscami mniejsze lub większe prześwietlenie po wycince

pojedynczych drzew. Podszyt słabo rozwinięty, warstwa runa typowa dla zbiorowiska. Występują tu gatunki ekologicznie i geograficznie obce tj. sosna *Pinus sylvestris* oraz świerk *Picea abies*. Zagrożeniem dla kwaśnych buczyn jest usuwanie martwych i zamierających drzew. Stan zachowania oceniono jako średni (C). Ocena ogólna siedliska w obszarze została sklasyfikowana na poziomie znaczącej (C). Zagrożeniem dla kwaśnych buczyn jest usuwanie martwych i zamierających drzew. Martwe drewno przyspiesza obieg materii w fitocenozie, redukuje i zahamowuje procesy degeneracyjne gleb.

1831 – Elisma wodna (*Luronium natans*):

Populacja elismy wodnej *Luronium natans* jest obecnie niewielka, liczy 9 osobników. W ramach uzupełnienia stanu wiedzy [Bociąg i Rudowska 2016] stwierdzono 4 osobniki generatywne i 5 osobników wegetatywnych. Rozety wszystkich osobników składały się z niewielkiej liczby częściowo brązowiejących liści. Stan ochrony gatunku oceniono jako zły (U2). Składają się na to niska ocena parametru „populacja” (U2) oraz niezadowolająca ocena parametru „siedlisko” (U1). Również perspektywy ochrony oceniono jako złe. W przypadku parametru „populacja” decydujący o złej jego ocenie jest fakt drastycznego spadku liczebności populacji w porównaniu z danymi z 2008 [Lenartowicz 2008, spadek o 90%]. W przypadku wskaźnika „stan zdrowotny” mimo braku danych wcześniejszych, zaproponowano ocenę niezadowolającą (U1), ze względu na brązowienie części liści osobników.

6236 – Strzebla błotna (*Rhynchocypris percursus*):

Wyniki uzupełniające stan wiedzy na temat występowania strzebli błotnej w obszarze [Wolnicki 2016] wskazują, że jest to jeden z ważniejszych obszarów występowania strzebli błotnej w kraju. Występuje ona bardzo licznie w obrębie dwóch stanowisk (Dąbrówka 1 i Kłobuczyno). Stan populacji jest stabilny i perspektywy jej zachowania w najbliższych latach nie budzą zastrzeżeń, ocena populacji (B). Na stanowisku zlokalizowanym na rozległym torfowisku, odłowiona liczba osobników wpłynęła na obniżenie oceny waloryzowanych parametrów. Spośród licznych w obszarze, na ogół zeutrofizowanych zbiorników wodnych, tylko dwa dystroficzne wyrobiska torfu okazały się być zasiedlone przez strzeblę błotną. Miejscowe zbiorniki wodne w ostatnim czasie wyraźnie pozostają poza sferą zainteresowania wędkarzy. Świadczą o tym pozostałości kilku stanowisk wędkarskich, wszystkich sprzed kilku lat. Oceniono stan zachowania jako dobry (B). Ogółem lokalna populacja strzebli błotnej jest bardzo liczna i w jej skład może wchodzić kilka tysięcy osobników starszych niż jednoroczne. Najważniejsze stanowiska charakteryzują się dużą zdolnością do przetrwania długotrwałej suszy i nie podlegają istotnym oddziaływaniom naturalnym ani antropogenicznym - Ocena izolacji A. Ogólna ocena stanu populacji jest dobra (B) i należy ocenić stan ochrony populacji jako właściwy (FV).

4.3. Zagrożenia, presje i działania mające wpływ na obszar

Najważniejsze oddziaływania i działalność mające duży wpływ na obszar

Oddziaływania negatywne			
Poziom	Zagrożenia i presje [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnętrzne [i o b]
H	M02.03		i
H	K02.01		i
H	K04.04		i
H	F02		b
L	K02.03		b
L	H01		b
L	J02		b
Oddziaływania pozytywne			
Poziom	Działania, zarządzanie [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnętrzne [i o b]

L	A04.02	i
---	--------	---

Poziom: H = wysoki, M = średni, L = niski.

Zanieczyszczenie: N = stosowanie azotu, P = stosowanie fosforu/fosforanów, A = stosowanie kwasów/zakwaszanie, T = toksyczne chemikalia nieorganiczne,

O = toksyczne chemikalia organiczne, X = zanieczyszczenia mieszane.

i = wewnętrzne, o = zewnętrzne, b = jednocześnie.

4.4. Własność (opcjonalnie)

Typ		[%]
Publiczna	Krajowa/federalna	0
	Kraj	0
	związkowy/województwo	0
	Lokalna/gminna	0
	Inna publiczna	0
Własność łączna lub współwłasność		0
Prywatna		0
Nieznana		100
Suma		100

4.5. Dokumentacja (opcjonalnie)

[1] Mierko W., Błażuk J., Grechuta M., Siemion D. 1997 Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gminy Kościerzyna. Biuro Dokumentacji i Ochrony Przyrody. [2] Lenartowicz Z. 2008 Inwentaryzacja przyrodnicza planowanej ostoi siedliskowej "Dąbrówka" (Pojezierze Kaszubskie) - chroniącej siedliska strzebli błotnej. Zespół Dokumentacji Przyrodniczej, Wydział Środowiska i Rolnictwa PUW w Gdańsku. (niepubl.) [3] Radtke G. 2009 Raport na temat występowania priorytetowych gatunków ryb i minogów w sieci Natura 2000 w województwie pomorskim. Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie. Zakład Ryb Wędrownych w Gdańsku. [4] Katewicz E. i in. 2013 Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 PLH220088 Dąbrówka w województwie pomorskim. [5] Bociąg K. i Rudowska A. 2016. Uzupełnienie stanu wiedzy o występowaniu elismy wodnej Luronium natans (L.) Raf. w granicach obszaru Natura 2000 Dąbrówka PLH 220088. Gdańsk. [6] Wolnicki J. 2016. Uzupełnienie stanu wiedzy o strzebli błotnej Eupallasella percnurus (Pallas, 1814) w granicach obszaru Natura 2000 Dąbrówka PLH220088. Warszawa.

6. ZARZĄDZANIE OBSZAREM

6.1. Organ lub organy odpowiedzialne za zarządzanie obszarem:

[Powrót](#)

Organizacja:	Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
Adres:	Polska Chmielna 54/57 80-748 Gdańsk
Adres e-mail:	sekretariat.gdansk@rdos.gov.pl

6.2. Plan(-y) zarządzania:

Aktualny plan zarządzania istnieje:

☒ Tak	Nazwa: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dąbrówka PLH220088 Link: http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2014/2137/akt.pdf
	Nazwa: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 13 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych

dla obszaru Natura 2000 Dąbrówka PLH220088

Link: http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2016/2025/akt.pdf

☐ Nie, ale jest w przygotowaniu

☐ Nie

7. MAPA OBSZARU

[Powrót](#)

Nr ID INSPIRE:

PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH220088

Mapa załączona jako plik PDF w formacie elektronicznym (opcjonalnie)

☒ Tak ☐ Nie

Odniesienie lub odniesienia do oryginalnej mapy wykorzystanej przy digitalizacji granic elektronicznych (opcjonalnie)