



NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

dla obszarów specjalnej ochrony (OSO),
proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (pOZW),
obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW) oraz
specjalnych obszarów ochrony (SOO)

OBSZAR PLH300028
NAZWA
OBSZARU Barłożnia Wolsztyńska

ZAWARTOŚĆ

- [1. IDENTYFIKACJA OBSZARU](#)
- [2. POŁOŻENIE OBSZARU](#)
- [3. INFORMACJE PRZYRODNICZE](#)
- [4. OPIS OBSZARU](#)
- [6. POWIĄZANIA OBSZARU](#)
- [7. MAPA OBSZARU](#)

1. IDENTYFIKACJA OBSZARU

1.1. Typ B	1.2. Kod obszaru PLH300028	Powrót
---------------	-------------------------------	------------------------

1.3. Nazwa obszaru

Barłożnia Wolsztyńska

1.4. Data opracowania 2005-12	1.5. Data aktualizacji 2025-02
----------------------------------	-----------------------------------

1.6. Instytucja lub osoba przygotowująca wniosek:

Nazwisko/Organizacja:	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Adres:	Polska Al. Jerozolimskie 136 Warszawa 02-305
Adres e-mail:	kancelaria@gdos.gov.pl

Data zaproponowania obszaru jako OZW:	2007-08
Data zatwierdzenia obszaru jako OZW(*):	2009-02
Data objęcia obszaru ochroną SOO:	2021-07
Krajowe odniesienie prawne dla formy ochrony SOO:	rozp. MKiŚ z dn. 24 czerwca 2021 r. w spr. soo Barłożnia Wolsztyńska (PLH300028)

2. POŁOŻENIE OBSZARU

2.1. Położenie centralnego punktu [wartości dziesiętne stopni]:

Długość geograficzna
16.1306

Szerokość geograficzna
52.1775

2.2. Powierzchnia [ha]:

22.02

2.3. Obszar morski [%]

0.0

2.5. Kod i nazwa regionu administracyjnego

Kod poziomu NUTS 2

Nazwa regionu

PL41	Wielkopolskie
------	---------------

2.6. Region biogeograficzny

Kontynentalny (100.0
%)

3. INFORMACJE PRZYRODNICZE

3.1. Typy siedlisk przyrodniczych występujących na terenie obszaru i ocena znaczenia obszaru dla tych siedlisk:

Typy siedlisk wymienione w załączniku I						Ocena obszaru			
Kod	PF	NP	Pokrycie [ha]	Jaskinie [liczba]	Jakość danych	A B C D	A B C		
						Reprezentatywność	Powierzchnia względna	Stan zachowania	Ocena ogólna
7120			2.2		M	D			

- PF: dla typów siedlisk, do których mogą odnosić się zarówno formy priorytetowe, jak i niepriorytetowe (6210, 7130, 9430) należy wpisać „x” w kolumnie PF celem wskazania formy priorytetowej.
- NP: jeśli dany typ siedliska nie istnieje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Pokrycie: można wpisywać z dokładnością do wartości dziesiętnych.
- Jaskinie: w przypadku siedlisk typu 8310 i 8330 (jaskinie) należy podać liczbę jaskiń, jeśli nie są dostępne szacunkowe dane na temat powierzchni.
- Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. zgrubne dane szacunkowe).

3.2. Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 2009/147/WE i gatunki wymienione w załączniku II do dyrektywy 92/43/EEG oraz ocena znaczenia obszaru dla tych gatunków

Gatunki					Populacja na obszarze						Ocena obszaru			
Grupa	Kod	Nazwa naukowa	S	NP	Typ	Wielkość		Jednostka	Kategoria	Jakość danych	A B C D			
						Min	Maks		C R V P		Populacja	Stan zachowania	Izolacja	Ogólnie
F	6236	Rhynchocypris percnnurus			p	8	342	i		G	C	B	A	B

- Grupa: A = płazy, B = ptaki, F = ryby, I = bezkręgowce, M = ssaki, P = rośliny, R = gady.
- S: jeśli dane o gatunku są szczególnie chronione i nie mogą być udostępnione publicznie, należy wpisać „tak”.
- NP: jeśli dany gatunek nie występuje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Typ: p = osiadłe, r = wydające potomstwo, c = przelotne, w = zimujące (w przypadku roślin i gatunków niemigrujących należy użyć terminu „osiadłe”).
- Jednostka: i = osobniki pojedyncze, p = pary lub inne jednostki według standardowego wykazu jednostek i kodów zgodnego ze sprawozdawczością na podstawie art. 12 i 17 (zob. [portal referencyjny](#)).
- Kategorie liczebności (kategoria): C = powszechne, R = rzadkie, V = bardzo rzadkie, P = obecne - wypełnić, jeżeli brak jest danych (DD), lub jako uzupełnienie informacji o wielkości populacji.
- Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. zgrubne dane szacunkowe); DD = brak danych (kategorię tę należy stosować wyłącznie, jeśli nie da się dokonać nawet zgrubnej oceny wielkości populacji - w takiej sytuacji można pozostawić puste pole dotyczące wielkości populacji, jednak pole „Kategorie liczebności” musi być wypełnione).

4. OPIS OBSZARU

4.1. Ogólna charakterystyka obszaru

[Powrót](#)

Klasa siedliska przyrodniczego	Pokrycie [%]
N17	97.83
N19	2.17
Ogółem pokrycia siedliska przyrodniczego	100

Dodatkowa charakterystyka obszaru:

Obszar obejmuje śródlądowe obniżenie terenu położone ok. 5 km na północ od Wolsztyna, na terenie powiatu Grodzisk, gminy Rakoniewice. Miejsce to nazywane jest zwyczajowo „Barłóżnią Wolsztyńską” i obejmuje torfowisko wraz z otaczającym je kompleksem sosnowych drzewostanów gospodarczych (Wróbel, 2007). Pozostałością po dawnej eksploatacji torfu są płytkie doły potorfowe wypełnione wodą i bezodpływowe rowy melioracyjne. W ostatnich latach uległy one silnemu wypłyceniu. W obszarze znajduje się jedyne w Wielkopolsce stanowisko strzebli błotnej (Sikorska, Wolnicki, 2011).

4.2. Jakość i znaczenie

Obszar charakteryzuje się mozaiką torfowisk przejściowych, szuwarowych, łąkowych i wodnych zasilanych wodami podziemnymi oraz opadowymi.

W przeszłości wydobywano tu torf, czego pozostałością były doły potorfowe i rowy melioracyjne (Wróbel, 2007). Fakt ten potwierdzają również informacje zawarte w Raporcie dla gatunku w obszarze Natura 2000, który dla strzebli błotnej w 2013 r. sporządził prof. dr hab. Jacek Wolnicki (Wolnicki, 2013) oraz w dokumentacji dot. oceny stanu ochrony strzebli błotnej w obszarze Natura 2000 Barłóżnia Wolsztyńska, sporządzonej dla RDOŚ w Poznaniu (Wolnicki, 2018). Ze względu na antropogeniczne pochodzenie nie spełniają one definicji siedliska 3160 (naturalne dystroficzne zbiorniki wodne) zawartej w II części Przewodnika metodycznego, dot. monitoringu siedlisk przyrodniczych (Wilk-Woźniak E. i in., 2012). Wobec powyższego w obszarze nie występuje siedlisko 3160; zostało ono wpisane do SDFu w wyniku pierwotnego błędu naukowego.

Wniosek o usunięcie siedliska przyrodniczego 3160 z listy przedmiotów ochrony obszaru oczekuje na akceptację Komisji Europejskiej.

siedlisko 7120 (torfowiska wysokie, zdegradowane lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji) – niereprezentatywne siedlisko

6236 strzebla błotna (*Rhynchocypris percnurus*) – gatunek priorytetowy, w obszarze znajduje się aktualnie jedyne w Wielkopolsce i najdalej wysunięte na zachód w całym areale gatunku stanowisko, odkryte w roku 1992. Choć dawniej strzebla występowała we wszystkich dołach i rowach obecnych w obszarze (dane Państwowego Monitoringu Środowiska z roku 2013), w roku 2015 już tylko w jednym położonym w południowej części. Populacja wolsztyńska stanowi ok. 0,2% zasobów krajowych – ocena C. Stan zachowania dobry (ocena B), w tym stopień zachowania cech siedliska gatunku – elementy dobrze zachowane (II). Izolacja: populacja izolowana – ocena A. Ocena ogólna: B. Obecny stan populacji strzebli w obszarze jest wynikiem działań ochronnych zrealizowanych zimą 2006/2007 (usunięcie podrostów sosny i olszy czarnej) oraz w roku 2015 (odmulenie i pogłębienie dołu potorfowego), co przyczyniło się do znacznej poprawy warunków siedliskowych tego gatunku.

4.3. Zagrożenia, presje i działania mające wpływ na obszar

Najważniejsze oddziaływania i działalność mające duży wpływ na obszar

Oddziaływania negatywne			
Poziom	Zagrożenia i presje [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnętrzne [i o b]
M	I01		i
H	K01.03		i
H	K02.02		i
Oddziaływania pozytywne			
Poziom	Działania, zarządzanie [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnętrzne [i o b]

Poziom: H = wysoki, M = średni, L = niski.

Zanieczyszczenie: N = stosowanie azotu, P = stosowanie fosforu/fosforanów, A = stosowanie kwasów/zakwaszanie, T = toksyczne chemikalia nieorganiczne,

O = toksyczne chemikalia organiczne, X = zanieczyszczenia mieszane.

i = wewnętrzne, o = zewnętrzne, b = jednocześnie.

4.4. Własność (opcjonalnie)

Typ		[%]
Publiczna	Krajowa/federalna	0
	Kraj	0
	związkowy/województwo	0
	Lokalna/gminna	0
	Inna publiczna	0
Własność łączna lub współwłasność		0
Prywatna		0
Nieznana		100
Suma		100

4.5. Dokumentacja (opcjonalnie)

1. Klich M., Klich S. Ocena stanu ochrony traszki grzebieniastej *Triturus cristatus* w obszarze Natura 2000 Barłóżnia Wolsztyńska PLH300025. Tarnów, 2018. Msc.2. Klich M., Klich S. Ocena stanu ochrony traszki grzebieniastej *Triturus cristatus* w obszarze Natura 2000 Barłóżnia Wolsztyńska PLH300028. Tarnów, 2017. Msc.3. Klich M., Jarek S. Stan zachowania populacji i siedliska strzebli błotnej *Phoxinus* (= *Eupallasea*)

percnurus w obszarze Natura 2000 Barłożnia Wolsztyńska PLH300028 wraz z określeniem działań ochronnych oraz sposobu ich realizacji dla potrzeb projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000. Tarnów, 2015. Mscr.4. Kuszniierz J., Paśko Ł., Tagayev Daniyar T. On the variation and distribution of the lake minnow, *Eupallasella percnurus* (Pall.) Arch. Pol. Fisch. 2011, (19):161-166.5. Sikorska J., Wolnicki J. Occurrence, threats, and the need for active protection of the lake minnow, *Eupallasella percnurus* (Pall.), in the Wielkopolskie Vivodeship in Poland. Arch. Pol. Fisch. 2011, (19):223-226.6. Sierakowski M. Ekspertyza przyrodnicza traszki grzebieniastej *Triturus cristatus* w obszarze Natura 2000 Barłożnia Wolsztyńska. Ligota Górna, 2015. Mscr.7. Wolnicki J. Raport dla gatunku na stanowisku (*Phoxinus percnurus*, Barłożnia Wolsztyńska). Dane Państwowego Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Środowiska; baza danych Instytutu Ochrony Polskiej Akademii Nauk (<http://www.iop.krakow.pl/cn2000/monitoring/>; dostęp 5 kwietnia 2016 r.), 2013.8. Wolnicki J. Sprawozdanie na temat strzebli błotnej z obszaru Natura 2000 Barłożnia Wolsztyńska PLH300028. Warszawa, 2015. Mscr.9. Wolnicki J. Ocena stanu ochrony strzebli błotnej *Eupallasella percnurus* (Pallas, 1814) w obszarze Natura 2000 Barłożnia Wolsztyńska PLH300028. Warszawa, 2017. Mscr.10. Wolnicki J. Ocena stanu ochrony strzebli błotnej *Eupallasella percnurus* w obszarze Natura 2000 Barłożnia Wolsztyńska PLH300028. Warszawa, 2018. Mscr.11. Wróbel M. Inwentaryzacja i waloryzacja szaty roślinnej torfowiska przejściowego „Barłożnia Wolsztyńska” oddział 221j Leśnictwo Krzewina. Nadleśnictwo Grodzisk. Grodzisk Wielkopolski, 2007. Mscr.12. Wilk-Woźniak E. i inn. Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne . [W:] Mróz W. Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część II: 150-169. Biblioteka Monitoringu Środowiska. i waloryzacja szaty roślinnej torfowiska przejściowego „Barłożnia Wolsztyńska” oddział 221j Leśnictwo Krzewina. Nadleśnictwo Grodzisk. Grodzisk Wielkopolski. Mscr.

6. ZARZĄDZANIE OBSZAREM

6.1. Organ lub organy odpowiedzialne za zarządzanie obszarem:

[Powrót](#)

Organizacja:	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
Adres:	Polska Tadeusza Kościuszki 57 61-891 Poznań
Adres e-mail:	sekretariat.poznan@poznan.rdos.gov.pl

6.2. Plan(-y) zarządzania:

Aktualny plan zarządzania istnieje:

☒	Tak	Nazwa: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Barłożnia Wolsztyńska PLH300028 Link: http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2016/4446/
☐	Nie, ale jest w przygotowaniu	
☐	Nie	

7. MAPA OBSZARU

[Powrót](#)

Nr ID INSPIRE:

PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH300028

Mapa załączona jako plik PDF w formacie elektronicznym (opcjonalnie)

☒ Tak ☐ Nie

Odniesienie lub odniesienia do oryginalnej mapy wykorzystanej przy digitalizacji granic elektronicznych
(opcjonalnie)

--