



NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

dla obszarów specjalnej ochrony (OSO),
proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (pOZW),
obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW) oraz
specjalnych obszarów ochrony (SOO)

OBSZAR PLH320022
NAZWA
OBSZARU Dolina Radwi, Chocieli i Chotli

ZAWARTOŚĆ

- [1. IDENTYFIKACJA OBSZARU](#)
- [2. POŁOŻENIE OBSZARU](#)
- [3. INFORMACJE PRZYRODNICZE](#)
- [4. OPIS OBSZARU](#)
- [5. STATUS OCHRONY OBSZARU](#)
- [6. POWIĄZANIA OBSZARU](#)
- [7. MAPA OBSZARU](#)

1. IDENTYFIKACJA OBSZARU

1.1. Typ B	1.2. Kod obszaru PLH320022	Powrót
---------------	-------------------------------	------------------------

1.3. Nazwa obszaru

Dolina Radwi, Chocieli i Chotli

1.4. Data opracowania 2003-01	1.5. Data aktualizacji 2024-03
----------------------------------	-----------------------------------

1.6. Instytucja lub osoba przygotowująca wniosek:

Nazwisko/Organizacja:	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Adres:	Polska Al. Jerozolimskie 136 Warszawa 02-305
Adres e-mail:	kancelaria@gdos.gov.pl

Data zaproponowania obszaru jako OZW:	2007-08
Data zatwierdzenia obszaru jako OZW(*):	2009-02
Data objęcia obszaru ochroną SOO:	2022-01
Krajowe odniesienie prawne dla formy ochrony SOO:	rozp. MKiŚ z dn. 14 października 2021 r. w spr. soo Dolina Radwi, Chocieli i Chotli (PLH320022)

2. POŁOŻENIE OBSZARU

[Powrót](#)

2.1. Położenie centralnego punktu [wartości dziesiętne stopni]:

Długość geograficzna	Szerokość geograficzna
16.6538	54.0343

2.2. Powierzchnia [ha]:	2.3. Obszar morski [%]
21861.73	0.0

2.5. Kod i nazwa regionu administracyjnego

Kod poziomu NUTS 2 Nazwa regionu

PL42	Zachodniopomorskie
------	--------------------

2.6. Region biogeograficzny

Kontynentalny (100.0
%)

3. INFORMACJE PRZYRODNICZE

[Powrót](#)

3.1. Typy siedlisk przyrodniczych występujących na terenie obszaru i ocena znaczenia obszaru dla tych siedlisk:

Typy siedlisk wymienione w załączniku I						Ocena obszaru			
Kod	PF	NP	Pokrycie [ha]	Jaskinie [liczba]	Jakość danych	A B C D	A B C		
						Reprezentatywność	Powierzchnia względna	Stan zachowania	Ocena ogólna
3110			21.86		M	A	C	A	B
3150			327.93		M	B	C	B	B
3160			91.82		M	A	B	A	A
3260			30.61		M	B	C	B	C
3270			288.57		M	A	B	A	A
4010			65.59		M	B	B	B	B
4030			72.14		M	B	C	B	B
6410			360.72		M	B	C	B	B
6430			91.82		M	B	C	B	C
6510			568.4		M	A	C	B	B
7110			91.82		M	A	B	A	A
7120			52.47		M	A	C	B	C
7140			205.5		M	A	C	A	A
7150			91.82		M	A	B	A	A
7220			30.61		M	B	B	B	C
7230			1475.66		M	A	B	B	B
9110			3771.14		M	A	B	A	A
9130			310.44		M	A	C	A	A

9150		26.23		M	B	C	B	C
9160		1023.13		M	A	C	A	A
9170		83.07		M	A	C	B	B
9190		1836.38		M	A	B	A	A
91D0		83.07		M	A	C	A	A
91E0		3419.17		M	A	B	A	A

- PF: dla typów siedlisk, do których mogą odnosić się zarówno formy priorytetowe, jak i niepriorytetowe (6210, 7130, 9430) należy wpisać „x” w kolumnie PF celem wskazania formy priorytetowej.
- NP: jeśli dany typ siedliska nie istnieje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Pokrycie: można wpisywać z dokładnością do wartości dziesiętnych.
- Jaskinie: w przypadku siedlisk typu 8310 i 8330 (jaskinie) należy podać liczbę jaskiń, jeśli nie są dostępne szacunkowe dane na temat powierzchni.
- Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. zgrubne dane szacunkowe).

3.2. Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 2009/147/WE i gatunki wymienione w załączniku II do dyrektywy 92/43/EEG oraz ocena znaczenia obszaru dla tych gatunków

Gatunki					Populacja na obszarze						Ocena obszaru			
Grupa	Kod	Nazwa naukowa	S	NP	Typ	Wielkość		Jednostka	Kategoria	Jakość danych	A B C D	A B C		
						Min	Maks		C R V P		Populacja	Stan zachowania	Izolacja	Ogólnie
A	1188	Bombina bombina			p				P	M	C	A	C	B
F	1163	Cottus gobio			p				C	M	C	A	C	B
P	1902	Cypripedium calceolus			p	1	50	i		M	C	B	B	C
F	1099	Lampetra fluviatilis			r				V	M	C	A	C	B
F	1096	Lampetra planeri			p				R	M	C	A	C	B
M	1355	Lutra lutra			p	10	15	i		M	C	A	C	B
I	1060	Lycaena dispar			p				R	M	C	A	C	B
F	1145	Misgurnus fossilis			p				V	M	D			
M	1324	Myotis myotis			p				V	M	D			
I	1084	Osmoderma eremita			p				V	M	C	B	C	C
F	1106	Salmo salar			r				V	M	C	B	C	B
P	1528	Saxifraga hirculus			p	6	10	i		M	C	A	C	C
A	1166	Triturus cristatus			p				P	M	C	A	C	B
I	1032	Unio crassus			p				P	M	C	B	C	B

- Grupa: A = płazy, B = ptaki, F = ryby, I = bezkręgowce, M = ssaki, P = rośliny, R = gady.
- S: jeśli dane o gatunku są szczególnie chronione i nie mogą być udostępnione publicznie, należy wpisać „tak”.
- NP: jeśli dany gatunek nie występuje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Typ: p = osiadłe, r = wydające potomstwo, c = przelotne, w = zimujące (w przypadku roślin i gatunków niemigrujących należy użyć terminu „osiadłe”).
- Jednostka: i = osobniki pojedyncze, p = pary lub inne jednostki według standardowego wykazu

- jednostek i kodów zgodnego ze sprawozdawczością na podstawie art. 12 i 17 (zob. [portal referencyjny](#)).
- Kategorie liczebności (kategoria): C = powszechne, R = rzadkie, V = bardzo rzadkie, P = obecne - wypełnić, jeżeli brak jest danych (DD), lub jako uzupełnienie informacji o wielkości populacji.
- Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. zgrubne dane szacunkowe); DD = brak danych (kategorię tę należy stosować wyłącznie, jeśli nie da się dokonać nawet zgrubnej oceny wielkości populacji - w takiej sytuacji można pozostawić puste pole dotyczące wielkości populacji, jednak pole „Kategorie liczebności” musi być wypełnione).

4. OPIS OBSZARU

4.1. Ogólna charakterystyka obszaru

[Powrót](#)

Klasa siedliska przyrodniczego	Pokrycie [%]
N23	0.21
N17	44.5
N16	16.58
N07	0.64
N06	1.94
N19	12.87
N10	12.35
N12	10.91
Ogółem pokrycia siedliska przyrodniczego	100

Dodatkowa charakterystyka obszaru:

Obszar obejmuje dolinę Radwi i doliny jej największych dopływów: Chotli i Chocieli, począwszy od obszarów źródłkowych aż po strefę ujściową do rzeki Parsęty w Karlinie.

Ostoja obejmuje:

- źródłkowe dopływy jeziora Kwiecko - rzeka Łączna i Debrzyca - wraz z jeziorem Szczawno k. Zarzewia (obszar unikalnych mechowisk alkalicznych i torfowisk przejściowych, liczne zjawiska źródłkowe z wytrącaniem się martwicy wapiennej, źródła wapienne, fragmenty żyznych buczyn oraz wyjątkowych buczyn storczykowych na trawertynach, łągi i olsy źródłkowe, grądy i kwaśne buczyny na krawędziach i zboczach dolin);
- jezioro Kiecko z przyległymi torfowiskami i lasami na zboczach (obszar torfowisk przejściowych i mechowisk ze storczykami, wyjątkowo dobrze zachowane łąki w pełnym spektrum zróżnicowania - w okolicy Kępin, liczne źródła i zjawiska wytrącania martwicy wapiennej, kompleksy dobrze zachowanych buczyn i grądów, jezioro lobeliowe - jez. Karpiowskie, suche wrzosowiska, cenny obszar dla rozrodu ptactwa wodno-błotnego);
- dolinę rzeki Radew w obrębie Pradoliny Pomorskiej (dopływ Drężnianki z unikatowymi torfowiskami soligenicznymi koło Chocimina i mechowiskami koło Lubowa, unikatowe jeziora dystroficzne i pła mszarne w rejonie Lubowa i Sarnowa, malownicze jezioro lobeliowe - jez. Czerwone, żywe torfowiska wysokie typu kotłowego, z reliktowymi gatunkami torfowców, rozległe kompleksy torfowisk niskich i przejściowych oraz łągów olszowych i łągów podgórskich w dolinie Radwi, niepozorny dopływ Zgniłej Strugi z rozległymi torfowiskami i mechowiskami, na których znajduje się jedno z większych skupień situ tępokwiatowego na Pomorzu, fragmenty borów sosnowych z licznymi torfowiskami mszarnymi i jeziorami dystroficznymi, na krawędziach Pradoliny dobrze zachowane kompleksy starych drzewostanów bukowych, grądowych i kwaśnych dąbrów);
- jezioro Nicemino (jez. Rekowskie) i dopływ rzeki Mszanki (wyjątkowe torfowiska przejściowe z wątlikiem błotnym, torfowiska mszarne z wrzoścem bagiennym, pła mszarne, jeziora dystroficzne, eutroficzne zbiorniki

wodne z rdestnicami, kwaśne buczyny, wyjątkowo dobrze zachowane jezioro lobeliowe - jez. Morskie Oko, rzekę Radew ze starorzeczami i mulistymi rozlewiskami k. Mostowa);

- dolinę Chocieli (obszar charakteryzuje się ogromną mozaiką cennych siedlisk: 46 zespołów roślinnych należących do 7 klas roślinności, w tym rzadkie zbiorowiska mchów i wątrobowców źródliskowych oraz największe na Pomorzu skupienia łąk pełnikowych, łąki trzęślicowe z nasięśrzałem pospolitym, ziołorośla, świeże łąki, torfowiska alkaliczne z mchami reliktowymi, torfowiska przejściowe, rozległe olsy i łęgi źródliskowe ze storczykiem Fuchsa, żyzne grądy oraz kwaśne i żyzne buczyny);
- sztuczne zbiorniki zaporowe - jez. Rosnowskie i jez. Hajka (eutroficzne zatoki jezior, w borach sosnowych liczne torfowiska przejściowe oraz torfowiska mszarne z wrzoścem bagiennym, jeziorka dystroficzne z pływaczami, cenne siedliska dla ptaków wodno-błotnych);
- dolinę rzeki Chotli (strome wąwozy i jary ze zbiorowiskami grądów i buczyn, ogromne nisze źródliskowe ze zbiorowiskami wapniolubnych mchów i wątrobowców, rozległe łęgi olszowo-jesionowe, podgórskie łęgi źródliskowe na zboczach doliny, zarośla wierzbowe, łąki trzęślicowe, użytkowane do dziś świeże łąki, ziołorośla, eutroficzne zbiorniki wodne oraz wiele biotopów dla cennej fauny);
- dolinę Radwi od Białogórzyna do Karlina (liczne zakola i starorzecza, zalewane muliste brzegi z roślinnością nitrofilną, ekstensywnie użytkowane łąki świeże, rozległe lasy łęgowe, w tym łęgi olszowo-jesionowe i łęgi wierzbowe w obrębie starorzeczy oraz zarośla wierzbowe i wiklinowe przy rzece, w miejscach zasilanych wodami źródliskowymi występują podgórskie łęgi jesionowe-olszowe, ziołorośla nadrzeczne, na stromych krawędziach doliny grądy i buczyny, w tym ich żyzne postacie, w kompleksach leśnych jeziorka dystroficzne, pła mszarne, torfowiska przejściowe i trzęsawiska, torfowiska mszarne i mszary z wrzoścem bagiennym, liczne biotopy dla cennej fauny, w tym ważne obszary tarliskowe dla ryb łososiowatych).

4.2. Jakość i znaczenie

Obszar doliny Radwi, Chotli i Chocieli obejmuje szereg ważnych i cennych siedlisk z Dyrektywy Rady 92/43/EWG - zidentyfikowano tu 24 typy z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG, pokrywające w sumie ok. 60% powierzchni obszaru. Wiele z nich stanowi biotopy cennych gatunków zwierząt i roślin. Łącznie występuje tu 16 gatunków z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Na szczególną uwagę i podkreślenie zasługuje:

- największa koncentracja zjawisk źródliskowych na Pomorzu;
 - strome wąwozy i jary oraz ogromne nisze źródliskowe z rzadkimi zbiorowiskami wapniolubnych mchów i wątrobowców oraz obecnością roślin naczyniowych o podgórskim charakterze;
 - rozległe w dolinach rzecznych lasy łęgowe o charakterze źródliskowym ze storczykiem Fuchsa oraz udział łęgów wierzbowych i zarośli wierzbowo-wiklinowych;
 - jedyne w swoim rodzaju żyzne buczyny na trawertynach (martwicy wapiennej) ze storczykami leśnymi;
 - unikalne torfowiska alkaliczne i torfowiska przejściowe z wieloma gatunkami ginącymi i zagrożonymi w skali Europy, Polski i Pomorza;
 - unikalne torfowiska soligeniczne z największą populacją situ tępokwiatowego *Juncus subnodulosus* na Pomorzu;
 - wyjątkowo dobrze zachowane łąki w pełnym spektrum zróżnicowania, w tym największe skupienie pełnika europejskiego *Trollius europaeus* na Pomorzu;
 - jedno z nielicznych na Pomorzu Zachodnim stanowisk obuwika pospolitego, nad j. Kwiecko - w 2007 r. odnaleziono 50 os., w 1988 r. było ich ponad 500;
 - jedyne na Pomorzu stanowisko górskiego gatunku łąkowego - przytulii wiosennej *Cruciata verna*;
 - jedyne znane w Polsce stanowisko rzęśli *Callitriche brutia*;
 - tarliska ryb łososiowatych oraz liczna populacja głowacza białopłetwego;
 - liczne i dobrze zachowane biotopy dla wydry i kumaka nizinnego oraz: orlika krzykliwego, błotniaka stawowego, kani rudej, sokoła wędrownego (obszar introdukcji tego gatunku), bielika, puchacza, bociana białego, bociana czarnego, derkacza, dzięcioła czarnego, zimorodka i żurawia;
 - cenne obszary dla zimowania ptaków wodno-błotnych (zbiorniki zaporowe Rosnowo i Hajka oraz jez. Kwiecko) oraz ważne na Pomorzu miejsce łęgowe dla czernicy *Aythya fuligula* nad jez. Kwiecko.
- Dolina Radwi i jej dopływy to również interesujący obszar pod względem krajobrazowym, geomorfologicznym i kulturowym, a także ważny naturalny korytarz ekologicznym o znaczeniu lokalnym i regionalnym.

4.3. Zagrożenia, presje i działania mające wpływ na obszar

Najważniejsze oddziaływania i działalność mające duży wpływ na obszar

Oddziaływania negatywne			
Poziom	Zagrożenia i presje [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnętrzne [i o b]
H	F01		i
L	J02.03		i
L	D01.05		i
M	B02.02		i
H	A04.03		i
L	F03.02.03		i
L	G02		i
L	J02.11		i
M	X		b
H	J02.12		i
L	B01		i
M	J02.01		i

Oddziaływania pozytywne			
Poziom	Działania, zarządzanie [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnętrzne [i o b]
L	D01.05		i
L	J02.11		i
L	G02		i
M	X		b

Poziom: H = wysoki, M = średni, L = niski.

Zanieczyszczenie: N = stosowanie azotu, P = stosowanie fosforu/fosforanów, A = stosowanie kwasów/zakwaszanie, T = toksyczne chemikalia nieorganiczne,

O = toksyczne chemikalia organiczne, X = zanieczyszczenia mieszane.

i = wewnętrzne, o = zewnętrzne, b = jednocześnie.

4.4. Własność (opcjonalnie)

Typ		[%]
Publiczna	Krajowa/federalna	0
	Kraj	0
	związkowy/województwo	0
	Lokalna/gminna	0
	Inna publiczna	0
Własność łączna lub współwłasność		0
Prywatna		0
Nieznana		100
Suma		100

4.5. Dokumentacja (opcjonalnie)

Anonymus. 1975. Uchwała Nr X/46/75 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie z dnia 17 listopada 1975 r. w sprawie stref chronionego krajobrazu. Dz. Urz. Wojew. Rady Nar., Koszalin. 9. poz. 49. Anonymus. 1976. Zlokalizowanie i charakterystyka złóż torfowych w Polsce, spełniających kryteria potencjalnej bazy zasobowej z ustaleniem i uwzględnieniem wymogów związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska - woj.

koszalińskie. IMUZ. Anonymus. 1995. Rozporządzenie Nr 3/95 Wojewody Koszalińskiego z dnia 7 marca 1995 r. w sprawie uznania za zespół przyrodniczo-krajobrazowy obszaru pn. Dolina rzeki Chocieli. Dz. Urz. Wojew. Koszalin. 7. poz. 32. Dębowski P. 1997. Ichtyofauna dorzecza Parsęty. Roczn. Nauk. PZW. 10: 21-60. Dylawerska J.K., Dylawerski M. 2001. Inwentaryzacja fauny gminy Białogard. Biuro Konserw. Przyr., Szczecin. Msc. Dylawerska J.K., Dylawerski M. 2001. Inwentaryzacja flory gminy Białogard. Biuro Konserw. Przyr., Szczecin. Msc. GDLP 2007 Inwentaryzacja przyrodnicza. baza danych INVENT Górska M. 1968. Materiały do rozmieszczenia ważniejszych składników świetlistej dąbrowy (*Potentilla albae-Quercetum*) w Polsce Niżowej. Prace Kom. Biol. PTPN. 32(4). IOP PAN red. 2007 Raport dla Komisji Europejskiej z wdrażania Dyrektywy Siedliskowej w zakresie dotyczącym monitoringu msc., GIOŚ, Warszawa Jasnowska J., Jasnowski M. 1983. Pojezierze Zachodniopomorskie. Ser. Przyroda Polska. Wiedza Powsz., Warszawa. Jasnowska J., Markowski S. 2002. Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Tychowo. Operat botaniczny. Biuro Konserw. Przyr., Szczecin. Msc. Kochanowska R. 1995. Łąki pełnikowe w dolinie Chocieli. Chrońmy Przyr. Ojcz. Kochanowska R., Kozłowska T., Rygielski T. 1993. Dokumentacja Rezerwatu Pełnik Europejski w Bobolicach. Wojew. Konserw. Przyr., Koszalin. Kochanowska R., Kozłowska T., Rygielski T. 1993. Dokumentacja Zespołu Przyrodniczo - Krajobrazowego Dolina Rzeki Chocieli. Wojew. Konserw. Przyr., Koszalin. Korczyński M., Śpiewakowski E.R. 1991. Struktura rozmieszczenia i wielkość populacji obuwika pospolitego *Cypripedium calceolus* L. nad jeziorem Kwiecko (woj. koszalińskie). Prądnik. Prace i materiały Muz. Szafera. 3 183-191. Kujawa-Pawlaczyk J., Pawlaczyk P. 2000. Dokumentacja projektowanego użytku ekologicznego Torfowisko soligeniczne Wietrzno. Lub. Klub Przyr., Świebodzin. Msc. Kujawa-Pawlaczyk J., Pawlaczyk P. 2001. Inwentaryzacja przyrody gminy Polanów w zakresie szaty roślinnej i krajobrazu. Biuro Konserw. Przyr., Szczecin. Msc. Malinowski B. 1994. Ogólna charakterystyka dolin Radwi i Chocieli. Ochrona walorów przyrodniczych dolin Radwi i Chocieli. Bobolice. Msc. Malinowski B. 1997. Formy rzeźby młodoglacjalnej ziemi bobolickiej. Przyrodnicze znaczenie małych dolin rzecznych Pomorza Środkowego. Bobolice. Msc. Osadowski Z. (red.). 2002. Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gminy Bobolice w zakresie szaty roślinnej i fauny oraz przyrody nieożywionej i krajobrazu. Biuro Konserw. Przyr., Szczecin. Msc. Osadowski Z. 1996. Charakterystyka botaniczna kompleksów źródliskowych doliny Chocieli (koło Bobolic) jako podstawa wyróżnienia optymalnych fitocenoz dla chronionych i rzadkich gatunków roślin. Praca magisterska. Katedra Bot. AR, Szczecin. Msc. Osadowski Z. 1999. Ginące i zagrożone rośliny naczyniowe Pomorza Zachodniego na obszarze górnej zlewni rzeki Radwi. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. 48: 151-157. Osadowski Z. 1999. Walory przyrodnicze gminy Bobolice i propozycje ich ochrony. Chrońmy Przyr. Ojcz. 55(4): 49-64. Osadowski Z. 2000. Mokradła doliny Radwi jako ostoje przyrody. Człow., Przyr., Tech. Zw. Gmin Pom. Zach. Koszalin. s. 4-15. Osadowski Z. 2000. Szata roślinna kompleksów źródliskowych górnej zlewni Radwi. Praca doktorska. Wydz. Nauk Przyr. US, Szczecin. Msc. Osadowski Z. 2000. Transformations of the spring-complexes vegetation on the area of the the Upper Parsęta catchment. W: W. Żukowski, B. Jackowiak (red.). Publications of the Department of Plant Tax. of the A. Mickiewicz University, Poznań. Publications of the Department of Plant Tax., UAM Poznań. 10: 235-247. Osadowski Z. 2002. Materiały do flory naczyniowej kompleksów źródliskowych dorzecza Parsęty. Cz. 1. Źródła górnej zlewni rzeki Radwi. Słupskie Prace Przyr., ser. Bot. 1: 7-48. Osadowski Z., Fudali E. 2001. Materiały do brioflory kompleksów źródliskowych dorzecza Parsęty Cz. 1. Źródła górnej zlewni Radwi. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. 50: 149-168. Osadowski Z., Sobisz Z. 1998. Waloryzacja przyrodnicza gminy Bobolice zagadnienia geobotaniczne. Biuro Projekt. Koszalin. Msc. Osadowski Z., Wołejko L. 1997. Możliwości optymalizacji ochrony ekosystemów źródliskowych doliny Chocieli koło Bobolic (Pomorze Zachodnie). Przegl. Przyr. 8(4): 23-35. Program. - - - - . Program ochrony przyrody Nadleśnictwa Bobolice. Nadl. Bobolice. Msc. Śpiewakowski E.R. 1979. Zmiany szaty roślinnej okolic Żydowa jako wynik antropopresji. WSP, Koszaliński Ośr. Nauk.-Badaw. Słupsk-Koszalin. Śpiewakowski E.R., Kępczyńska M. 1982. Warunki występowania *Trollius europeus* L. na stanowisku koło jeziora Kwiecko. Słupskie Prace Mat.-Przyr. Słupsk. 1(1980): Śpiewakowski R. 1972. Rzadsze gatunki roślin naczyniowych terenów przyległych do elektrowni wodnej w Żydowie. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., ser. B. 25. Urbahn E., Urbahn H. - - - - . Die Schmetterlinge Pommerns mit einem vergleichenden Überblick über den Ostseeraum. W: Stettiner Entomologische Zeitung. Stettin. Woźniak K., Stańko R., Utracka-Minko B. 2001. Inwentaryzacja i waloryzacja fauny gminy Polanów. Biuro Konserw. Przyr., Szczecin. Msc. Żukowski W. 1961. Notatki florystyczne z Pomorza Zachodniego. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. 8. Żukowski W. 1963. Nowe stanowiska rzadszych roślin na Pomorzu. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. 12. Żukowski W., Latowski K. 1979. Materiały do flory północno-zachodniej Polski. Cz. 1. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., ser. B. 31: 163-174.

5. STATUS OCHRONY OBSZARU (OPCJONALNIE)

5.1. Istniejące formy ochrony na poziomie krajowym i regionalnym:

Kod	Pokrycie [%]	Kod	Pokrycie [%]	Kod	Pokrycie [%]
PL04	18.67				

5.2. Powiązanie opisanego obszaru z innymi formami ochrony:

na poziomie krajowym lub regionalnym:

Kod rodzaju	Nazwa terenu	Rodzaj	Pokrycie [%]
PL04	Obszar Chronionego Krajobrazu "Okolice Żydowo-Biały Bór"	*	8.18
PL04	Obszar Chronionego Krajobrazu "Dolina Radwi" (Mostowo-Zegrze)	*	10.49

6. ZARZĄDZANIE OBSZAREM

6.1. Organ lub organy odpowiedzialne za zarządzanie obszarem:

Organizacja:	Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
Adres:	Polska Jagiellońska 32 70-382 Szczecin
Adres e-mail:	sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl

6.2. Plan(-y) zarządzania:

Aktualny plan zarządzania istnieje:

☐	Tak
☐	Nie, ale jest w przygotowaniu
☒	Nie

7. MAPA OBSZARU

Nr ID INSPIRE:

PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH320022

Mapa załączona jako plik PDF w formacie elektronicznym (opcjonalnie)

☒ Tak ☐ Nie

Odniesienie lub odniesienia do oryginalnej mapy wykorzystanej przy digitalizacji granic elektronicznych (opcjonalnie)

--

