



NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

dla obszarów specjalnej ochrony (OSO),
proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (pOZW),
obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW) oraz
specjalnych obszarów ochrony (SOO)

OBSZAR PLH320062
NAZWA
OBSZARU Bukowy Las Górk

ZAWARTOŚĆ

- [1. IDENTYFIKACJA OBSZARU](#)
- [2. POŁOŻENIE OBSZARU](#)
- [3. INFORMACJE PRZYRODNICZE](#)
- [4. OPIS OBSZARU](#)
- [5. STATUS OCHRONY OBSZARU](#)
- [6. POWIĄZANIA OBSZARU](#)
- [7. MAPA OBSZARU](#)

1. IDENTYFIKACJA OBSZARU

1.1. Typ B	1.2. Kod obszaru PLH320062	Powrót
---------------	-------------------------------	------------------------

1.3. Nazwa obszaru

Bukowy Las Górk

1.4. Data opracowania 2008-08	1.5. Data aktualizacji 2025-02
----------------------------------	-----------------------------------

1.6. Instytucja lub osoba przygotowująca wniosek:

Nazwisko/Organizacja:	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Adres:	Polska Al. Jerozolimskie 136 Warszawa 02-305
Adres e-mail:	kancelaria@gdos.gov.pl

Data zaproponowania obszaru jako OZW:	2009-10
Data zatwierdzenia obszaru jako OZW(*):	2012-01
Data objęcia obszaru ochroną SOO:	2021-12
Krajowe odniesienie prawne dla formy ochrony SOO:	rozp. MKiŚ z dn. 14 października 2021 r. w spr. soo Bukowy Las Górk (PLH320062)

2. POŁOŻENIE OBSZARU

[Powrót](#)

2.1. Położenie centralnego punktu [wartości dziesiętne stopni]:

Długość geograficzna
16.1267

Szerokość geograficzna
54.212

2.2. Powierzchnia [ha]:

964.6

2.3. Obszar morski [%]

0.0

2.5. Kod i nazwa regionu administracyjnego

Kod poziomu NUTS 2

Nazwa regionu

PL42	Zachodniopomorskie
------	--------------------

2.6. Region biogeograficzny

Kontynentalny (100.0
%)

3. INFORMACJE PRZYRODNICZE

[Powrót](#)

3.1. Typy siedlisk przyrodniczych występujących na terenie obszaru i ocena znaczenia obszaru dla tych siedlisk:

Typy siedlisk wymienione w załączniku I						Ocena obszaru			
Kod	PF	NP	Pokrycie [ha]	Jaskinie [liczba]	Jakość danych	A B C D	A B C		
						Reprezentatywność	Powierzchnia względna	Stan zachowania	Ocena ogólna
9130			314.07		G	B	C	B	C
9160			221.03		G	A	C	B	C
91D0			0.63		G	D			
91E0			38.24		G	B	C	B	C
91F0			3.86		G	C	C	C	C

- PF: dla typów siedlisk, do których mogą odnosić się zarówno formy priorytetowe, jak i niepriorytetowe (6210, 7130, 9430) należy wpisać „x” w kolumnie PF celem wskazania formy priorytetowej.
- NP: jeśli dany typ siedliska nie istnieje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Pokrycie: można wpisywać z dokładnością do wartości dziesiętnych.
- Jaskinie: w przypadku siedlisk typu 8310 i 8330 (jaskinie) należy podać liczbę jaskiń, jeśli nie są dostępne szacunkowe dane na temat powierzchni.
- Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. zgrubne dane szacunkowe).

3.2. Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 2009/147/WE i gatunki wymienione w załączniku II do dyrektywy 92/43/EEWG oraz ocena znaczenia obszaru dla tych gatunków

Gatunki	Populacja na obszarze	Ocena obszaru
---------	-----------------------	---------------

Grupa	Kod	Nazwa naukowa	S	NP	Typ	Wielkość		Jednostka	Kategoria	Jakość danych	A B C D	A B C		
						Min	Maks		C R V P		Populacja	Stan zachowania	Izolacja	Ogólnie
M	1337	Castor fiber			p					DD	D			
M	1355	Lutra lutra			p	1	3	i		M	D			

- Grupa: A = płazy, B = ptaki, F = ryby, I = bezkręgowce, M = ssaki, P = rośliny, R = gady.
- S: jeśli dane o gatunku są szczególnie chronione i nie mogą być udostępnione publicznie, należy wpisać „tak”.
- NP: jeśli dany gatunek nie występuje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie).
- Typ: p = osiadłe, r = wydające potomstwo, c = przelotne, w = zimujące (w przypadku roślin i gatunków niemigrujących należy użyć terminu „osiadłe”).
- Jednostka: i = osobniki pojedyncze, p = pary lub inne jednostki według standardowego wykazu jednostek i kodów zgodnego ze sprawozdawczością na podstawie art. 12 i 17 (zob. [portal referencyjny](#)).
- Kategorie liczebności (kategoria): C = powszechne, R = rzadkie, V = bardzo rzadkie, P = obecne - wypełnić, jeżeli brak jest danych (DD), lub jako uzupełnienie informacji o wielkości populacji.
- Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. zgrubne dane szacunkowe); DD = brak danych (kategorię tę należy stosować wyłącznie, jeśli nie da się dokonać nawet zgrubnej oceny wielkości populacji - w takiej sytuacji można pozostawić puste pole dotyczące wielkości populacji, jednak pole „Kategorie liczebności” musi być wypełnione).

4. OPIS OBSZARU

4.1. Ogólna charakterystyka obszaru

[Powrót](#)

Klasa siedliska przyrodniczego	Pokrycie [%]
N10	0.12
N16	97.13
N21	0.0
N12	2.75
Ogółem pokrycia siedliska przyrodniczego	100

Dodatkowa charakterystyka obszaru:

Obszar Natura 2000 Bukowy Las Górki PLH320062 znajduje się w makroregionie Pobrzeże Koszalińskie oraz występuje w dwóch mezoregionach: Wybrzeże Koszalińskie i Równia Białogardzka. Obszar leży w granicach dwóch powiatów: Koszalin i koszaliński, a także w trzech gminach: większej części w gminie Koszalin, a także w gminie Biesiekierz i Będzino.

Obszar ten obejmuje zwarty kompleks leśny położony na pn-zach. od miasta Koszalin, na gliniastych utworach moreny dennej. Kompleks przecięty jest drogą krajową nr 11 z Koszalina do Mścici i dalej do Kołobrzegu, oraz odgałęziającą się od niej drogą gminną do miejscowości Łabusz, a także linią kolejową Koszalin-Kołobrzeg.

Lasy zajmują 95,7% powierzchni obszaru i poza dwoma wydzieleniami drzewostanów olszowych nad rzeką Dzierżęcinką stanowiącymi własność miasta Koszalin są zarządzane przez nadleśnictwo Karnieszewice. W strukturze typów siedliskowych 86% zajmują siedliska lasu świeżego a 11% lasu wilgotnego. Stosownie do siedlisk, bezwzględnie dominują drzewostany liściaste, a najpospolitszym gatunkiem panującym jest buk.

Średni wiek drzewostanów w kompleksie jest, jak na las gospodarczy, wysoki - wg stanu na 2020 r. wynosił 85,5 lat. Drzewostany ponad 100-letnie w 2020 r. zajmowały ok. 37% powierzchni leśnej obszaru.

Lasy obszaru stanowią mozaikę buczyn, grądów, łęgów i zbiorowisk zastępczych z drzewostanem świerkowym i modrzewiowym. Unikatem w skali Pomorza było do niedawna liczne występowanie

drzewostanów jesionowych, które opisano stąd jako łęg jesionowy (91F0). Drzewostany te w znacznej części rozpadły się w wyniku zamarcia starych jesionów (w wyniku mającego miejsce w całej Polsce chorobowego zamierania jesionu), choć jesion wciąż jest liczny w odnowieniach i podroście.

Unikatem florystycznym jest liczne występowanie pierwiosnki wyniosłej *Primula elatior* oraz występowanie złoci pochwolistej *Gagea spathacea*. Liczny jest także wiciokrzew pomorski *Lonicera periclymenum*. Poza tym podano stąd występowanie następujących gatunków: gnieźnik leśny *Neottia nidus-avis*, kruszczyk błotny *Epipactis palustris*, kruszczyk szerokolistny *Epipactis helleborine*, storczyk *Fusca Dactylorhiza fuchsii*, storczyk plamisty *Dactylorhiza maculata* i widłak jałowcowaty *Lycopodium annotinum*, skosatka zanokcicowata *Plagiochila asplenoides*.

W części obszaru na północ od drogi krajowej nr 11, obszar ten pokrywa się z obszarem chronionego krajobrazu Koszaliński Pas Nadmorski.

4.2. Jakość i znaczenie

W obszarze Bukowy Las Górki PLH320062 zidentyfikowano 6 typów siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG, tworzących naturalną mozaikę i pokrywających około 695 ha, czyli około 70% powierzchni całego obszaru. Do przedmiotów ochrony zaliczono 5 następujących typów siedlisk przyrodniczych: 9110 Kwaśne buczyny (*Luzulo-Fagetum*), 9130 Żyzne buczyny (*Dentario glandulosae-Fagenion*, *Galio odorati-Fagenion*), 9160 Grąd subatlantycki (*Stellario-Carpinetum*), 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (*Salicetum albo-fragilis*, *Populetum albae*, *Alnenion*), 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (*Ficario-Ulmetum*).

*9110 Kwaśne buczyny (*Luzulo-Fagion*)

Siedlisko oczekuje na wpis do katalogu przedmiotów ochrony obszaru – nowelizację rozporządzenia wyznaczającego obszar.

Siedlisko zinwentaryzowane w 2020 r. i ujęte w dokumentacji do planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bukowy Las Górki PLH320062. Występowanie siedliska skupia się w południowej części obszaru.

Większe biochory są jednak silnie zniekształcone, wskutek masowego wykonania w nich cięć rębnych, które objęły większość areалу siedliska. Lepiej zachowane są małe płyty wykształcone na stromych zboczach, stanowiące wyspy wśród grądów lub żyznych buczyn.

Reprezentatywność: ocena B (dobra) – siedlisko jest reprezentowane w obszarze przez ekosystemy z bukowym lub dębowo-bukowym drzewostanem, gdzie w runie dominują gatunki mezo- lub oligotroficzne (lokalnie typowa i stała jest szczególnie turzyca pigułkowata *Carex pilulifera*), odróżniając się od żyznych buczyn negatywnie – brakiem typowych gatunków eutroficznych jak gajowiec żółty *Galeobdolon luteum* i marzanka wonna *Galium odoratum*, a przede wszystkim brakiem kostrzewy leśnej *Festuca sylvatica* i turzycy leśnej *Carex sylvatica*. Dno lasu albo pozostaje prawie nagie, albo zaznacza się w nim większe pokrycie warstwy mszystej, w której dominują zwykle *Polytrichastrum formosum*, *Mnium hornum* i *Hypnum cupressiforme*. Przejście do żyznych buczyn nie jest ostre, a dotyczy to zwłaszcza zakwalifikowanego już do siedliska 9130 podzespołu *Galio odorati-Fagetum deschampsietosum*, o kompozycji florystycznej pośredniej między kwaśnymi, a żyznymi buczynami. W niektórych płatach kwaśnej buczyny elementami struktury są lokalne, wilgotniejsze zagłębienia z sitem rozpięchłym *Juncus effusus* i innymi gatunkami higrofilnymi nawiązującymi do łęgów i olsów, ale mieszczące się pod okapem buków.

Powierzchnia względna: ocena C ($2\% \geq p > 0\%$) – obecny areal siedliska w obszarze określono na 118,9 ha. Zasoby siedliska w obszarze stanowią 0,1 % krajowych zasobów.

Stan zachowania: ocena B (dobry) – będąca wynikiem oceny trzech podkryteriów:

a) Stopień zachowania struktury – II (struktura dobrze zachowana), choć wyraźne obecne są zniekształcenia wynikające z dawniej prowadzonej gospodarki leśnej, natomiast zbyt szybki proces wymiany pokoleń drzewostanu może także obecnie pogarszać strukturę siedliska.

b) Stopień zachowania funkcji – II (perspektywy zachowania dobre),

c) Możliwości odtworzenia – II (możliwe przy średnim nakładzie środków), w przypadku prawidłowej ochrony siedlisko w obszarze powinno uzyskać właściwy stan ochrony.

Ocena ogólna: ocena C (znacząca) – jest to jeden z wielu obszarów chroniących ten typ siedliska na Pomorzu.

Stopień rozpoznania: ocena G (dane o wysokiej jakości) – pełna inwentaryzacja przyrodnicza wykonana przez ekspertów przyrodniczych zgodnie z przyjętymi metodykami i wytycznymi.

9130 Żyzne buczyny (*Dentario glandulosae*-Fagenion, *Galio odorati*-Fagenion)

Współdominujący z gradami (9160) typ siedliska w obszarze, skupiający się w jego centrum oraz w jego zachodniej części.

Reprezentatywność: ocena B (dobra) – w obszarze Natura 2000 Bukowy Las Górki PLH320062 siedlisko jest reprezentowane przez lasy bukowe o runie z obecnością gatunków eutroficznych, jak gajowiec żółty *Galeobdolon luteum*, marzanka wonna *Galium odoratum*, w niektórych płatach kostrzewa leśna *Festuca sylvatica*, a w wilgotniejszych i żyzniejszych wariantach także turzyca leśna *Carex sylvatica*. Elementem struktury wielu buczyn w obszarze są lokalne, wilgotniejsze zagłębienia z turzycą rzadkokłosą *Carex remota*, czartawą leśną *Circaea lutetiana* i innymi gatunkami higrofilnymi nawiązującymi do łągów i olsów.

Powierzchnia względna: utrzymanie dotychczasowej oceny C ($2\% \geq p > 0\%$) – obecny areal siedliska w obszarze określono na 314,07 ha. Zasoby siedliska w obszarze stanowią 0,2 % krajowych zasobów.

Stan zachowania: ocena B (dobry) – będąca wynikiem oceny trzech podkryteriów:

a) Stopień zachowania struktury – II (struktura dobrze zachowana), choć wyraźne są zniekształcenia w wyniku dawniejszej gospodarki leśnej, a zbyt szybki proces wymiany pokoleń drzewostanu może także obecnie pogarszać strukturę siedliska. Mimo to, warto podkreślić, że w buczynach obszaru są wciąż miejsca cenne, w tym skupienia martwych drzew i drzew biocenotycznych.

b) Stopień zachowania funkcji – II (perspektywy zachowania dobre)

c) Możliwości odtworzenia – II (możliwe przy średnim nakładzie środków), w przypadku prawidłowej ochrony siedlisko w obszarze powinno uzyskać właściwy stan ochrony.

Ocena ogólna: ocena C (znacząca) – jest to jeden z wielu obszarów chroniących to siedlisko na Pomorzu.

Stopień rozpoznania: ocena G (dane o wysokiej jakości) – pełna inwentaryzacja przyrodnicza wykonana przez ekspertów przyrodniczych zgodnie z przyjętymi metodykami i wytycznymi.

9160 Grąd subatlantycki (*Stellario-Carpinetum*)

Współdominujący z żyznymi buczynami (9130) typ siedliska w obszarze. Największe jego zasoby skupiają się w północno-wschodniej jego części. Ze względu na różnorodność florystyczną (wczesnowiosenny aspekt runa, masowo występująca pierwiosnka wyniosła *Primula elatior* i zioło pochwołistna *Gagea spathacea* oraz znaczne zasoby martwego drewna i drzew biocenotycznych grądy w obszarze są cenne przyrodniczo.

Reprezentatywność: utrzymanie dotychczasowej oceny A (doskonała) – ze względu na szerokie spektrum zróżnicowania na stosunkowo małym obszarze. Siedlisko w obszarze jest wielopostaciowe. Typowe są następujące jego formy terenowe:

*„grądy bukowe” las bukowy z wyraźnym udziałem graba, w strefie ekotonowej między płatami żyznej buczyny (9130) i łągu (91E0, 91F0), albo przy drobnych ciekach lub na zboczach ich dolinek; zwykle ciemny, z ogólnie skąpym runem, w którym jednak dość wiernie występują *Galeobdolon luteum*, *Galium odoratum*, *Stellaria holostea*, *Carex sylvatica*;

*grąd typowy ze starszym drzewostanem dębowo-grabowym, ze stałym występowaniem leszczyny *Corylus avellana*, zwykle z dość ograniczonym udziałem buka;

*regeneracyjne postaci grądowe, gdzie występują większe płaty lasu z drzewostanem dębowym lub brzoźowym, pod którym rozwija się podrost graba i buka, podszyt leszczynowy i ogólnolasowe runo z *Galeobdolon luteum*, *Galium odoratum*, *Stellaria holostea*, *Milium effusum* (niekiedy jednak o niewielkim pokryciu z powodu zacienienia);

*grądy niskie, związane z siedliskami bardziej wilgotnymi. W typowej ich postaci wyższe piętro drzewostanu buduje dąb szypułkowy *Quercus robur*, któremu w niższej podwarstwie towarzyszy grab, a w podszycie leszczyna *Corylus avellana*. Liczne są jednak także płaty z dominacją olszy *Alnus glutinosa* w drzewostanie, jednak z bukowym lub grądowym podrostem, leszczynowym podszytem i zupełnie lasowym, a nie higrofilnym runem.

Powierzchnia względna: utrzymanie dotychczasowej oceny C ($2\% \geq p > 0\%$) – obecny areal siedliska w obszarze określono na 221,04 ha. Zasoby siedliska w obszarze stanowią 0,5 % krajowych zasobów.

Stan zachowania: ocena B (dobry) – będąca wynikiem oceny trzech podkryteriów:

a) Stopień zachowania struktury – II (struktura dobrze zachowana), choć wyraźne są zniekształcenia w wyniku dawniejszej gospodarki leśnej, a zbyt szybki proces wymiany pokoleń drzewostanu może także obecnie pogarszać strukturę siedliska.

b) Stopień zachowania funkcji – II (perspektywy zachowania dobre),

c) Możliwości odtworzenia – II (możliwe przy średnim nakładzie środków), w przypadku prawidłowej ochrony siedlisko w obszarze powinno uzyskać właściwy stan ochrony.

Ocena ogólna: ocena C (znacząca) – jest to jeden z wielu obszarów chroniących to siedlisko na Pomorzu.

Stopień rozpoznania: ocena G (dane o wysokiej jakości) – pełna inwentaryzacja przyrodnicza wykonana przez ekspertów przyrodniczych zgodnie z przyjętymi metodykami i wytycznymi.

91D0 Bory i lasy bagienne (*Vaccinio uliginosi*-*Betuletum pubescentis*, *Vaccinio uliginosi*-*Pinetum*, *Pino mugo*-*Sphagnetum*, *Sphagno girgensohnii*-*Piceetum* i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)

Siedlisko w obszarze występuje w postaci jednego płatu i reprezentowane jest przez zespół brzozy omszonej *Betula pubescens*, o runie z dominacją trzęślicy *Molinia coerulea* i situ rozpięzłego *Juncus effusus* oraz ze zwartą torfowcową warstwą mszystą (*Sphagnum capillifolium*, *S. fimbriatum*, *S. girgensohnii*, *S. palustre*). Ze względu na zły stan ochrony znikomą powierzchnię płatu (0,63ha) oraz nieistotne znaczenie w obszarze, ocenę reprezentatywności utrzymuje się na poziomie oceny D (siedlisko nieistotne).

Stopień rozpoznania: ocena G (dane o wysokiej jakości) – pełna inwentaryzacja przyrodnicza wykonana przez ekspertów przyrodniczych zgodnie z przyjętymi metodykami i wytycznymi.

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (*Salicetum albo-fragilis*, *Populetum albae*, *Alnenion glutinoso-incanae*, olsy źródłiskowe)

Łęgi w obszarze występują w postaci pasm wzdłuż lokalnych cieków lub rowów (także okresowych), ale także w lokalnych zagłębieniach wśród buczyn lub grądów, także bez powiązania z siecią odpływu powierzchniowego.

Reprezentatywność: ocena B (dobra) – siedlisko reprezentowane jest przez lasy olszowe z higrofilnym runem, dla którego typowe są turzycza rzadkokłosa *Carex remota*, śmiełek darniowy *Deschampsia cespitosa*, czartawa pospolita *Circaea lutetiana*, ostrożeń warzywny *Cirsium oleraceum*, pokrzywa zwyczajna *Urtica dioica* i inne gatunki higro- i nitrofilne. Zwykle występują również dąbrówka rozłogowa *Ajuga reptans*, bluszcz kurdybanek *Glechoma hederacea* i jaskier rozłogowy *Ranunculus repens*. Podszyt może być zdominowany przez typowe dla łęgów porzeczkę czerwoną *Ribes schlechtendalii* lub czeremchę *Padus avium*; w wielu płatach brak jednak warstwy krzewów, a w jej miejsce obecny jest tylko podrost olszy czarnej *Alnus glutinosa*. W przypadku bardzo małych płatów, w ich drzewostanie może pojawiać się sięgający z sąsiedztwa buk zwyczajny *Fagus sylvatica*. W niektórych płatach zdarza się podrost lub nalot buka zwyczajnego *Fagus sylvatica*, jaworu *Acer pseudoplatanus*, lub jesionu wyniosłego *Fraxinus excelsior*.

Powierzchnia względna: utrzymanie dotychczasowej oceny C ($2\% \geq p > 0\%$) – obecny areal siedliska w obszarze określono na 38,24 ha. Zasoby siedliska w obszarze stanowią 0,04 % krajowych zasobów.

Stan zachowania: ocena B (dobry), będąca wynikiem oceny trzech podkryteriów:

- a) Stopień zachowania struktury – II (struktura dobrze zachowana), choć niektóre płaty są zniekształcone przez neofityzację,
- b) Stopień zachowania funkcji – II (perspektywy zachowania, dobre), neofityzacji nie da się wprawdzie uniknąć, ale pod warunkiem, że nie dojdzie w obszarze do pogorszenia warunków wodnych, integralność siedliska będzie zachowana,
- c) Możliwości odtworzenia – I (perspektywy zachowania łatwe), przy założeniu wyłączenia z użytkowania gospodarczego, co będzie sprzyjać samorzutnej poprawie stanu ochrony.

Ocena ogólna: ocena C (znacząca) – jest to jeden z wielu obszarów chroniących to siedlisko na Pomorzu.

Stopień rozpoznania: ocena G (dane o wysokiej jakości) – pełna inwentaryzacja przyrodnicza wykonana przez ekspertów przyrodniczych zgodnie z przyjętymi metodykami i wytycznymi.

91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (*Ficario*-*Ulmetum*)

Siedlisko w obszarze występuje w obszarze w rozproszeniu (część północno-zachodnia oraz centralna) w postaci kilku płatów.

Reprezentatywność: ocena C (znacząca) – płaty siedliska 91F0 stanowią najczęściej las o luźnym drzewostanie, budowanym przez gatunki pozostałe po wypadnięciu jesionu (dąb *Quercus robur* lub olsza *Alnus glutinosa*) i pojedyncze przetrwałe jesiony, ze zwartą warstwą krzewów z udziałem czeremchy *Padus avium*, głogu *Crataegus monogyna*, leszczyny *Corylus avellana*, jesionu *Fraxinus excelsior* i jaworu *Acer pseudoplatanus*. Niekiedy nieco liczniej występuje grab *Carpinus betulus*, za czym jednak nie idzie grądowy charakter runa. W runie występuje kombinacja gatunków łęgowych (pokrzywa zwyczajna *Urtica dioica*, czartawa pospolita *Circaea lutetiana*, niecierpek pospolity *Impatiens nolitangere*, kostrzewa olbrzymia *Festuca gigantea*), gatunków hydrofilnych (rdost ostrogorki *Polygonum hydropiper*, niezapominajka *Myosotis scorpioides*) i gatunków lasowych (których jednak nie ma na tyle dużo, by sklasyfikować te płaty jako grądy).

Powierzchnia względna: ocena C ($2\% \geq p > 0\%$) – obecny areal siedliska w obszarze określono na 3,86 ha. Zasoby siedliska w obszarze stanowią 0,01 % krajowych zasobów.

Stan zachowania: ocena C (zdegradowany), będąca wynikiem oceny trzech podkryteriów:

a) Stopień zachowania struktury – III (struktura częściowo zdegradowana).

b) Stopień zachowania funkcji – III (perspektywy zachowania średnie), ze względu na niepewne możliwości odtworzenia (do procesu odtworzenia może dojść w wyniku spontanicznych procesów),

c) Możliwości odtworzenia II (możliwe przy średnim nakładzie środków), za pomocą ochrony czynnej.

Ocena ogólna: ocena C (znacząca) – występowanie siedliska 91F0 jest unikatem w skali Pomorza, ale stan zachowania i niepewne perspektywy ochrony uniemożliwiają wyższą ocenę.

Stopień rozpoznania: ocena G (dane o wysokiej jakości) – pełna inwentaryzacja przyrodnicza wykonana przez ekspertów przyrodniczych zgodnie z przyjętymi metodykami i wytycznymi.

1355 Wydra *Lutra lutra*

W obszarze Natura 2000 Bukowy Las Górki PLH320062 według badań prowadzonych w ramach sporządzania planu zadań ochronnych w 2020 r. wydrę odnotowano na 4 spośród 5 badanych stanowisk w obszarze, a ślady jej bytności odnotowano wzdłuż prawie wszystkich stałych cieków. Ślady bytności wydry notuje się wzdłuż prawie wszystkich stałych cieków. Osobnik lub osobniki gatunku penetrują tu strumienie od ok. 1 m szerokości i powyżej 20 cm głębokości. Głównym pokarmem ze strumieni jest pstrąg potokowy. W odchodach wzdłuż strumieni głównie spotykano jego kręgosłupy. Niestety nie odnaleziono w obszarze nor ani nie zauważono odchodów osobników młodszych. Z kolei 2021 r. ślady obecności wydry zarejestrowano jedynie nad rz. Dzierżecinką. Z uwagi na brak pewności i wiedzy o znaczeniu obszaru dla tego gatunku w obszarze, tj. braku szczegółowych i jednoznacznych danych dotyczących populacji tego gatunku (np. czy obszar jest miejscem rozrodu, czy jedynie migracji i zdobywania pożywienia) pozostawiono wydrę w obszarze z oceną D (populacja nieistotna).

1337 Bóbr europejski *Castor fiber*

Ślady bytowania bobra w obszarze odnotowano w 2020 r. w ramach sporządzania dokumentacji do planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 Bukowy Las Górki PLH320062. Stwierdzono tutaj świeże zgrzyzy bobrowe nad rzeką Dzierżecinką. Niektóre żerowiska pochodzą z 2019 r. i które oceniono jako najwcześniejsze ślady pozostawiane przez ten gatunek. W obszarze nie stwierdzono żeremi ani śladów ich budowy. Ze względu na niskie brzegi i wysoki stan wody, powodujący podtopienia istnieje małe prawdopodobieństwo, iż bóbr będzie budował tu nory. Ze względu na brak stwierdzenia stałego miejsca bytowania bobrów w obszarze, a znalezienie tylko śladów żerowania, nie ma podstaw, by uznać populację tego gatunku za stałą i znaczący składnik przyrody obszaru. Tym samym populacja gatunku w obszarze została w 2023 r. uwzględniona w SDF z oceną D (populacja nieistotna).

4.3. Zagrożenia, presje i działania mające wpływ na obszar

Najważniejsze oddziaływania i działalność mające duży wpływ na obszar

Oddziaływania negatywne			
Poziom	Zagrożenia i presje [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnętrzne [i o b]
H	B02.02		i
M	H05.01		i
M	E03.01		b
M	J02.02		b
H	I01		i
H	K04.03		b
	M01		b
H	K01.03		b
M	J02.03		b
L	F03.01		i

Oddziaływania pozytywne			
Poziom	Działania, zarządzanie [kod]	Zanieczyszczenie (opcjonalnie) [kod]	Wewnętrzne / zewnętrzne [i o b]
H	X		b
M	X		b
L	X		b

Poziom: H = wysoki, M = średni, L = niski.

Zanieczyszczenie: N = stosowanie azotu, P = stosowanie fosforu/fosforanów, A = stosowanie kwasów/zakwaszanie, T = toksyczne chemikalia nieorganiczne,

O = toksyczne chemikalia organiczne, X = zanieczyszczenia mieszane.

i = wewnętrzne, o = zewnętrzne, b = jednocześnie.

4.4. Własność (opcjonalnie)

Typ		[%]
Publiczna	Krajowa/federalna	0
	Kraj związkowy/województwo	0
	Lokalna/gminna	0
	Inna publiczna	0
Własność łączna lub współwłasność		0
Prywatna		0
Nieznana		100
Suma		100

4.5. Dokumentacja (opcjonalnie)

1) Kujawa-Pawlaczyk J. 2008. Raport dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego Natura 2000.2) Kujawa-Pawlaczyk J. 2009. Raport PMŚ dla siedliska 9160 Grad subatlantycki (Stellario-Carpinetum) w obszarze Natura 2000 Bukowy Las Górki PLH320062 wykonany na zlecenie GIOŚ.3) Kujawa-Pawlaczyk J. 2009. Raport PMŚ dla siedliska 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) w obszarze Natura 2000 Bukowy Las Górki PLH320062 wykonany na zlecenie GIOŚ.4) Górski P. 2013. Wątrobowce Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Środkowo-pomorskie”, wyd. Nadleśnictwo Karnieszewice.5) Łacwik Z. 2016. Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Karnieszewice na okres 1.01.2017-31.12.2026 – Tom IB: Program ochrony przyrody. Mscr BULiGL w Szczecinku dla Nadleśnictwa Karnieszewice.6) Stebel A. 2017. Torfowce Sphagnopsida Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy środkowopomorski” (Pomorze Zachodnie), wyd. Nadleśnictwo Karnieszewice.7) Kowalczyk T. 2017. Raport PMŚ dla siedliska 9160 Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum) w obszarze Natura 2000 Bukowy Las Górki PLH320062 wykonany na zlecenie GIOŚ.8) Kowalczyk T. 2017. Raport PMŚ dla siedliska 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) w obszarze Natura 2000 Bukowy Las Górki PLH320062 wykonany na zlecenie GIOŚ.9) Pawlaczyk P. 2021. Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 Bukowy Las Górki PLH320062 w województwie zachodniopomorskim. Pro Natura Pro Homini.

5. STATUS OCHRONY OBSZARU (OPCJONALNIE)

5.1. Istniejące formy ochrony na poziomie krajowym i regionalnym:

[Powrót](#)

Kod	Pokrycie [%]	Kod	Pokrycie [%]	Kod	Pokrycie [%]
PL04	47.87				

5.2. Powiązanie opisanego obszaru z innymi formami ochrony:

na poziomie krajowym lub regionalnym:

Kod rodzaju	Nazwa terenu	Rodzaj	Pokrycie [%]
PL04	Obszar Chronionego Krajobrazu "Koszaliński Pas Nadmorski"	*	47.87

6. ZARZĄDZANIE OBSZAREM

6.1. Organ lub organy odpowiedzialne za zarządzanie obszarem:

[Powrót](#)

Organizacja:	Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
Adres:	Polska Juliusza Słowackiego 2 71-434 Szczecin
Adres e-mail:	sekretariat@szczecin.rdos.gov.pl

6.2. Plan(-y) zarządzania:

Aktualny plan zarządzania istnieje:

☐	Tak
☐	Nie, ale jest w przygotowaniu
☒	Nie

7. MAPA OBSZARU

[Powrót](#)

Nr ID INSPIRE:

PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH320062

Mapa załączona jako plik PDF w formacie elektronicznym (opcjonalnie)

☒ Tak ☐ Nie

Odniesienie lub odniesienia do oryginalnej mapy wykorzystanej przy digitalizacji granic elektronicznych (opcjonalnie)

--